

Ist wohl, obgleich der Deckel unbekannt ist, zu Cyclophorus Montf. oder Cyclophora Swains. zu rechnen. Letztere Form des Namens würde vielleicht nach Hermannsen's Vorgange (Ind. gen. Malac. I. p. 345.) wegen der Farrengattung Cyclophorus Desv. vorzuziehen seyn, wiewohl Swainson die verschiedenartigsten Formen unter diesem Namen vereinigt.

Diagnoses Buccinorum quorundam novorum.

Auctore Guil. Dunker.

1. *Buccinum venustum*, Dkr. *)

B. testa ovato-acuta, crassa, albida, caeruleo lividoque fasciata, costis longitudinalibus compressis striisque transversis ornata; anfractibus senis planiusculis ultimo ceteris multo longiore; labro dextro crasso intus sulcato, sinistro calloso laevigato; columella arcuata. — Alt. 8 lin. Alt.: lat. = 100:55.

Patria ignota.

Cochlea forma fere Buccini pauperati vel marginulati Lam., costis longitudinalibus 20—22 compressis infra suturam noduliferis striisque transversis confertis costas haud decussantibus elegantissime sculpta et fasciis tribus lividis picta. Apertura ovata pro magnitudine testae parva; labrum et dextrum et sinistrum album, callosum; columella medio valde arcuata, superne denticulo seu potius plica munita; fauces albo-fasciatae; noduli nonnulli castanei.

2. *Buccinum rufum*, Dkr.

B. testa crassa, ovato-conica, spadicea, longitudinaliter costata transversimque striata; anfractibus senis plano-

*) Für die als Bucc. scabrum (Zeitschr. 1846. p. 171.) beschriebene Art ist der Name B. horridum zu setzen, da schon ein B. scabrum bei Anton Verz. p. 92. existirt.

convexis superne angulatis, subcoronatis, ultimo spira multo majore; apertura ovata; labro incrassato intus sulcato. — Alt. 9 lin. Alt.: lat. = 100:65.

Patria ignota.

Testa crassa forma fere Bucc. coronati, Brug. (Kien. t. 28. f. 112.) sed anfractus ultimus costis 12—14 latis et crassis, linea impressa superne nodiferis striisque transversis instructus. Striae medianae obsoletissimae, inter costas tantum conspicuae, basi profundiores apparent, ut in B. crenulato, Brug. (Kien. t. 23 f. 90.) cui nostra species est simillima.

3. *Buccinum margaritiferum*, Dkr.

B. testa crassa, ovato-conica, acuta, albido et fusco fasciata, submarmorata; anfractibus 7 parum convexis, longitudinaliter plicatis transversimque subdecussatis, plicis numerosis noduliferis, serie nodulorum transversa infra suturam distincte sejuncta; apertura alba et ovata; labro dextro incrassato, intus sulcato, sinistro granoso supra dente seu potius plica parva instructo. — Alt. 10, 5 lin. Alt.: lat. = 100:55.

Patria ignota.

Species margaritarum seriebus regularibus insignis, pertinet ad coll. Philippianam.

4. *Buccinum Morrisii*, Dkr.

B. testa crassa, ovato-conica, albida, luteo carneoque tincta, transversim sulcata, longitudinaliter striata et plicata, plicis 8—9 supra nodosis; spira exserta; anfractibus senis vel septenis, ultimo ceteris majore; apertura ovata; labro dextro subvaricoso, intus sulcato; columella uniplicata. — Alt. 11 fere lin. Alt.: lat. = 100:55.

Patria ignota.

Species intermedia inter B. costatum, Q et G. et B. plicosum, Dkr. (B. plicosum Menkei ad Fusorum genus referendum est.)

5. *Buccinum obliqueplicatum*, Dkr.

B. testa ovata elongata, subturrita, aurantia; anfractibus fere rotundatis sutura profunda divisis, oblique plicatis transversimque obsolete striatis; plicis in anfractu ultimo 12; apertura subrotunda; labro dextro producto, subtenui, intus obsolete striato; columella valde arcuata. — Alt. 8, 5 lin. Alt.: lat. = 100:60.

Species haec admodum pulchra a Buccino prismatico Brocchi (B. scalariforme Val. apud Kienerum p. 79. t. 21. f. 80.) plicis majoribus obliquis, striis transversis obsoletis, colore et aliis notis differt.

6. *Buccinum Antoni*, Dkr.

B. testa ovato-conica, anfractibus 7—8 rotundatis plicatis striisque densissimis transversis instructa; plicis in anfractu ultimo 14; apertura ovata; labro dextro incrassato intus subsulcato; columella valde arcuata basi uniplicata; cauda brevissima incurva. — Alt. 6 fere lin. Alt.: lat. = 100:52.

Patria Mexico; legit Hegewisch.

A Buccino prismatico, Brocchi forma praesertim minore, sculptura asperiore et labro incrassato differt.

7. *Buccinum multigranosum*, Dkr.

B. testa parva, ovato-acuta, albida seu sordido flava, fasciis tribus subfuscis cincta, costis longitudinalibus et transversis decussata, multigranosa; anfractibus 6—7 convexis; ultimo ceteris paullo majore; labro incrassato subvaricoso, intus sulcato; columella laevigata fusca. — Alt. 4, 5 lin. Alt.: lat. = 100:60.

Patria Indiae occidentales?

8. *Buccinum signatum*, Dkr.

B. testa oblonga, ovato-turrita, aurantia, longitudine costata transversimque densestriata; anfractibus septenis rotundatis, ultimo medio albo lineato, spira brevior; apertura ovata; labro perparum incrassato, intus obsoletissime

sulcato fere laevi; canaliculo brevi intus macula fusca signato. — Alt. 5 lin. Alt.: lat. = 100:45.

Patria Indiae orientales.

Species varietatibus quibusdam, quae ad *B. Ascanias* Brug. pertinent (vide Phil. Enum. Moll. II. p. 188.) similis, sed habitu multo graciliore, labro non varicoso, fere laevi aliisque characteribus satis diversa.

9. *Buccinum Reeveanum*, Dkr.

B. testa ovato-conica, acuta, laevi, nitidiuscula, lutea, fusco et cinereo variegata transversimque lineata; anfractibus 6—7 plano-convexis, infra suturam nodulorum serie ornatis, supremis subtilissime plicatis, transversimque striatis, ultimo basi striato; spira exserta; labro dextro intus sulcato; columella arcuata, supra denticulo obsoleto instructa; apertura subrotunda; faucibus fasciis tribus castaneis ornatis. — Alt. 7, 5 lin. Alt.: lat. = 100:50.

Patria Indiae orientales?

Testa varie picta lineas nonnullas fuscas obsoletas, strias transversas subtiles et fasciam medianam maculis castaneis et albis articulata in anfractu ultimo ostendit. Labrum incrassatum internum obsolete sulcatum, externum rugosum. Sutura distincte incisa; nodulorum series albo castaneoque punctata.

Species haec admodum elegans primo aspectu *B. picto*, Dkr. simillima, sed anfractibus minus convexis infra suturam noduliferis, sulcis anfractus ultimi ceterisque notis bene distinguenda. Varietas invenitur minor, gracilior, obscura.

10. *Buccinum Haldemani*, Dkr.

B. testa ovato-conica, nitida, albo luteoque variegata, anfractibus 6—7 convexiusculis supremis longitudine plicatis, ultimo basi transversim striato; spira acuta; labro dextro dentato; columella arcuata, supra denticulo obsoleto, infra nodulis duobus vel tribus instructa. — Alt. 6 lin. Alt.: lat. = 100:50.

Patria Indiae orientales.

Species pulchra et splendidula *Buccino* corniculo affinis, sed anfractuum ratio et aperturae forma valde alienae.

11. *Buccinum Hanleyanum*, Dkr.

B. testa solida, ovato-conica, acuta, subnitida, albo flavoque marmorata; anfractibus septenis planiusculis, supremis longitudine plicatis transversimque tenerrime striatis, sutura incisa divisis, ultimo ceteris paullo majore, basi transversim sulcato lineisque aurantiis filiformibus cincto; apertura ovata; labro dextro albo incrassato, intus sulcato; columella arcuata, supra denticulo instructa, infra subgranulata. — Alt. 6, 5 lin. Alt.: lat. = 100:46.

Patria ignota.

Buccino praecedenti simile, sed anfractu ultimo majore, forma magis extensa, anfractibus planiusculis, labro crassiore, nitore languido diversum.

12. *Buccinum foveolatum*, Dkr.

B. testa ovato-conica, livida seu cinerea, plerumque fusconzonata, opaca; anfractibus 7—8 parum convexis longitudine confertim plicatis transversimque striatis, ultimo $\frac{3}{5}$ totius longitudinis aequante; apertura oblonga; labro dextro incrassato, varicoso, intus sulcato, basi subserrato; labro sinistro granulis nonnullis instructo; columella subuniplicata; fauce fusca seu colore hepatico tineta.

Variat maximopere magnitudine; specimina maxima 8 lin., minima 4, 5 alta.

Patria speciminum majorum ignota; minora ex India orientali reportavit cl. Th. Philippi Berolinensis.

Striae huius specie transversae plicis confertis longitudinalibus interruptae, ut puncta impressa seu foveolae apparent. Anfractus superiores saepe distinctius plicatae sunt quam reliqui. A Buccino corniculo, cui affinis est nostra species, praesertim plicis longitudinalibus, striis transversis, punctis impressis et labro recto basi subserrato distinguitur. Quaeritur num B. obscurum Kieneri huc referendum sit.

13. *Buccinum Herrmannseni*, Dkr.

B. testa ovato-turrita, nitida, subdiaphana, albo luteoque variegata; anfractibus 7 parum convexis ad suturam angulatis, supremis longitudine plicatis transversimque striatis subgranuliferis, ultimo lineis 5—6 subtilissimis aurantiacis ornato, reliquos magnitudine adaequante; spira exserta, scalarina; apertura ovata; labro dextro parum incrassato, intus laevigato, supra cum dente deflexo et columellae glabratae tuberculo opposito foramen parvulum seu canaliculum formante. — Alt. 8 lin. Alt.: lat. = 100:50.

Species haec peculiaris, cujus patria ignota, quoad picturam et habitum suum generalem, *B. suturale* Lam. in mentem vocans, ad cochleas rariores pertinere videtur, cum unicum tantummodo hucusque viderim specimen, quod servat amicus Philippi.

14. *Buccinum limnaeiforme*, Dkr.

B. testa crassa ovato-acuta, laevi, nitida, luteo et albo maculata seu variegata; anfractibus 6 parum convexis, supremis tenerrime plicatis, ultimo $\frac{2}{3}$ totius testae adaequante; apertura ovata; labro dextro incrassato, acuto intra sulcato, extra plicato, albido et lineolis nonnullis transversis aurantiacis ornato; columella basi callosa subuniplicata, tuberculata, supra denticulo instructa; faucibus colore pallide hepatico tinctis. — Alt. 6 lin. Alt.: latit. = 100 : 60.

Patria ignota.

Species singularis, quae habitum *Limnaei* peregrini Dr. fere ostendit, cum *B. Kieneri* Ant. arctissime cognata est, sed differt statura minore, sutura non profunda, spira non scalariforme.

15. *Buccinum parvulum*, Dkr.

B. testa parvula, ovato-oblonga, laevi, nitida, fulva, punctis albis ocellata; anfractibus quinque vel senis perparum convexis sutura haud profunda conjunctis; spira obtusiuscula; apertura angustata; labro intus denticulato. — Alt. 3, 5 lin. Alt.: lat. = 100 : 40.

Patria Ind. occid.?

Species *Buccino* cribrario simillima, sed testa minore, fascia infra suturam albo et castaneo articulata deficiente et punctis minus regularibus saepius confluentibus bene distinguenda est. Cum sequente ad *Buccina columbelliformis* pertinet.

16. *Buccinum oryza*, Dkr.

B. testa oblonga subturrita, parvula, solidula, nivea, nitida, anfractibus convexiusculis senis longitudine costatis sutura profunda divisio, ultimo basi transversim striato; apertura angustata; labro dextro intus sulcato.

Patria ignota.

Species haec magnitudine et habitu *Buccino* pulchello *Blainv.* simillima, testa crassiore, plicis magis prominentibus, sutura profunda distinguitur.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Malakozoologie](#)

Jahr/Year: 1847

Band/Volume: [4_1847](#)

Autor(en)/Author(s): Dunker Wilhelm (Guilielmus)
Bernhard

Artikel/Article: [Diagnoses Buccinorum quorundam novorum 59-64](#)

