

**Beitrag zur Gallenfauna von Thüringen.**

Von Otto Jaap †.

(Fortsetzung aus Heft 7).

**Betulaceae.***Carpinus betulus* L.*Zygiobia carpini* (F. Löw) Kieff. — Jena: im Forst; Bad Kösen.*Eriophyes macrotrichus* Nal. — Bad Kösen; Jena: Forst; Veronikaberg bei Martinroda; Tambach.*E. tenellus* Nal. — Eisenach: Rennsteig bei der Hohen Sonne; Veronikaberg, Z. S. 604.*Corylus avellana* L.*Eriophyes avellanae* Nal. — Jena: im Forst; Blankenb.; Veronikaberg bei Martinroda.*Betula verrucosa* Ehrh.*Epiblema tetraquetra* Haw. — Saalf.*Plemeliella betulicola* (Kieff.) Rübs. — Ilmenau!*Betula pubescens* Ehrh.*Semudobia betulae* (Winn.) Kieff. — Jena: Kospeda.*Alnus glutinosa* (L.) Gärtn.*Epiblema tetraquetra* Harw. — Saalf.*Eriophyes laevis* Nal. ssp. *typicus* Nal. — Jena: Münchenrodaer Grund; Blank.: Schwarzatal; Plaue; Ilm.; Tambach.*Dasyneura alni* (F. Löw) Rübs. — Jena: Münchenrodaer Grund; Blankenb.: Schwarzatal; Tambach.*Jaapiella cletrophila* Rübs. — Ilm.! — Die Gallen gleichen denen der vorigen Art; Mücken von Rübsaamen gezogen.*Eriophyes laevis* Nal. ssp. *inangulis* Nal. R. 110. — Bad Kösen; Jena: Wöllnitzer Wiesen, Münchenrodaer Grund; Blankenb. mehrfach; Plaue; Ilm.; Tamb. häufig.*Er. brevitarsus* (Focken) Nal. ssp. *typicus* Nal. Jena: Münchenrodaer Grund; Blank.: Schwarzatal; Tamb.*Alnus incana* (L.) Willd.*Eriophyes laevis* Nal. — var. *alni incanae* Nal. — Jena: Münchenrodaer Grund; Erf.: Steigerwald; Plaue.*Dasyneura alni* (F. Löw) Rübs. — Jena: Hausberg!, Münchenrodaer Grund; Blank.: Schwarzatal; Plaue; Stütz.; Tambach.

*Eriophyes laevis* Nal. ssp. *inangulis* Nal. — R. 110. — Jena: Hausberg, Münchenrodaer Grund.

*Eriophyes brevitarsus* Nal. ssp. *phyllierius* Nal. — Jena: Hausberg, Münchenrodaer Grund; Erf.: Steigerwald; Plaue; Stütz.; Tamb.

*Alnus glutinosa* × *incana*.

*Dasyneura alni* (F. Löw) Rübs. — Jena: im Mühlental.

### Fagaceae.

*Fagus silvatica* L.

*Contarinia fagi* Rübs., Cecidom. — Stud. VII, S. 44. — Schmied.; Tam. Auch im Südharz.

*Mikiola fagi* (Hartig). — Bad Kösen; Jena: Forst; Blank.: Schloßberg häufig, Schwarzatal; Wachsenburg; Veronikaberg sehr häufig!; Ilm.; Stütz. häufig; Gehlberger Mühle; Schmied.; Friedr.; Inselsberg; Tambach.

*Hartigiola annulipes* (Hartig) Rübs. — Bad Kösen; Jena: Forst; Blank.: Schwarzatal; Kob.; Wachsenburg; Gehlberger Mühle.

*Phegomyia fagicola* (Kieff.) Rübs. — Blank.: Schloßberg; Veronikaberg; Stütz.!

*Eriophyes stenaspis* Nal. var. *plicans* Nal. — Blank.: Schloßberg! (hier in den Gallen viel *Arthrocnodax*-Larven, die den Milben nachstellen); Schwarzatal; Veronikaberg.

*Phyllaphis fagi* (L.) Koch. — Bad Kösen; Jena: Forst; Blank.: Schloßberg; Veronikaberg; Stütz.; Schmiedeb.; Tambach.

*Eriophyes stenaspis* Nal. — Jena: Forst; Blank.: Schwarzatal; Wachsenburg; Veronikaberg; Ilm.; Stütz.; Schmied.; Tambach.

*E. nervisequus* (Can.) Nal. — Blank.: Schloßberg; Veronikaberg; Stütz.; Schmied.; Tambach.

— var. *maculifer* Trotter. — Blank.; Veronikaberg; Stütz.; Tambach.

*Quercus robur* L.

*Andricus fecundator* (Hartig) G. Mayr. — Jena: Forst; Saalf.; Veronikaberg bei Martinroda.

*Biorrhiza pallida* (Oliv.). — R. 1384. — Blank.; Saalf.; Veronikaberg.

*Andricus inflator* Hartig. — Kob., häufig.

*A. testaceipes* Hart. — R. 1433. — Veronikaberg.

*Diplolepis agama* Hart. — Veronikaberg.

*Neuroterus quercus-baccarum* (L.). — R. 1447. — Bad Kösen.

*N. albipes* (Schenk) G. Mayr. — R. 1452. — Jena: Forst; Veronikaberg.

*Andricus curvator* Hartig. R. 1457. — Jena: Forst; Wachsenburg; Veronikaberg; Friedr.

*Neuroterus quercus-baccarum* (L.). — R. 1458. — Jena: Forst; Veronikaberg; Friedrichroda.

*N. numismalis* (Fonsc.). — R. 1463. — Kob.; Blank.: Schwarzatal; Veronikaberg.

*Macrodiplosis dryobia* (F. Löw) Kieff. — Jena: Forst; Veronikaberg.

*M. volvens* Kieff. — Jena: Forst; Veronikaberg.

*Phylloxera quercus* Fonsc. — Jena: Forst; Blank.; Friedr.

*Trioza remota* Först. — Jena: Forst; Veronikaberg!

*Dasyneura malpighii* Kieff., n. nud. — R. 1464, H. 1354. — Veronikaberg bei Martinroda!

#### *Quercus sessiliflora* Martyn.

*Andricus fecundator* (Hartig) G. Mayr. — Veronikaberg.

*A. callidoma* Hartig. — Tambach.

*Biorrhiza pallida* (Oliv.). — R. 1384. — Veronikaberg.

*Andricus testaceipes* Hartig. — R. 1433. — Blank.

*A. curator* Hartig. — R. 1457. — Veronikaberg.

*Macrodiplosis dryobia* (F. Löw) Kieff., Veronikaberg.

*M. volvens* Kieff. — Veronikaberg.

*Trioza remota* Först. — Veronikaberg.

### Ulmaceae.

#### *Ulmus campestris* L.

*Janetiella leméei* Kieff. — Weimar.

*Schizoneura ulmi* (L.) Kalt. — Jena: Hausberg; Blank.; Wachsenburg; Ilm.; Tambach.

*Tetraneura ulmi* (Geoffr.) Hartig. — Jena: Hausberg; Blank.; Wachsenburg; Ilm.; Tambach.

*Physemocercis ulmi* Rübs. — R. 1997. — Wachsenburg bei Arnstadt.

#### *Ulmus montana* With.

*Schizoneura ulmi* (L.) Kalt. — Plaue; Schmied.; Tambach.

*Tetraneura ulmi* (Geoffr.) Hartig. — Plaue; Stütz.; Schmied.; Tambach.

#### *Ulmus pedunculata* Foug.

*Schizoneura ulmi* (L.) Kalt. — Stützerbach.

*Tetraneura ulmi* (Geoffr.) Hartig. — Stütz.

*Eriophyes brevipunctatus* Nal. — Stütz.

### Urticaceae.

#### *Urtica dioeca* L.

*Dasyneura urticae* (Perris) Rübs. — Blank.: Schwarzatal; Gehlberger Mühle; Friedrichr.; Tambach.

**Polygonaceae.**

*Rumex obtusifolius* L.

*Aphis rumicis* L. — Jena: Lichtenhain; Blank.; Plaue; Stütz.

*Philaenus leucophthalmus* (L.) Stål. — Gehlberger Mühle; Friedr.; Tamb.; Dietharz.

*Rumex acetosella* L.

*Apion frumentarium* L. — Ilm.; Stütz.; Friedr.; Tambach.

*Polygonum bistorta* L.

*Cecidomyidarum* sp. — R. 1243 (Grübchenzelle). — Ilm.!; Stütz.!; Tamb.: Ebertswiese am Rennsteig.

*Dasyneura polygoni* Rübs., *Cecidom.*-Stud. VII, in D. Ent. Zeitschr. 1921, S. 48. — R. 1248. — Stütz.!; Z. S. 521: Tamb.: Ebertswiese am Rennsteig. Auch am Brockengipfel von mir gesammelt. Die Nährpflanze ist in der Arbeit von Rübs a a m e n a. a. O. versehentlich als *Pol. persicaria* bezeichnet worden.

? *Trioza* sp. — R. 1251. — Schmied.; Tamb.: Ebertswiese am Rennsteig.

**Chenopodiaceae.**

*Chenopodium album* L.

*Aphis atriplicis* L. — Bad Kösen; Jena; Tamb.

*A. rumicis* L. — Blätter nach unten umgebogen, gedreht, kraus. Neu! — Bei Plaue.

*Atriplex patulum* L.

*Aphis atriplicis* L. — Wachsenburg; Stütz.

*Atriplex hastatum* L.

*Aphis rumicis* L. — Blätter abwärts gekrümmt und verbogen. Neu! — Bei Plaue.

**Caryophyllaceae.**

*Coronaria floscuculi* (L.) A. Br.

*Jaapiella* (?) *praticola* (Kieff.) Rübs. — R. 1019. — Stütz. bei 650 m!, Z. S. 368.

*Silene vulgaris* (Mönch) Gcke.

? *Jaapiella floriperda* (F. Löw) Rübs. — R. 1810. — Plaue, nicht selten. Da die Mücke nicht gezogen wurde, kann auch *Jaapiella inflatae* Rübs. in Betracht kommen, da sie in ebensolchen Gallen lebt.

*Stellaria holostea* L.

*Dasyneura stellariae* Rübs. — Wachsenburg bei Arnstadt. Zweiter Fundort dieser neuen Galle!

*Brachycolus stellariae* (Hardy) Buckt. — Blank.: Schwarzatal; Tamb.: Dietharz.

*Stellaria uliginosa* Murr.

*Philaenus leucophthalmus* (L.) Stål. — Sproßachse an der Spitze gestauch; Blätter genähert, gekrümmt, und verbogen. Neu! Schmied.

*Malachium aquaticum* (L.) Fr.

*Macrolabis stellariae* Liebel. — Jena: am Ziegenbach.

*Cerastium caespitosum* Gilib.

*Aphis cerastii* Kalt. — Stütz.; Friedr.

*Trioza cerastii* (L.) F. Löw. — Bei Jena.

**Ranunculaceae.***Caltha palustris* L.

*Philaenus leucophthalmus* (L.) Stål. — Tamb.: Ebertswiese am Rennsteig.

*Anemone silvestris* L.

*Cecidomyidarum* sp. — R. 135. Bei Plaue.

*Ranunculus repens* L.

*Philaenus leucophthalmus* (L.) Stål. — Tambach.

*Ranunculus acer* L.

*Dasyneura ranunculi* (Břemi) Rübs. — Bei Plaue.

**Cruciferae.***Sisymbrium officinale* (L.) Scop.

? *Aphididarum* sp. — H. 6685? — Blätter verbogen, etwas gekräuselt, Blattrand nach unten umgebogen. — Tambach.

*Isatis tinctoria* L.

*Coleopterorum* sp. — Sproßachse gestauch, mit länglicher Anschwellung, mehrere Larven. Neu! — Jena: Hausberg.

*Sinapis arvensis* L.

? *Ceuthorrhynchus pleurostigma* Marsh. — Käfer nicht gezogen. — Bei Plaue.

*Raphanus raphanistrum* L.

*Ceuthorrhynchus pleurostigma* Marsh. — Jena: Sonnenberge; Tambach.

*Cardamine amara* L.

*Dasyneura cardaminicola* Rübs. — Stütz. bei 650 m, viel!, Z. S. 563, zuerst 7. 1911; Gehlberg: Schneetiegel; Schmied.; Tamb.; Dietharz; scheint in den quelligen Bächen des Thüringer Waldgebietes nicht selten zu sein.

*Trioza* sp. — R. 373. — Stütz. viel!; Gehlberger Mühle; Friedr.

*Cardamine flexuosa* With.

*Trioza* sp. R. 373. — Bei Stützerbach.

*Erysimum virgatum* Roth.

*Bayeria erysimi* Rübs. — Erf.: Schwellenburg!, Z. S. 372.

### Crassulaceae.

*Sedum reflexum* L.

*Eriophyes destructor* Nal. — Blank.: Schwarzatal.

### Saxifragaceae.

*Chrysosplenium alternifolium* L.

*Trioza* sp. — Blattgrübchengalle. Neu! — Stütz., in Gesellschaft der *Trioza* auf *Cardamine amara* L.

*Philadelphus coronarius* L.

*Aphis viburni* Scop. — Jena: Gärten am Hausberg; Stütz. in Garten.

*Ribes grossularia* L.

*Aphis grossulariae* Kalt. — Bad Kösen; Jena; Blank.: Schwarzatal; Plaue; Tamb.

*Dasyneura tetensi* Rübs. — Blank.! Ilm.

*Contarinia ribis* Kieff. — Jena, mehrfach.

*Ribes alpinum* L.

*Eriophyes ribis* (Westw.) Nal. — Jena, mehrfach, auch im Botanischen Garten, Z. S. 422.

*Aphis grossulariae* Kalt. — Stütz.

*Myzus ribis* (L.) Pass. — Jena, in Gärten; Kob.; Stütz.

*Ribes rubrum* L.

*Aphis grossulariae* Kalt. — Jena, in Gärten; Tamb.

*Myzus ribis* (L.) Pass. — Plaue; Friedr.; Tamb.

*Ribes nigrum* L.

*Aphis grossulariae* Kalt. — Tamb.

*Myzus ribis* (L.) Pass. — Tamb.

*Ribes sanguineum* Pursh.

*Aphis grossulariae* Kalt. — Jena, in Gärten.

*Ribes aureum* Pursh.

*Aphis grossulariae* Kalt. — Bad Kösen; Jena.

### Rosaceae.

*Spiraea salicifolia* L.

*Macrosiphum ulmariae* (Schrank) Schout. — Blank.; Stütz.; Friedr.; Tamb.; in Gärten.

*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.

*Philaenus leucophthalmus* (L.) Stål. — Tamb.: Spitterteich.

*Dasyneura pustulans* Rübs. — Erf.: Steigerwald; Friedr.; Tamb.: Dietharz. (Fortsetzung folgt).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Jaap Otto

Artikel/Article: [Beitrag zur Gallenfauna von Thüringen 239-244](#)