© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

ZOOLOGICA.

Original-Abhandlungen

aus

dem Gesamtgebiete der Zoologie.

Herausgegeben

von

Professor Dr. Carl Chun in Leipzig.

General-Register zu Band 1—15.

Bearbeitet

von

Dr. F. Braem.

STUTTGART.

Verlag von Erwin Nägele.

1904.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Druck von A. Bonz' Erben in Stuttgart.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Register zu Band 1—15.

Das Register zerfällt in ein systematisches und ein Namen- und Sach-Register. Das systematische ist als das Hauptregister gedacht, alles auf einzelne Formen oder Gruppen Bezügliche suche man zunächst hier. In dem mit dem Namenregister vereinigten Sachregister haben ganz allgemeine Schlagworte, wie Anatomie, Entwickelung und ähnliche, keine Aufnahme gefunden, da sie einen allzu grossen Umfang gewonnen hätten, ohne erheblich zu nützen. Ebensowenig sind hier Bezeichnungen aufgeführt, die nur innerhalb bestimmter systematischer Gruppen Geltung haben, man suche also z. B. Sporocyste unter Trematoden, Statoblast unter Bryozoen im systematischen Teil. Das Namenregister dürfte alle irgendwie nennenswerten Zitate enthalten, zumal alle, in denen die Angaben der Autoren diskutiert werden. Nur ganz beiläufige Erwähnungen, ferner Widmungen u. dergl., sind fortgelassen.

Abkürzungen und Zeichen.

In den Verweisungen bezeichnet die erste, arabische Zahl den Band der Zoologica, die zweite, römische, das Heft. In Fällen, wo das Heft in mehrere, besonders paginierte Teile zerfällt, sind diese durch I, II usw. hinter der Heftzahl bezeichnet. Auf die Nummer des Heftes oder seiner Teile folgt die Angabe der Seite. f., ff. = und folgende Seite resp. Seiten. Ein * hinter der Nummer des Bandes oder der Seite bedeutet, dass Abbildungen im Text oder auf Tafeln beigegeben sind. Also z. B. 2, VII, I, 57 ff*. = Band 2, Heft VII, Teil I, Seite 57 und folgende, nebst Abbildung. Beim ersten Heft ist die Bandzahl als selbstverständlich fortgelassen. u. ö. = und öfter.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Übersicht der in Band 1—15 enthaltenen Abhandlungen.

Band 1. Heft I. **Chun, C.**, Die pelagische Tierwelt in größeren Meerestiefen und ihre Beziehungen zu der Oberflächenfauna. Mit 5 farb. Doppeltafeln. 1888.

„ II. **Strubell, A.**, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung des Rübennematoden Heterodera Schachtii Schmidt. Mit 2 z. T. farb. Tafeln. 1888.

„ III. **Vanhöffen, E.**, Untersuch. üb. semäost. u. rhizost. Medusen. Mit 6 farb. Taf. u. 1 Karte. 1889.

„ IV. **Heckert, G. A.**, Leucochloridium Paradoxum. Monograph. Darstellung der Entwicklungs- und Lebensgeschichte des Distomum macorostomum. Mit 4 z. T. farb. Tafeln 1889.

„ V. **Schewiakoff, W.**, Beiträge zur Kenntnis der holotrichen Ciliaten. Mit 7 farb. Tafeln. 1889.

„ 2. „ VI. **Braem, F.**, Untersuchungen über die Bryozoen des süßen Wassers. Mit 15 z. T. farb. Tafeln und zahlr. Illustr. im Text. 1890.

„ VII. **Kaiser, J.**, Beiträge zur Kenntnis der Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte der Acantocephalen. 2 Teile. Mit 10 Doppeltafeln. 1891—92.

„ 3. „ VIII. **Haase, E.**, Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen eines natürlichen Systems der Papilioniden. 2 Bände. Mit 14 farb. nach der Natur gezeichn. u. lithogr. Taf. 1891—92.

„ IX. **Herbst, C.**, Beiträge zur Kenntnis der Chilopoden. Mit 5 Doppeltafeln. 1891.

„ X. **Leichmann, G.**, Beiträge zur Naturgeschichte der Isopoden. Mit 8 Tafeln. 1891.

„ 4. „ XI. **Schmeil, O.**, Deutschlands freileb. Süßwasser-Copepoden. I. Cyclopidae. Mit 8 z. T. farb. Tafeln und 3 Illustr. 1892.

„ XII. **Frenzel, J.**, Untersuchungen über die mikroskopische Fauna Argentiniens. I. Die Protozoen. I. Lfg. 1—4. Mit 10 farbigen Tafeln. 1892.

„ XIII. **Kohl, C.**, Rudimentäre Wirbeltieraugen. I. Mit 9 farb. Doppeltafeln. 1892.

„ 5. „ XIV. **Kohl, C.**, Rudimentäre Wirbeltieraugen. II. Mit 6 farb. Doppeltafeln. 1893. Nachtrag. 1895.

„ XV. **Schmeil, O.**, Deutschlands freileb. Süßwassercopepoden. II. Harpacticidae. Mit 8 z. T. farb. Tafeln und Illustr. 1893.

„ 6. „ XVI. **Looß, A.**, Die Distomen unserer Fische und Frösche. Neue Untersuchungen über Bau und Entwicklung des Distomenkörpers. Mit 9 farb. Doppeltafeln. 1894.

„ XVII. **Leche W.**, Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugetiere, zugleich ein Beitrag zur Stammesgeschichte dieser Tiergruppe. I. Ontogenie. Mit 19 Taf. u. 20 Textfig. 1895.

„ 7. „ XVIII. **Nagel, W. A.**, Vergleich. physiol. und anat. Untersuch. üb. d. Geruchs- u. Geschmackssinn u. ihre Org. m. einleit. Betracht. a. d. allgem. vergleich. Sinnesphisiol. M. 7 z. T. farb. Taf. 1894.

„ XIX. **Chun, C.**, Atlantis, Biolog. Stud. üb. pelag. Organismen. M. 12 Doppeltaf. u. 8 einf. Taf. 1896.

„ 8. „ XX. **Zoologische Ergebnisse** der v. d. Ges. f. Erdkunde in Berlin ausgesandt. Grönlandexpedition. 1) E. Vanhöffen: Untersuchungen über Arachnactis albida Sars. 2) Ders.: Die grönländisch. Ctenophoren. Mit 1 Taf. 3) H. Lohmann: Die Appendikularien der Expedition. Mit 1 Taf. 4) K. Brandt: Die Tintinnen. Mit 1 Taf. 5) H. Lenz: Grönländ. Spinnen. Mit 9 Holzschn. 6) Kramer: Grönländ. Milben. Mit 3 Holzschn. 7) Sommer: Drei Grönländerschädel. Mit 1 Taf. 8) E. Rübsaamen: Mycetophiliden etc. Mit 2 Taf. 9) W. Michaelsen: Grönländische Anneliden.

„ XXI. **Schmeil, O.**, Deutschlands freilebende Süßwasser-Copepoden. III. Centropagidae. Mit 12 z. T. farb. Taf. u. Illustr. i. Text. 1896. Nachtrag zu den Familien der Cyclopiden und Centropagiden. Mit 2 Tafeln. 1898.

„ 9. „ XXII. **Piersig, R.**, Deutschlands Hydrachniden. Mit 51 z. T. farb. Tafeln.

„ 10. „ XXIII. **Braem, F.**, Die geschlechtliche Entwicklung von Plumatella fungosa. Mit 8 Tafeln. 1897.

„ XXIV. **Thiele, J.**, Studien über pazifische Spongien. 2 Teile mit 13 Tafeln u. 1 Holzschn. 1898.

„ XXV. **Stoller, J. H.**, On the organs of respiration of the Oniscidae. 1899. Mit 2 Tafeln.

„ 11. „ XXVI. **Wasmann, E.**, Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen. 1899. Mit 3 Tafeln.

„ XXVII. **Pagenstecher, C.**, Die Lepidopterenfauna des Bismarck-Archipels. I. Die Tagfalter. Mit 2 kol. Taf. 1899.

„ XXVIII. **Miltz, O.**, Das Auge der Polyphemiden. Mit 4 kolor. Tafeln. 1899.

„ 12. „ XXIX. **Pagenstecher, C.**, Die Lepidopterenfauna d. Bismarck-Archipels. II. Die Nachtfalter. Mit 2 kol. Taf. 1900.

„ XXX. **Müller, G. W.**, Deutschlands Süßwasser-Ostracoden. Mit 21 Tafeln. 1900.

„ XXXI. **Michaelsen, W.**, Die holos. Ascidien d. magalhaenisch-südgeorg. Gebietes. M. 3 Taf. 1900.

„ 13. „ XXXII. **Handrick, K.**, Z. Kenntn. d. Nervensystems u. d. Leuchtorgane v. Argyropelecus hemigymnus. Mit 6 Tafeln. 1901.

„ XXXIII. **Heymons, R.**, Die Entwicklungsgeschichte der Scolopender. Mit 8 Tafeln. 1901.

„ XXXIV. **Woltereck, R.**, Trochophora-Studien I. Mit 11 Tafeln und 25 Textfiguren. 1902.

„ 14. „ XXXV. **Bösenberg, W.**, Die Spinnen Deutschlands. Mit 43 Tafeln. 1901/3.

„ 15. „ XXXVI. **Stromer v. Reichenbach, E.**, Die Wirbel der Land-Raubtiere, ihre Morphologie und systemat. Bedeutung. Mit 5 Tafeln. 1902.

„ XXXVII. **Leche, W.**, Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugetiere. II. Phylogenie. H. 1: Erinaceidae. Mit 4 Tafeln und 59 Textfiguren. 1902.

„ XXXVIII. **Illig, K. G.**, Duftorgane der männl. Schmetterlinge. Mit 5 Tafeln. 1902.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

I. Systematisches Register.

Botanik.

Pflanzen.

Psychologie: 7, XVIII, 13 f.

Algen.

Verticale Verbreitung im Meere: I, 58 ff.
Zoochlorella Conductrix: I, V, 40.
Dictyocha Messanensis: I, 60.
Spirogyra. Parasitischer Rhizopode in S.-Zellen: 4, XII, 130 ff*.

Aethalium septicum.

Stahl's Angaben über Chemotropismus: 7, XVIII, 9.

Lemna.

Helioamöbenartiger Parasit in L.-Zellen: 4, XII, 140*.

Salix.

Gallen: 8, XX, 117 f*.

Beta vulgaris.

Rübenmüdigkeit: 1, II, 6.
Rübennematode: 1, II* (Strubell).

Zoologie.

PROTOZOA.

Protozoen Argentiniens: 4, XII* (Frenzel).

RHIZOPODA.

Systematik: 4, XII, 141 ff.
Geographische Verbreitung: 4, XII, 152 ff.
Parasitäre Rhizopoden: 4, XII, 130 ff*. 140*.

Amoebina.

Rhizopoden u. Helioamöben Argentiniens: 4, XII* (Frenzel).
Aboema: 4, XII, 119 f*. 146*.
Amoeba: 4, XII, 22 ff*. 89 ff*. 121 ff*. 147*.
Arcella: 4, XII, 148.
Campascus: 4, XII, 150.
Centropyxis: 4, XII, 136 f*. 148*.
Chromatella: 4, XII, 118 f*. 145*.
Cochliopodium: 4, XII, 135 f*. 148*.
Cyphoderia: 4, XII, 150.
Dactylosphaerium: 4, XII, 32 ff*. 148*.
Difflugia: 4, XII, 133 ff*. 148*.
Eickenia: 4, XII, 124 ff*. 147*.
Elaeorhanis: 4, XII, 72 f*. 149*.
Estrella: 4, XII, 74 ff*. 149*.
Euglypha: 4, XII, 137 ff*. 150*.
Gringa: 4, XII, 115 ff*. 145*.
Guttulidium: 4, XII, 1 f*. 146*.
Heleopera: 4, XII, 148.
Heliosphaerium: 4, XII, 76 ff*. 128*. 149*.
Hyalosphenia: 4, XII, 148.
Limulina: 4, XII, 41 f*. 151*.
Lithosphaerella: 4, XII, 73 f*. 149*.
Mastigamoeba: 4, XII, 49 ff*. 151*.
Mastigella: 4, XII, 38 ff*. 150*.
Mastigina: 4, XII, 42 ff*. 151*.
Microhydrella: 4, XII, 129 f*. 150*.
Micromastix: 4, XII, 37 f*. 150*.
Nebela: 4, XII, 148.
Nuclearella: 4, XII, 63 ff*. 149*.
Nuclearia: 4, XII, 105 ff*. 149*.
Nuclearina: 4, XII, 59 ff*. 108 ff*. 149*.
Olivina: 4, XII, 110 f*. 150*.
Pelomyxa: 4, XII, 21 f*. 147*.
Quadrula: 4, XII, 148.
Rosario: 4, XII, 111 ff*. 150*.
Saccamoeba: 4, XII, 2 ff*. 83 ff*. 120 f*. 146 f*.
Saltonella: 4, XII, 147*.
Stylamoeba: 4, XII, 102 f*. 148*.
Tricholimax: 4, XII, 35 ff*. 150*.
Trinema: 4, XII, 150.
Vampyrella: 4, XII, 149.
Vampyrina: 4, XII, 103 ff*. 149*.

Foraminifera.

Globigerinen. Verticale Verbreitung: I, 51.
Globigerina: I, 8.
Orbulina: I, 8.

Radiolaria.

Tiefseeformen: I, 7 ff.

Phaeodaria.

Aulacantha n. sp.: I, 8 ff.
A. scolymantha: I, 8 ff. 55.
Aulosphaera elegantissima: I, 8 ff.
Castanellidae: I, 8 ff. 55.
Challangeridae: I, 11.
Coelodendrum ramosissimum: I, 8 ff. 12. 55.
C. n. sp.: I, 8.
Dictyocha messanensis: I, 8 ff.

Monopylaria.

Cyrtidae: I, 8.
Eucyrtidium galea: I, 8.

Acantharia.

Acanthometra Claparedei: I, 9.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Acanthometra echinoides (?) I, 8.
A. tetracopa (?): I, 8. 9.
A. sp.: I, 8.
Amphilonche ovata: I, 8. 9.
Dorataspis sp.: I, 8.
Haliommatidium Mülleri: I, 8.
Litholophus sp.: I, 8.
Xiphacanta quadridentata: I, 8. 10.
X. serrata: I, 8. 10.
X. spinulosa: I, 8. 10.

Peripylaria.

Actinomma Asteracanthion: I, 8.
Arachnosphaera myriacantha: I, 8.
A. oligacantha: I, 8.
Cladococcus viminalis: I, 8.
Dictyoplegma spongiosum: I, 8.
Diplosphaera gracilis: I, 8.
Discidae: I, 8.
Heliosphaera actinota: I, 9.
H. n. sp.: I, 8. 9. 12.
Spongosphaera: I, 7.
Sp. streptacantha: I, 8 ff.
Stylospira sp.: I, 8.

Sphaerozoa.

Collosphaera Huxleyi: I, 8. 9.
Collozoum inerme: I, 8 ff.
Sphaerozoum acuferum: I, 8 ff. 61.
Sph. punctatum: I, 8 ff.

INFUSORIA.

Untersuchungsmethoden: 1, V, 4 ff.

Ciliata.

Bestimmung der Zahl der Körpercilien: 1, V, 66 f.

Holotricha.

Allgemeines: 1, V* (Schewiakoff).
Anophrys sarcophaga: 1, V, 65.
Aspidisca costata: 1, V, 49.
Balanitozoon agile: 1, V, 9.
Balantiophorus minutus: 1, V, 64 f*.
Bursaria bullinum: 1, V, 57.
B. leucas: 1, V, 40.
B. vernalis: 1, V, 40.
Chilodon aureus: 1, V, 31.
Ch. ornatus: 1, V, 31.
Cinetochilum margaritaceum: 1, V, 47 ff*.
Colpidium: 1, V, 39. 47.
C. Colpoda: 1, V, 42 ff*.; Zahl der Cilien: 1, V, 67.
Colpoda cucullus: 1, V, 43.
C. pigerrima: 1, V, 65.
Cryptochilum: 1, V, 45.
Cyclidium: 1, V, 59.
C. citrullus: 1, V, 63 f*.
C. glaucoma: 1, V, 60 ff*.
C. margaritaceum: 1, V, 49.
Cyrtosomum: 1, V, 41.
Didinium Balbianii: 1, V, 15 ff*.
D. nasutum: 1, V, 15 ff.
Dileptus Anser: 1, V, 22 ff*.
Dinophrya Lieberkühni: 1, V, 17 ff*.
Frontonia leucas: 1, V, 38 ff*.
Glaucoma: 1, V, 39.
Gl. macrostoma: 1, V, 36 f*.
Gl. pyriformis: 1, V, 35 f*.
Gl. scintillans: 1, V, 32 ff*.; Zahl der Cilien: 1, V, 67.
Histiobalantium agile: 1, V, 60.
Holophrya: 1, V, 18 f.
H. brunnea: 1, V, 13.
H. discolor: 1, V, 10 ff*.; Zahl der Cilien: 1, V, 66.
H. Kessleri: 1, V, 13.
Lacrymaria: 1, V, 18 f.
Lembadion bullinum: 1, V, 55 ff*.
L. ovale: 1, V, 60.
Leucophrys carnium: 1, V, 65.
Lionotus fasciola: 1, V, 19 ff*.
Loxophyllum duplostriatum: 1, V, 22.
Monodinium Balbianii: 1, V, 17.
Nassula aurea: 1, V, 28 ff*.
N. elegans: 1, V, 25 ff*.
N. flava: 1, V, 28.
N. hesperidea: 1, V, 28.
N. ornata: 1, V, 31.
N. viridis: 1, V, 31.
Ophryoglena: 1, V, 41.
Panophrys leucas: 1, V, 40.
P. vernalis: 1, V, 40.
Pantotrichum lagenula: 1, V, 10.
Paramaecium: 1, V, 51.
P. Chrysalis: 1, V, 60.
P. Colpoda: 1, V, 44.
Peridinium cypripedium: 1, V, 54.
Peridinopsis cypripedium: 1, V, 54.
Philaster: 1, V, 45.
Pleuronema Chrysalis: 1, V, 58 ff*.
Pl. citrullus: 1, V, 64.
Prorodon griseus: 1, V, 14.
Pr. teres: 1, V, 13 f*.
Ptyxidium ovulum: 1, V, 65.
Siagonophorus: 1, V, 19.
Urocentrum: 1, V, 47.
U. turbo: 1, V, 49 ff*.
Uronema marina: 1, V, 44 f*.
Urotricha farcta: 1, V, 7 ff*. 47.
U. lagenula: 1, V, 9 f*.
U. platystoma: 1, V, 8.
Urozona Bütschlii: 1, V, 45 ff*.

Tintinnidae.

Systematik: 8, XX, 46 ff*. Verbreitung: 8, XX, 63 ff. Tintinnidae der Grönlandexpedition: 8, XX, 45 ff* (Brandt).
Codonella: 8, XX, 49 ff.
Cyttarocylis: 8, XX, 48*. 60 ff*.
Ptychocylis: 8, XX, 48. 59 f*.
Tintinnopsis: 8, XX, 49 ff*. 55 ff*.
Tintinnus: 8, XX, 47*. 50 ff*.

COELENTERATA.

Anschauungen über Knospenbildung: 7, XIX, 25 ff.
Chemischer Sinn: 7, XVIII, 180 ff.
Tiefseeformen: I, 12 ff.

SPONGIA,

pacifische: 10, XXIV* (Thiele). Sp. von Celebes: 10, XXIV, II, 5 ff*.

Demospongia,

japanische: 10, XXIV, I, 3 ff*.

Tetractinellida,

japanische: 10, XXIV, I, 5 ff*. T. von Celebes: 10, XXIV, II, 6 ff*.
Craniella globosa: 10, XXIV, I, 26 f*.
Cr. lentiformis: 10, XXIV, I, 26*.
Cr. ovata: 10, XXIV, I, 27*.
Cr. varians: 10, XXIV, I, 27 f*.
Ecionema agglutinans: 10, XXIV, II, 7 f*.
E. hilgendorfi: 10, XXIV, I, 18 f*.
Erylus placenta: 10, XXIV, I, 5 f*.
Geodia cylindrica: 10, XXIV, I, 12 f*.
G. exigua: 10, XXIV, I, 11 f*.
G. hilgendorfi: 10, XXIV, I, 8 f*.
G. japonica: 10, XXIV, I, 7 f*.
G. reniformis: 10, XXIV, I, 9 f*.
G. variospiculosa: 10, XXIV, I, 10 f*.
Isops obscura: 10, XXIV, I, 6 f*.
Pachastrella japonica: 10, XXIV, I, 19 f*.
Placina monolopha: 10, XXIV, I, 28 f*.
Sphinctrella döderleini: 10, XXIV, I, 20 f*.
Stelletta inconspicua: 10, XXIV, I, 17 f*.
St. maxima: 10, XXIV, I, 15 f*.
St. naseana: 10, XXIV, I, 16*.
St. orientalis: 10, XXIV, I, 14 f*.
St. pisum: 10, XXIV, I, 16 f*.
St. validissima: 10, XXIV, I, 13 f*.
Tetilla australiensis: 10, XXIV, II, 6 f*.
Tetillidae: 10, XXIV, I, 26 ff*.
Thenea: 10, XXIV, I, 21 ff*.
Th. calyx: 10, XXIV, I, 24 f*.
Th. compacta: 10, XXIV, I, 24*.
Th. compressa: 10, XXIV, I, 24*.
Th. grayi: 10, XXIV, I, 23*.
Th. nucula: 10, XXIV, I, 25*.
Th. hemisphärica: 10, XXIV, I, 25*.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Thenea irregularis: 10, XXIV, I, 25 f*.
Theonella swinhoei: 10, XXIV, II, 6.

Monaxonida,

japanische: 10, XXIV, I, 29 ff*. M. von Celebes: 10, XXIV, II, 8 ff*.
Acanthella: 10, XXIV, I, 53 ff*.
A. aculeata: 10, XXIV, I, 54*.
A. insignis: 10, XXIV, I, 54*.
A. simplex: 10, XXIV, I, 54*.
A. vulgata: 10, XXIV, I, 53*.
Amorphilla: 10, XXIV, I, 44 ff*.
A. adhärens: 10, XXIV, I, 46 f*.
A. compressa: 10, XXIV, I, 46*.
A. halichondroides: 10, XXIV, I, 45*.
A. papillosa: 10, XXIV, I, 45 f*.
A. penicillata: 10, XXIV, I, 46*.
A. renieriformis: 10, XXIV, I, 45*.
Auletta celebensis: 10, XXIV, II, 12 f*.
A. consimilis: 10, XXIV, I, 55*.
A. halichondroides: 10, XXIV, I, 55*.
Axinella copiosa: 10, XXIV, I, 49*.
A. incrustans: 10, XXIV, I, 49 f*.
A. tenuis: 10, XXIV, I, 50*.
Ceratopsis: 10, XXIV, I, 56 ff*.
C. clavata: 10, XXIV, I, 57*.
C. erecta: 10, XXIV, I, 58*.
C. expansa: 10, XXIV, I, 57 f*.
C. ramosa: 10, XXIV, I, 58*.
Cliona: 10, XXIV, I, 40 ff*.
Cl. argus: 10, XXIV, I, 41 f*.
Cl. concharum: 10, XXIV, I, 42*.
Dactylella: 10, XXIV, I, 55 f*.
D. hilgendorfi: 10, XXIV, I, 56*.
Echinodictyum cavernosum: 10, XXIV, II, 15 f*.
Gelliodes spinosella: 10, XXIV, II, 22*.
Gellius toxius: 10, XXIV, II, 21 f*.
Histoderma navicelligerum: 10, XXIV, II, 18 f*.
Jotrochota baculifera: 10, XXIV, II, 18*.
Leucophloeus: 10, XXIV, I, 47 ff*.
L. incrustans: 10, XXIV, I, 48*.
L. perforatus: 10, XXIV, I, 47 f*.
Liosina: 10, XXIV, II, 16 f*.
L. paradoxa: 10, XXIV, II, 17*.
Lissodendoryx similis: 10, XXIV, II, 18*.
Melophlus; 10, XXIV, II, 8 f*.
M. sarasinorum: 10, XXIV, II, 8 f*.
Papillella infrafoliata: 10, XXIV, I, 42 f*.
Petrosia: 10, XXIV, II, 19 ff*.
P. chaliniformis: 10, XXIV, II, 21*.
P. contignata: 10, XXIV, II, 20*.
P. imperforata: 10, XXIV, II, 20*.
P. rava: 10, XXIV, II, 20 f*.
Phacellia: 10, XXIV, I, 51 ff*.
Ph. elegans: 10, XXIV, I, 51 f*.
Ph. foliacea: 10, XXIV, I, 52*.
Phacellia fusca: 10, XXIV, I, 51*.
Ph. paupera: 10, XXIV, I, 53*.
Ph. perforata: 10, XXIV, I, 52*.
Ph. pygmaea: 10, XXIV, I, 52 f*.
Phycopsis: 10, XXIV, II, 11 f*.
Ph. valida: 10, XXIV, II, 12*.
Placospongia melobesioides: 10, XXIV, II, 9*.
Polymastia affinis: 10, XXIV, I, 31 f*.
P. simplicissima: 10, XXIV, I, 32 f*.
Prosuberites sagamensis: 10, XXIV, I, 40*.
P. inconspicuus: 10, XXIV, I, 40*.
P. exiguus: 10, XXIV, I, 40*.
Raspailia: 10, XXIV, I, 59 f*.
R. folium: 10, XXIV, I, 60*.
R. hirsuta: 10, XXIV, I, 59*.
R. villosa: 10, XXIV, I, 60*.
Reniera: 10, XXIV, II, 22 f.
Rhaphidophlus: 10, XXIV, II, 13 ff*.
Rh. erectus: 10, XXIV, II, 14 f*.
Rh. seriatus: 10, XXIV, II, 14*.
Rh. topsenti: 10, XXIV, II, 15*.
Rhizaxinella: 10, XXIV, I, 33 ff*.
Rh. arborescens: 10, XXIV, I, 35*.
Rh. cervicornis: 10, XXIV, 36*.
Rh. clavata: 10, XXIV, I, 34*.
Rh. elevata: 10, XXIV, I, 35 f*.
Rh. excellens: 10, XXIV, I, 34 f*.
Rh. incrassata: 10, XXIV, I, 36*.
Rhizochalina media: 10, XXIV, II, 19*.
Siphonella ingens: 10, XXIV, II, 23*.
Spinosella elegans: 10, XXIV, II, 23 f.
Spirastrella: 10, XXIV, I, 43 f*.
Sp. panis: 10, XXIV, I, 43 f*.
Sp. inconstans: 10, XXIV, II, 10 f*.
Stylocordyla longissima: 10, XXIV, I, 31*.
Suberites: 10, XXIV, I, 37 ff*.
S. japonicus: 10, XXIV, I, 39*.
S. placenta: 10, XXIV, I, 39*.
S. sericeus: 10, XXIV, I, 39*.
S. subereus: 10, XXIV, I, 38*.
Tethya amamensis: 10, XXIV, I, 30 f*.
T. deformis: 10, XXIV, I, 29 f*.

Ceratosa.

C. von Celebes; 10, XXIV, II, 24 ff*.
Druinella ramosa: 10, XXIV, II, 24 f*.
Dysideopsis reticulata: 10, XXIV, II, 28*.
Luffariella elegans: 10, XXIV, II, 25 f*.
Phyllospongia: 10, XXIV, II, 26 ff*.
Ph. coriacea: 10, XXIV, II, 27 f*.
Ph. palmata: 10, XXIV, II, 26 f*.

CNIDARIA.

Anthozoa.

Tiefseeformen (Larven): I, 12.
Actiniaria. Psychologie: 7, XVIII, 13.
Actinien. Larven; I, 12.
Arachnactis albida. Anatomie und Entwickelung; 8, XX, 3 ff* (Vanhöffen).
Cerianthus: I, 12; C. verglichen mit Arachnactis: 8, XX, 9 ff.
Edwardsia: I, 12.

Hydromedusae.

Proliferierende Medusen: 7, XIX, 1 ff*. Tiefseeformen: I, 12.
Aeginidae. Knospung: 7, XIX, 25.
Aeginopsis (Solmundella) mediterranea: I, 12.
Aglaura hemistoma: I, 12.
Cunina. Knospung: 7, XIX. 25. 28.
C. (Solmissus) albescens: I, 12.
Cytaeis macrogaster. Knospung: 7, XIX, 45 ff.
C. (Rathkea, Lizzia) octopunctata. Knospung: 7, XIX, 11 ff*.; Systematik: 7, XIX. 15 ff.
Dipurena dolichogaster. Knospung: 7, XIX, 6 ff*.
Dysmorphosa minima = Lizzia Claparèdei juv.: 7, XIX, 37. 43.
Geryonia (Carmarina) hastata: I, 12.
Hydra. Sinnesorgane: 7, XVIII, 182.
Liriope eurybia: I, 12.
Lizzia Claparèdei. Gesamtentwickelung: 7, XIX, 43 f.; Geschlechtsprodukte: 7, XIX, 38. 41 ff.; Knospung: 7, XIX, 36 ff*.; Verhältnis zu Dysmorphosa: 7, XIX, 36 f.
L. (Rathkea) Köllikeri: I, 12.
L. (Rathkea, Cytaeis) octopunctata. Knospung: 7, XIX, 11 ff*.; Systematik: 7, XIX, 15 ff.
Margelidae. Knospung: 7, XIX, 11 ff*.
Rathkea (Cytaeis, Lizzia) octopunctata. Knospung: 7, XIX, 11 ff*.; Systematik: 7, XIX, 15 ff.
Rhopalonema velatum: I, 12.
Sarsiadae. Knospung: 7, XIX, 4 ff*. 22.
Sarsia gemmifera. Knospung: 7, XIX, 4 ff*.
Sminthea (Trachynema) eurygaster: I, 12.
Syncoryne: 7, XIX, 4.

Siphonophorae.

Entwickelung: I, 14 ff*. Knospenfolge, verglichen mit der der Phylactolaemen: 2, VI, 44. Siphonophoren der Tiefsee: I, 1, 12 ff.
Abyla pentagona: I, 13.
Apolemia uvaria: I, 13. 51.
Calycophoridae. Entwickelung: I, 15.
Diphyes Sieboldii: I, 12 f. 17. 60. Verticale Verbreitung: I, 51.
D. subtilis: I, 13.
Forskalia: I, 16.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Forskalia contorta: I, 65.
F. n. sp.: I, 13.
Galeolaria aurantiaca: I, 13.
Halistemma. Altersfolge der Polypengruppen: 2, VI, 44.; Larven: I, 16.
H. (Stephanomia) pictum: I, 13. 65.
Hippopodius: I, 52.
H. luteus: I, 13 f.; Larve: I, 14 f*.
Monophyes gracilis: I, 13. 14.
M. irregularis: I, 14.
Physalia. Geschlechtsreife Jugendformen: I, 65.
Physophora: I, 51.
Ph. hydrostatica: I, 15 f.; Larve: I, 15 f*.
Polyphyidae. Entwickelung: I, 15.
Rhizophysa: I, 16.

Acalephae.

Tiefseeformen: I, 12.
Semaeostome und rhizostome Medusen: 1, III* (Vanhöffen).
Geographische Verbreitung: 1, III, 46 ff*.

Semaeostomata.

Geographische Verbreitung: I, III, 46 ff*.
Aurelia: 1, III, 19 ff. 23.
A. aurita: 1, III, 20 f. 23. 46 f.
A. clausa: 1, III, 24. 49.
A. colpota: 1, III, 24. 48.
A. cruciata: 1, III, 24. 47.
A. dubia: 1, III, 6. 20 f. 24. 48.
A. flavidula: 1, III, 20. 24. 47.
A. furcata: 1, III, 48.
A. hyalina: 1, III, 24. 49.
A. labiata: 1, III, 24. 49.
A. limbata: 1, III, 24. 49.
A. marginalis: 1, III, 24. 47.
Auricoma Aphrodite: 1, III, 49.
Chrysaora: I, III, 22.
Chr. Blossevillei: 1, III, 6. 15*. 23. 47.
Chr. calliparea: 1, III, 23. 48.
Chr. chinensis: 1, III, 6. 16*. 23. 48.
Chr. fulgida: 1, III, 23. 47.
Chr. helvola: 1, III, 23. 48.
Chr. isosceles: 1, III, 15. 22. 47.
Chr. mediterranea: 1, III, 6. 14 f. 22. 46.
Chr. melanaster: 1, III, 23. 49.
Chr. plocamia: 1, III, 6. 16. 23. 49.
Couthouyia: I, III, 17 f.
Cyanea: 1, III, 17 f. 47. 51.
C. Annasethe: 1, III, 18. 47.
C. Annaskala: I, III, 49.
C. arctica: 1, III, 47.
C. ferruginea: 1, III, 49.
C. imporcata: I, III, 18. 47.
C. Lamarcki: 1, III, 46 f.
Cyanea Müllerianthe: 1, III, 49.
C. Postelsii: 1, III, 49.
C. versicolor: 1, III, 47.
Dactylometra lactea: 1, III, 47.
D. pacifica: 1, III, 49.
D. quinquecirra: 1, III, 47.
Desmonema: 1, III, 17 ff*. 23. 51.
D. Annasethe: 1, III, 17 f.
D. Chierchiana: 1, III, 6. 18 f*. 23. 49.
D. Gaudichaudi: 1, III, 18 f. 23. 47.
D. imporcata: 1, III, 18.
D. pendula: 1, III, 18 f. 23. 49.
Drymonema dalmatina: 1, III, 46.
Dr. Gorgo: 1, III, 47.
Dr. victoria: 1, III, 46.
Floresca palladia: 1, III, 49.
Fl. parthenia: 1, III, 49.
Floscula pandora: 1, III, 49.
Fl. promethea: 1, III, 48.
Lobocrocis: 1, III, 15.
Medora reticulata: 1, III, 19. 49.
Melusina formosa: 1, III, 49.
Patera cerebriformis: 1, III, 47.
P. donacostoma: 1, III, 49.
Pelagia: 1, III, 6 ff*. 21. 51.
P. crassa: 1, III, 6. 10 f*. 22. 47.
P. cyanella: 1, III, 22. 47.
P. denticulata: 1, III, 22. 48 f.
P. discoidea: 1, III, 22. 47.
P. flaveola: 1, III, 13. 22. 49.
P. minuta: 1, III, 6. 12*. 22. 47.
P. neglecta: 1, III, 6. 9 f*. 21. 46 f.
P. noctiluca: 1, III, 6. 8 f*. 21. 46.
P. panopyra: 1, III, 6. 14*. 22. 49.
P. papillata: 1, III, 48.
P. perla: 1, III, 22. 47.
P. phosphora: 1, III, 6. 11 f*. 22. 47.
P. placenta: 1, III, 6. 12 ff*. 22. 49.
Phacellophora ambigua: 1, III, 49.
Ph. camtschatica: 1, III, 49.
Ph. ornata: 1, III, 47.
Ph. sicula: 1, III, 46.
Procyanea protosema: 1, III, 48.
Sanderia malayensis: 1, III, 48.
Sthenonia albida: I, III, 49.
Stenoptycha dactylometra: 1, III, 47.
St. Goethea: 1, III, 47.
St. rosea: 1, III, 49.
Ulmaris prototypus: 1, III, 47.
Umbrosa lobata: 1, III, 46.
Undosa stelligera: 1, III, 46.
U. undulata: 1, III, 47.
Zygonema volutata: 1, III, 15.

Rhizostomata.

System: 1, III, 36 ff. Geographische Verbreitung: 1, III, 46 ff*.
Archirhiza: 1, III, 36. 39.
Archirhiza anrosa: 1, III, 39. 49.
A. primordialis: 1, III, 39. 49.
Brachiolophus collaris: 1, III, 42. 49.
Cannorhiza connexa: 1, III, 39. 49.
Cassiopeia: 1, III, 25. 41.
C. Andromeda: 1, III, 25 f. 41. 48.
C. depressa: 1, III, 41. 48.
C. Mertensi: 1, III, 26. 41. 49.
C. ornata: 1, III, 27. 41. 49.
C. picta: 1, III, 25 ff*. 41. 48.
C. polypoides: 1, III, 27. 41. 48.
Cephea: 1, III, 36. 39.
C. conifera: 1, III, 40. 49.
C. diplopilus: 1, III, 39. 49.
C. Forskalea: I, III, 39. 48.
C. fusca: 1, III, 39. 48.
Cotylorhiza: 1, III, 27. 36.
C. ambulacrata: 1, III, 40. 47.
C. tuberculata: 1, III, 25. 27. 40. 46. 48.
Crambessa: I, III, 28 f. 44.
Cr. cruciata: 1, III, 44. 47.
Cr. Dubreuilli: 1, III, 44. 48.
Cr. mosaica: 1, III, 44. 49.
Cr. palmipes: 1, III, 44. 49.
Cr. Pictonum: I, III, 36. 44. 47. 50.
Cr. Tagi: 1, III, 44. 47.
Cr. triptera: 1, III, 44. 47.
Cramborhiza: 1, III, 25. 29.
Crossostoma: 1, III, 38. 44.
Cr. corolliflorum: 1, III, 42. 47. 50.
Cr. frondiferum: 1, III, 42. 49.
Desmostoma: 1, III, 35.
D. gracile: I, III, 25. 35 f*. 45. 48.
Eucrambessa: 1, III, 33. 44.
Eupilema claustra: 1, III, 43. 49.
E. scapulare: 1, III, 43.
Haplorhiza punctata: 1, III, 39. 49.
H. simplex: 1, III, 39. 49.
Hidroticus rufus: 1, III, 34.
Himantostoma flagellatum: 1, III, 45. 50.
H. Lesueurii: 1, III, 45. 49.
H. loriferum: 1, III, 45. 48.
Leonura leptura: I, III, 46 f. 50.
L. terminalis: 1, III, 45 f. 49.
Leptobrachia leptopus: 1, III, 45. 50.
Loborhiza: 1, III, 28. 41.
L. ornatella: 1, III, 25. 28*. 41. 49.
Lychnorhiza: 1, III, 28 f. 41.
L. lucerna: 1, III, 29 f. 41. 47.
L. flagellata: 1, III, 25. 28 ff*. 42. 47.
Mastigias: 1, III, 33. 44.
M. Mülleri: 1, III, 44. 48.
M. ocellata: 1, III, 25. 33 f*. 44.
M. Orsini: 1, III, 25. 34 f*. 44. 48.
M. pantherina: 1, III, 44. 50.
M. papua: 1, III, 44. 50.
M. roseus: 1, III, 45. 47.
Monorhiza Haeckelii: I, III, 39. 50.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Phyllorhiza: 1, III, 36. 41.
Ph. chinensis: 1, III, 41. 49.
Ph. punctata: 1, III, 39. 50.
Ph. trifolium: 1, III, 41. 49.
Pilema: 1, III, 31.
Polyclonia frondosa: 1, III, 26. 40. 47.
Polyrhiza homopneusis: 1, III, 40. 49.
P. Orithyia: 1, III, 40. 48.
P. vesiculosa: 1, III, 40. 48.
Pseudorhiza aurosa: 1, III, 39. 50.
Rhizostoma: 1, III, 31. 43.
Rh. capense: 1, III, 43. 47.
Rh. clavigerum: 1, III, 43. 48.
Rh. corona: 1, III, 43. 48.
Rh. hispidum: 1, III, 25. 32 f*. 43. 48.
Rh. luteum: 1, III, 43. 46.
Rh. octopus: 1, III, 32. 36. 43. 47. 50.
Rh. pulmo: 1, III, 25. 31 f. 43. 46.
Rh. rhopalophorum: 1, III, 33. 43. 48.
Rhopilema: 1, III, 33. 43.
Stomolophus: 1, III, 31. 42.
St. agaricus: 1, III, 31. 43. 49. 50.
St. Chonii: 1, III, 25. 31*. 43. 49.
St. fritillaria: 1, III, 31. 42. 47.
St. meleagris: 1, III, 42. 47.
Stylorhiza octostyla: 1, III, 40. 48.
St. polystyla: 1, III, 40.
Thysanostoma melitaea: 1, III, 45. 50.
Th. thysanura: 1, III, 45. 50.
Toreuma Gegenbauri: 1, III, 40. 48.
T. thamnostoma: 1, III, 40. 48.
T. theophila: 1, III, 40. 48.
Toxoclytus: 1, III, 44 f.
Versura: 1, III, 38. 42.
V. palmata: 1, III, 42. 48.
V. pinnata: 1, III, 42. 48.
V. vesicata: 1, III, 42. 48.

CTENOPHORAE.

Dissogonie: I, 62 ff. Tiefseeformen: I, 17. Herabsinken in die Tiefe: I, 50. Grönländische Ct.: 8, XX, 15 ff. (Vanhöffen.)
Beroë. Sinnesorgane: 7, XVIII, 33 f.
B. ovata: I, 17. 50.
Bolina: I, 17. B. bewohnt von Oxycephalus sp.: I, 29.
B. hydatina: I, 61; juv.: I, 64*; Dissogonie: I, 63 ff.; Geschlechtsreife Larven: I, 63 f*.; Metamorphose: I, 63 ff.
Cestus Veneris: I, 17. 50. 51.
Eucharis: I, 17.
Eu. multicornis: I, 61. 62. 63; Dissogonie: I, 62 ff.
Hormiphora plumosa: I, 17.

ECHINODERMATA.

Chemischer Sinn: 7, XVIII, 175 ff. Larven in der Tiefsee fehlend: I, 17.
Auricularia nudibranchiata. Beschreibung: 7, XIX, 53 ff*.; Ectoderm: 7, XIX, 58 ff.; Bildung der Kalkrädchen: 7, XIX, 66 ff*.

VERMES.

Sinnesorgane (Geruch und Geschmack): 7, XVIII, 143 ff.
Tiefseeformen: I, 17 ff.

Turbellaria.

Tiefseeform: I, 17.

Trematodes.

Amphistomum: 6, XVI, 117. 146.
Cercaria cystophora: 6, XVI, 111.
C. macrocerca: 6, XVI, 63.
C. micrura: 6, XVI, 47.
Distomum. Distomen der Fische und Frösche: 6, XVI* (Looss); Entwickelungsgeschichte: 6, XVI, 236 ff*.; Histologie: 6, XVI, 112 ff*.; Körperbedeckung: 6, XVI, 112 ff*.; Darmapparat: 6, XVI, 135 ff*.; Nervensystem: 6, XVI, 142 ff*.; Excretionsapparat: 6, XVI, 155 ff*.; Genitalorgane: 6, XVI, 172 ff*.; Funktion derselben: 6, XVI, 221 ff.
D. armatum: 6, XVI, 32
D. clavigerum: 6, XVI, 82 ff.; Beschreibung: 6, XVI, 91 ff*.
D. confusum: 6, XVI, 83 f. 91; Beschreibung: 6, XVI, 101 ff*.
D. crassicolle: 6, XVI, 82. 84.
D. cygnoides. Beschreibung: 6, XVI, 56 ff*.
D. cylindraceum. Beschreibung: 6, XVI, 64 ff*.
D. duplicatum: 6, XVI, 17. 23. 63.
D. endolobum: 6, XVI, 82 ff.; Beschreibung: 6, XVI, 84 ff*.
D. folium. Beschreibung: 6, XVI, 18 ff*.
D. globiporum. Beschreibung: 6, XVI, 41 ff*.
D. hepaticum: 1, IV, 20 f. 32. 34. 47.
D. holostomum: 1, IV, 9.
D. isoporum. Beschreibung: 6, XVI, 49 ff*.
D. isostomum: 1, IV, 36.
D. leptosomum = D. caudatum?: 6, XVI, 2.
Distomum macrostomum. Bau: 1, IV, 29 ff*.; Entwicklungs- und Lebensgeschichte: 1, IV* (Heckert); Dotterzellen und Eibildung: 1, IV, 27 f.; Spermatogenesis: 1, IV, 36 f*.; Encystierung: 1, IV, 61 f*.; Fütterungs- u. Zuchtversuche: 1, IV, 25 f. Siehe auch Leucochloridium.
D. medians: 6, XVI, 82 ff. 91; Beschreibung: 6, XVI, 105 ff*.
D. microstomum. Mimicry: 3, VIII, II, 149.
D. nodulosum. Beschreibung: 6, XVI, 33 ff*.
D. ovocaudatum. Beschreibung: 6, XVI, 109 ff*.
D. palliatum: I, IV, 31. 34.
D. perlatum. Beschreibung: 6, XVI, 24 ff*.
D. rastellus: 6, XVI, 82.
D. retusum: 6, XVI, 82.
D. tereticolle. Beschreibung: 6, XVI, 5 ff*.
D. variegatum. Beschreibung: 6, XVI, 71 ff*.
D. vitellilobum: 6, XVI, 56 f.
D. Westermanni: 1, IV, 34. 56.
Gasterostomum: 1, IV, 60.
Leucochloridium parodoxum. Bau: 1, IV, 12 ff*.; Vorkommen u. Verbreitung: 1, IV, 11 f.; Mimicry mit Insektenlarven: 1, IV, 50 f.; Entwicklungs- u. Lebensgeschichte: 1, IV* (Heckert); Keimballen: 1, IV, 18 f*. 48 f. 52 ff. Keimballen im Verhältnis zu Eizellen: 1, IV, 52. Siehe auch Distomum macrostomum.
Rhopalophorus coronatus: 2, VII, I, 93.

Nematodes.

Allantonema: 1, II, 13. 25. 48.
Ascaris. Subcuticula: 2, VII, I, 38.
A. nigrovenosa: 1, II, 32 ff.
Atractonema: 1, II, 48.
Gordiidae. Metamorphose, verglichen mit der von Heterodera: 1, II, 48.
Gordius aquaticus. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 153 f.
Heterodera javanica: 1, II, 11.
H. radicicola: 1, II, 10 f.
H. Schachtii. Untersuchungsmethode: 1, II, 11 ff.; Bau und Entwickelung: 1, II*; Geschlechtstiere: 1, II, 13 ff*.; Eibildung: 1, II, 29 f.; Embryonalentwickelung: 1, II, 31 ff*.; Feuchtigkeitsbedürfnis (Eintrocknung): 1, II, 41 f.
Sphaerularia: 1, II, 48.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Strongylus paradoxus: 1, II, 32 ff. 37.
Tetrameres: 1, II, 13. 25.
Trichosoma crassicauda: 1, II, 47.

Chaetognatha.

Tiefseeformen: I, 17 f.
Sagitten. Verticale Verbreitung: I, 51.
Sagitta bipunctata: I, 18.
S. hexaptera: I, 17.
S. serratodentata: I, 18.

Acanthocephala.

Anatomie, Histologie, Entwickelung: 2, VII* (Kaiser).
Echinorhynchus. Untersuchungsmethoden: 2, VII, I, 3 ff.; Bau u. Entwickelung: 2, VII, I, 20 ff*.; Genitalapparat: 2, VII, II, 19 ff*.; Spermatogenesis: 2, VII, II, 30 ff*.; Ovogenesis: 2, VII, II, 83 ff*.; Embryonalentwickelung: 2, VII, II, 116 ff*.; Metamorphose, verglichen mit der von Heterodera: I, II, 48.
E. angustatus: 2, VII, I, 2. 11 f*. u. ö.
E. gigas: 2, VII, I, 2. 8 ff*. u. ö.
E. haeruca: 2, VII, I, 2. 12* u. ö.
E. moniliformis: 2, VII, I, 2. 10 f*. u. ö.
E. porrigens: 2, VII, I, 2. 15 f*. u. ö.
E. strumosus: 2, VII, I, 2. 16 f*. u. ö.
E. spinosus: 2, VII, I, 2. 17 f*. u. ö.
E. trichocephalus: 2, VII, I, 2. 12 f*. u. ö.
E. uncinatus: 2, VII, I, 2. 14 f*. u. ö.

Annelides.

Keimblattbildung: 13, XXXIII, 24*; Darmbildung: 13, XXXIII, 207. Grönländ. A.: 8, XX, 120 ff (Michaelsen).

Polygordius.

P.-Larven der Nordsee und des Mittelmeeres: 13, XXXIV, 7 f*. 9 f.
P. lacteus u P. appendiculatus. Histologie der Larve u. Entstehung des Annelids: 13, XXXIV* (Woltereck).
P. neapolitanus u. P. triestinus: 13, XXXIV, 7 f.

Polychaetae.

Alciopidae. Verticale Verbreitung: I, 51. Tiefseeformen: I, 24 f.
Alciopa Cantrainii: I, 24.
A. cirrata: I, 25.
A. longirhyncha: I, 25.
Ampharete arctica: 8, XX, 129. 132.
Amphitrite cirrata: 8, XX, 129. 132.
Aphrodite aculeata. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 151 f.
Arenicola piscatorum. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 150 f.
Asterope candida: I, 24.
Brada villosa: 8, XX, 129. 132.
Callizona Grubei: I, 25.
Capitella capitata: 8, XX, 127. 132.
Castalia aphroditois: 8, XX, 126. 132.
Chaetozone setosa: 8, XX, 128. 132.
Chone infundibuliformis: 8, XX, 130. 132.
Cirratulus cirratus: 8, XX, 128. 132.
Dasybranchus caducus. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 153.
Dasychone infarcta: 8, XX, 130. 132.
Diopatra neapolitana. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 151 f.
Ephesia gracilis: 8, XX, 126 132.
Euchone papillosa: 8, XX, 130. 132.
Flabelligera affinis: 8, XX, 129. 132.
Glycera capitata: 8, XX, 126. 132.
Halla partenopeia. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 151 f.
Harmothoë: 8, XX, 120 ff. 132.
Leaena abranchiata: 8, XX, 130. 132.
Leucariste sp.: 8, XX, 130 132.
Lepadorhynchus brevis: I, 25.
Lumbriconereis Vanhöffeni: 8, XX, 123 f*. 132.
Maldane Sarsii: 8, XX, 128. 132.
Myriochele Heeri: 8, XX, 128. 132.
Nephthys ciliata: 8, XX, 126. 132.
Nereis: 8, XX, 124 ff. 132. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 151.
Nicolea venustula: 8, XX, 129. 132.
Nychia cirrosa: 8, XX, 120. 132.
Ophelia limacina: 8, XX, 127. 132.
Ophelina acuminata: 8, XX, 127. 132.
Ophryotrocha: 10, XXIII, 7.
Owenia fusiformis: 8, XX, 128. 132.
Pectinaria: 8, XX, 129. 132.
Pholoë: 8, XX, 122 f*. 132.
Phyllodocidae. Tiefseeformen: I, 25.
Polydora sp.: 8, XX, 129. 132.
Protula. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 152.
Prionospio Steenstrupi: 8, XX, 129. 132.
Sabella pavonia: 8, XX, 130. 132.
Sabellides borealis: 8, XX, 129. 132.
Scalibregma inflatum: 8, XX, 127 f. 132.
Scione lobata: 8, XX, 130. 132.
Serpula. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 152.
Spio filicornis: 8, XX, 128. 132.
Spirorbis: 8, XX, 131. 132.
Terebellides Strömii: 8, XX, 130. 132.
Tomopteridae. Verticale Verbreitung: I, 51. Tiefseeformen: I, 18 ff.
Tomopteris. Anatomie: I, 20 ff*.; Ovarien: I, 21 ff*.
T. elegans: I, 18 ff*. 56.
T. euchaeta: I, 19 ff*. 55.
Tomopteris Kefersteinii: I, 18.
T. Mariana: I, 24.
T. onisciformis: I, 19.
T. scolopendra: I, 19.
T. vitrina: I, 18. 19.
T. Rolasi: I, 24.
Trichobranchus glacialis: 8, XX, 130. 132.
Vanadis crystallina: I, 24.
V. ornata: I, 24.
V. pelagica: I, 24.

Oligochaetae.

Chaetogaster diaphanus. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 154.
Enchytraeus littoralis: 8, XX, 131.
Lumbricus. Sinnesorgane (Geruch und Geschmack): 7, XVIII, 146 ff.
Nais proboscidea. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 154.
Pachydrilus profugus: 8, XX, 131.
Tubifex rivulorum. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 154.

BRYOZOA.

Phylactolaemen- u. Gymnolaemenlarven, verglichen: 10, XXIII, 82 ff.
Knospenfolge bei Phylactolaemen und Gymnolaemen: 2, VI, 130 ff.; 10, XXIII, 87 f.
Bryozoen d. Süsswassers: 2. VI* (Braem). Systematisches: 2, VI, 2 ff*.; Anatomie und Entwickelungsgeschichte: 2. VI, 17 ff*.; Phänologie: 2, VI, 16; Verbreitung: 2, VI, 15 f.; Fauna der Provinz Preussen: 2, VI, 2 ff.

Entoprocta.

Knospenfolge: 10, XXIII, 88 f.

Gymnolaemata.

Mesodermbildung: 10, XXIII, 80; Parasitische Bryozoen in Ascidien: 12, XXXI, 50.
Alcyonidium: 2, VI, 127.
A. duplex: 10, XXIII, 74 ff.
A. mytili: 2, VI. 46.
Bowerbankia imbricata: 10, XXIII, 75 f.
Crisia. Embryo: 10, XXIII, 80.
Ctenostomata. Oöcium: 10, XXIII, 74 ff.
Flustra. 2, VI, 125. 126 f.
Lagenella repens: 10, XXIII, 75 f.
Lepralia unicornis: 2, VI, 48.
Paludicella Ehrenbergi: 2, VI, 9. 14. 15. 16; P. verglichen mit Fredericella: 2, VI, 11 ff.; Bau, Knospung: 2, VI, 124 ff*.; Cystidknospung: 10, XXIII, 51; Winterknospen: 2, VI,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

112 f.; Degenerierende Polypide: 10, XXIII, 62.
Valkeria cuscuta: 10, XXIII, 75 f.

Phylactolaemata.

Systematisches: 2, VI, 2 ff*. Fauna der Provinz Preussen: 2, VI, 2 ff*. Vergleichende Morphologie: 2, VI, 32 ff*. Anatomie u. Entwickelungsgeschichte: 2, VI, 17 ff*. Excretionsöffnung: 2, VI, 53 f.; 10, XXIII, 20. Gabelkanal: 2, VI, 51 ff*. Kelchmembran: 2, VI, 55 f*. Kreislauf der Leibeshöhlenflüssigkeit: 2, VI, 65*. 10, XXIII, 95. Nervensystem: 2, VI, 47 ff*. 56 f*.; Bildung des Nervensystems im Statoblasten: 2, VI, 102*. Knospung: 2, VI, 17 ff*. Knospung im Statoblasten: 2, VI, 104 ff*. Entwickelung des Stockes: 2, VI, 32 ff*. Entwickelung der Einzeltiere: 2, VI, 45 ff*. Polypidbildung im Statoblasten: 2, VI, 100 ff*. Bildung der ersten Polypide der Larve: 10, XXIII, 52 ff*. Darmbildung: 2, VI, 45 ff*.; Darmbildung im Statoblasten: 2, VI, 101 ff*. Entstehung der Leibeswand aus der Knospe: 2, VI, 20 f*. 26 f*. 30 f*. Bildung der Muskeln: 2, VI, 28 f*. 60 ff*. 103. Funiculus, Entstehung: 2, VI, 66 f*. 103. Statoblastenbildung: 2, VI, 68 ff*. Statoblastenbildung und Knospung verglichen: 2, VI, 109 ff. Statoblastenbildung u. geschlechtliche Fortpflanzung: 2, VI, 80 f. Keimung der Statoblasten: 2, VI, 82 ff*. Untersinken der Statoblasten: 2, VI, 92 ff. Fixationsobjekte der Statoblastentiere: 2, VI, 91 f. Geschlechtliche Fortpflanzung: 2, VI, 114 ff*.; 10, XXIII* (Braem). Embryonalentwickelung und Statoblastenkeimung, verglichen: 2, VI, 120 ff. Zahl der Primärpolypide der Larven: 10, XXIII, 82. Gastrulation: 10, XXIII, 77 ff.
Alcyonella, s. Plumatella.
Cristatella mucedo: 2, VI, 2. 13 f. 15. 16. Phylogenetische Stellung: 2, VI, 133. Beweglichkeit: 2, VI, 41 ff. 44. 91 f. Anatomie und Entwickelung: 2, VI, 17 ff*. Tektonik des Stockes: 2, VI, 33 ff*. Gleitmembran: 2, VI, 28*. Blasenzellen: 2, VI, 21*. 27 f*.; 10, XXIII, 59. 82. Knospung: 2, VI, 18 ff*. Knospung bei jugendlichen Individuen: 2, VI, 24 f*. Knospung ganzer Kolonien: 2, VI, 43 f*. Statoblastenbildung: 2, VI, 74 ff*. Schwimmring: 2, VI, 77 ff*. Zahl der Statoblasten im Stocke: 2, VI, 93. Statoblasten am Boden der Teiche: 2, VI, 92 f. Keimung der Statoblasten: 2, VI, 83 ff*. Geschlechtliche Fortpflanzung: 2, VI, 81. 118. Ovarium, Eier: 2, VI, 114. 115 Hoden u. Spermatozoen: 2, VI, 115 f*. Larven: 2, VI, 44*. 81*; 10, XXIII, 82. Postembryonale Entwickelung des Stockes: 2, VI, 41 ff*.
Fredericella Duplessis: 2, VI, 15.
Fr. sultana: 2, VI, 2. 9. 11 ff. 15. 16. Phylogenetische Stellung: 2, VI, 133 f. Anatomie u. Entwicklung: 2, VI, 17 ff*. Tektonik d. Stockes: 2, VI, 33 ff*. Bau d. Polypide: 2, VI, 65 f*. Blasenzellen d. Ectoderms: 2, VI, 27. 30. Knospung: 2, VI, 32*. 65. Statoblastenbildung: 2, VI, 76*. 78. Geschlechtsprodukte: 2, VI, 118. Embryo: 10, XXIII, 85. Larve: 10, XXIII, 82.
Lophopus crystallinus: 2, VI, 2. 13. 15. Tektonik des Stockes: 2, VI, 36.
Pectinatella magnifica. Tektonik des Stockes: 2, VI, 36.
Plumatella. Anatomie u. Entwickelung: 2, VI, 17 ff*. Tektonik des Stockes: 2, VI, 33 ff*. Blasenzellen des Ectoderms: 2, VI, 27. 30. Knospung: 2, VI, 29 ff*. Knospung im Statoblasten: 2, VI, 32*. Primärknospen der Larve: 10, XXIII, 52 ff*. Sekundärknospen d. Larve: 10, XXIII, 54 ff*. Statoblastenbildung: 2, VI, 69 ff*. 75 ff*. Schwimmring: 2, VI, 77 ff*. Angeheftete Statoblasten: 2, VI, 90 f. 94. 108 f. Keimung der Statoblasten: 2, VI, 89 ff. Entwickelung der Embryonen im Statoblasten: 2, VI, 108 f*.
Pl. coralloides: 2, VI, 3 ff*.
Pl. Dumortieri: 2, VI, 2 f.
Pl. elegans: 2, VI, 2 f.
Pl. emarginata: 2, VI, 2. 9 f*. 15. Tektonik des Stockes: 2, VI, 34 ff*. Larve: 10, XXIII, 65.
Pl. Flabellum: 2, VI, 3, 5.
Pl. fruticosa: 2, VI, 9 f*. 12. 15. Tektonik des Stockes: 2, VI, 33 ff*. Funiculus: 2, VI, 69*.
Pl. fungosa: 2, VI, 2. 3 ff*. 15. 16. Tektonik des Stockes: 2, VI, 33 ff*. Septen: 2, VI, 40 f*. Geschlechtliche Entwickelung: 2, VI, 116 ff*; 10, XXIII* (Braem). Ovarien, Eier: 2, VI, 40*. 114 f*.; 10, XXIII, 13 ff*. Hoden und Spermatozoen: 2, VI, 115 f*.; 10, XXIII, 3 ff*. Uterusschlauch, Oöcium: 2, VI, 117 und Tafel-Erklärung zu Fig. 171; 10, XXIII, 22 ff*. 73 ff. Befruchtung: 10, XXIII, 19 ff*. Furchung: 10, XXIII, 30 ff*. Blastula: 10, XXIII, 37*. 42 f*. Gastrula: 10, XXIII, 43 ff*. Pseudoblastula: 10, XXIII, 45 f*. Mesodermbildung etc.: 10, XXIII, 46 ff*. Larve: 10, XXIII, 63 ff*. Umwandlung u. Festheftung der Larve: 2, VI, 119 f*.; 10, XXIII, 67 f*.
Plumatella jugalis: 2, VI, 2 f.
Pl. polymorpha: 2, VI, 4 ff.
Pl. princeps: 2, VI, 9 f.
Pl. repens: 2, VI, 2 ff*. 15. 16. Tektonik des Stockes: 2, VI, 33 ff*.
Pl. vesicularis: 2, VI, 6. 8*. 15. Tektonik des Stockes: 2, VI, 36.

ARTHROPODA.

Körperbau, Segmentierung: 13, XXXIII, 59 ff. 136 ff. Entwickelung der Genitalien: 13, XXXIII, 185 ff. Bildung der Geschlechtszellen: 13, XXXIII, 30. Dorsalorgan: 13, XXXIII, 158 ff. Darmbildung: 13, XXXIII, 199 ff. Keimblätterfrage: 13, XXXIII, 212 ff. Coelom: 13, XXXIII, 87 ff*. Schizocoel: 13, XXXIII, 92 ff*. Lymphoide Organe: 13, XXXIII, 95 ff. Haut u. Hautdrüsen, Entwickelung: 13, XXXIII, 101 ff. Entwickelung und Phylogenie des Nervensystems: 13, XXXIII, 120 ff*.

CRUSTACEA.

Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 133 ff*. Pelagische Formen, Schwebvermögen: 7, XIX, 100 ff*. Tiefseeformen: 1, 25 ff.; Augen derselben: 7, XIX, 248 ff*.

Phyllopoda.

Bythotrephes longimanus. Auge: 7, XIX, 252 ff*.; 11, XXVIII, 15*. 17 ff*. u. ö.
Evadne. Auge: 7, XIX, 255; 11, XXVIII, 15*. 24 f*. u. ö.
Leptodora hyalina. Auge: 7, XIX, 255; 11, XXVIII, 14 f*. 25 ff*. u. ö.
Podon. Auge: 7, XIX, 255.
P. intermedius. Auge: 11, XXVIII, 16*. 22 ff*. u. ö.
Polyphemidae. Auge: 7, XIX, 251 ff*.; 11, XXVIII* (Miltz); Bau desselben: 11,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

XXVIII, 12 ff*.; Entwickelung: 11, XXVIII, 33 ff*.; Innervation: 11, XXVIII, 40 ff*.; Physiolog. u. biolog. Bedeutung: 11, XXVIII, 48 ff.
Polyphemus pediculus. Auge: 11, XXVIII, 15*. 20 ff*. u. o.

Ostracoda.

Tiefseeformen. I, 28. Deutschlands Süsswasser-O.: 12, XXX* (G. W. Müller); Sammeln, Untersuchen: 12, XXX, 1 ff.; Vorkommen: 12, XXX, 6 ff.

Cypridae.

C. Deutschlands: 12, XXX, 9 ff*.
Candona: 12, XXX, 13 ff*. 99 ff.
Candonopsis: 12, XXX, 37 ff*.
Cyclocypris: 12, XXX, 39 ff*.
Cypria: 12, XXX, 43 ff*.
Cypridopsis: 12, XXX, 79 ff*. 99.
Cyprinotus: 12, XXX, 76 f*.
Cypris: 12, XXX, 51 ff*. 99. 101.
Cyprois: 12, XXX, 49 ff*. 99. 101.
Eucypris: 12, XXX, 53 ff*.
Iliocypris: 12, XXX, 87 ff*.
Notodromas: 12, XXX, 46 ff*.
Paracandona: 12, XXX, 36 f*.
Potamocypris: 12, XXX, 86 f*.

Cytheridae.

C. Deutschlands: 12, XXX, 90 ff*.
Lymnicythere: 12, XXX, 91 ff*.
Metacypris: 12, XXX, 95 f*.

Darwinulidae.

D. Deutschlands: 12, XXX, 96 ff*.
Darwinula: 12, XXX, 97 f*.

Copepoda.

Tiefseeformen: I, 25 ff. Deutschlands freilebende Süsswasser-C., 1. Cyclopidae: 4, XI* (Schmeil); 2. Harpacticidae: 5, XV* (Schmeil); 3. Centropagidae: 8, XXI* (Schmeil).

Cyclopidae.

Tiefseeformen: I, 26. Deutschlands freilebende Süsswasser-C.: 4, XI* (Schmeil); 8, XXI, 148 ff. Unterirdisch lebende C. Deutschlands: 8, XXI, 164 ff.
Cyclops. Deutsche Formen: 4, XI, 15 ff*.
Oithona: I, 26. 27.
Rhincalanus: I, 26.

Harpacticidae.

Deutschlands freilebende Süsswasser.-H.: 4, XI, 10. 14; 5, XV* (Schmeil).
Canthocamptinae. Deutschlands freilebende Süsswasser-C.: 5, XV, 5 ff*.
Canthocamptus: 5, XV, 15 ff*.
Ectinosoma: 5, XV, 91 ff*.
Longipediinae. Deutschlands freilebende Süsswasser-L.: 5, XV, 5 f. 91 ff*.
Nitocra: 5, XV, 77 ff*.
Ophiocamptus: 5, XV, 85 ff*.

Centropagidae.

Deutschlands freilebende Süsswasser-C.: 8, XXI* (Schmeil).
Boeckella: 8, XXI, 184.
Diaptomus: 8, XXI, 9. 10 ff*. 167 ff.
Epischura: 8, XXI, 182 ff.
Eurytemora: 8, XXI, 9. 100 ff*. 181.
Guernea: 8, XXI, 185.
Heterocope: 8, XXI, 9. 78 ff*. 182.
Lamellipodia: 8, XXI, 182 ff.
Limnocalanus: 8, XXI, 184.
Poppella: 8, XXI, 179.
Pseudodiaptomus: 8, XXI, 179 f.

Calanidae.

(Siehe auch Centropagidae.)

Oberflächenformen: I, 26. Tiefseeformen: I, 26. Deutschlands Süsswasser-C.: 4, XI, 11. 14.
Aëtidius: I, 26.
Calanella: I, 26.
Candace: I, 26.
Cetochilus: I, 26. 27.
Dias: I, 26. 27.
D. longiremis: I, 27.
Euchaeta: I, 26. 27.
Hemicalanus: I, 26.
H. longicaudatus: I, 28.
H. longicornis: I, 28.
Heterochaeta: I, 26.
Ichthyophorba: I, 26. 27.
Lenckartia: I, 26.
Phaënnia: I, 26.
Pleuromma: I, 26.
Scolecithrix: I, 26.
Temora: I, 26 27.
T. armata: I, 27.
Undina: I, 26.

Pontellidae.

Oberflächenformen: I, 26.
Calanops: I, 26. 27.
Irenaeus: I, 27.
Pontella: I, 27.
Pontellina: I, 26. 27. 62.

Corycaeidae.

Oberflächenformen: I, 26. Tiefseeformen: I, 26.
Antaria: I, 26. 27.
Copilia: I, 26. 27.
Corycaeus; I, 26. 27.
Hyalophyllum: I, 26. 28.
Pachysoma: I, 26.
Saphirinella: I, 26.

Cirripedia.

Tiefseeformen: I, 25. Nauplien u. Cyprisstadien: 7, XIX, 98 ff.
Archizoëa gigas: I, 25.
Lepadidae. Nauplien: 7, XIX, 77 ff*. Bau derselben: 7, XIX, 80 ff*.; Entwickelung der Cyprispuppe im Nauplius: 7, XIX, 94 ff*.
Nauplius eques: 7, XIX, 81 ff*.
N. hastatus: 7, XIX, 81 ff*.
N. loricatus: 7, XIX, 81 ff*.

Amphipoda.

Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 140 ff*.
Amphipoda Hyperina. Tiefseeformen: I, 28 f.

Hyperidae.

Tiefseeformen: I, 28.
Hyperia sp.: I, 28.
Mimonectes: 3, VIII, II, 4.

Phronimidae.

Tiefseeformen: I, 28 f.
Anchylomera sp.: I, 29.
Paraphronima crassipes: I, 29. 56.
Phronima. Auge: 7, XIX, 242 ff. Sekundäre Geschlechtscharaktere der Männchen: 7, XIX, 107 ff*.
Phr. Colletti. Männchen und Weibchen, Bau: 7, XIX, 111 ff*.
Phr. Diogenes = Phr. Colletti: 7, XIX, Seite II; 7, XIX, 109.
Phr. sedentaria: I, 29. 42. Bau des Männchens: 7, XIX, 109 ff*.
Phronimella elongata: I, 28 f. 51.
Phronimopsis spinifer: I, 29.
Phr. Zoëa: I, 56.

Platyscelidae.

Tiefseeformen: I, 29.
Eupronoë: I, 29.
Entyphis ovoides: I, 29.
Oxycephalus latirostris: I, 29.
O. sp.: I, 29.
Thamyris: I, 29.

Vibiliidae.

Tiefseeformen: I, 28.
Vibilia Jean Gerardi: I, 28.

Isopoda.

Brutpflege: 3, X, 24 ff*. Genitalia, Anatomie: 3, X, 1 ff*.; Eibildung, Eireifung: 3, X, 9 ff*. Sinnesorgane

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

(Geruch und Geschmack): 7, XVIII, 133 f*. 140 ff*.
Anthura gracilis. Brutlamellen: 3, X, 43*.
Armadillidium. Atmungsorgane: 10, XXV, 5 f. 22 f.
Armadillo vulgaris. Antennen: 7, XVIII, 134*.
Asellus aquaticus. Brutpflege: 3, X, 37 ff*. Genitalia: 3, X, 8 ff*. 29 f.; Richtungskörper: 3, X, 21 ff*. A inficiert mit Echinorhynchus: 2, VII, I, 1; 2, VII, II, 136.
Cylisticus convexicus. Atmungsorgane: 10, XXV, 20 ff.
Janira Nordmanni: 3, X, 36.
Idothea Basteri: 3, X, 36.
I. entomon. Brutpflege: 3, X, 39. 42*.
I. tricuspidata. Brutpflege: 3, X, 37.
Ligia Brandtii: 3, X, 36.
Ligidium. Atmungsorgane: 10, XXV, 6. 20. 23 f*.
Oniscidae. Anatomie u. Physiologie der Atmungsorgane: 10, XXV* (Stoller).
Oniscus murarius. Antennen: 7, XVIII, 134*. Atmungsorgane: 10, XXV, 24 ff*.
Porcellio scaber. Antennen: 7, XVIII, 134*. Atmungsorgane: 10, XXV, 5 f. 12 ff*. Brutlamellen: 3, X, 14 f.
Sphaeroma rugicauda. Vorkommen: 3, X, 2. Hermaphroditismus: 3, X, 1 ff*. Brutpflege: 3, X, 24 ff*.

Stomatopoda.

Tiefseeformen: I, 29.
Squilla (Alima): I, 29. 51.

Schizopoda,

pelagische. Verwandtschaftsbeziehungen: 7, XIX, 181 ff. Tiefseeformen: I, 29 ff.; 7, XIX, 137 ff*.; Augen derselben: 7, XIX, 193 ff*. 213 ff*. 242 ff. Der Sehvorgang: 7, XIX, 231.

Mysidae.

Verbreitung, Lebensweise: 7, XIX, 139 f. 185 ff. Tiefseeformen: I, 32 f.
Arachnomysis Leuckartii: I, 32 f*. 56; 7, XIX, 169 ff*. 188. Auge: 7, XIX, 218*.
Brutomysis Vogtii: 7, XIX, 179 ff*. 188 f. Auge: 7, XIX, 217 f*.
Caesaromysis: 7, XIX, 188.
Euchaetomera: 7, XIX, 187 f.
Siriella: 7, XIX, 186 f.

Euphausidae.

Verbreitung, Lebensweise: 7, XIX, 140 ff. 182 ff. Tiefseeformen: I, 29 ff. Leuchtorgane: 7, XIX, 196 ff*. Augen: 7, XIX, 213 ff*.
Bentheuphausia: 7, XIX, 182. 185.
Euphausia. Leuchtorgane: 7, XIX, 199 ff*.
E. pellucida: I, 29 f. 51. 53. 60; 7, XIX, 183. 185.
Nematoscelis: I, 30. 32. 51. Verwandtschaftsbeziehungen: 7, XIX, 183. 185. Leuchtorgane: 7, XIX, 119 ff*. Auge: 7, XIX, 213 ff*.
Nematoscelis mantis, Männchen 7, XIX, 165 ff*.
N. microps: I, 56.
N. rostrata: I, 32. 56.
N. Sarsii: I, 32.
N. tenella: I, 32.
Nyctiphanes: 7, XIX, 182. 185.
Stylocheiron: I, 51. Verwandtschaftsbeziehungen: 7, XIX, 183. 185. Leuchtorgane: 7, XIX, 119 ff*. Auge: 7, XIX, 213 ff*. Innerer Bau: 7, XIX, 152 ff*. Eier: 7, XIX, 159 ff*.
St. abbreviatum: I, 32.
St. chelifer: 7, XIX, 162 ff*.
St. longicorne: I, 30. 56.
St. mastigophorum: I, 30 ff*. 56. Systematik, Bau: 7, XIX, 144 ff*. Sekundäre Geschlechtscharaktere: 7, XIX, 151 f.
St. Suhmii: I, 31.
Thysanoëssa: 7, XIX, 183. 185.
Thysanopoda: 7, XIX, 182. 185.

Decapoda.

Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 134 ff. Tiefseeformen: I, 33 ff.
Acanthosoma (Sergestes): I, 34.
Astacus fluviatilis. Geschmackssinn: 7, XVIII, 137 ff.
Carcinus maenas. Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 139 f.
Ephyrinae. Tiefseeformen: I, 34 f.
Miersia clavigera: I, 34 f*. 56.
Pagurus striatus. Geschmackssinn: 7, XVIII, 135 ff.
Sergestidae. Augen: 7, XIX, 237 ff*. 242. Tiefseeformen: I, 33 f.
Sergestes magnificus: I, 33 f*.
S. robustus: I, 34.

ARACHNOIDEA.

Mimicry: 3, VIII, II, 149.

Araneida.

Geruchssinn: 7, XVIII, 132. Die Spinnen Deutschlands: 14, XXXV* (Bösenberg); Färbung: 14, XXXV, 1 f.; äussere Körperteile: 14, XXXV, 4 f*.; Bestimmungstabelle: 14, XXXV, 6 ff. Grönländische Spinnen: 8, XX, 73 ff*. (Lenz.)
Abacoproeces saltuum: 14, XXXV, 215 f*.
Acartauchenius scurrilis: 14, XXXV, 209*.
Aelurillus: 14, XXXV, 437 ff*.
Agalena: 14, XXXV, 225 f*.
Agalenoidae Deutschlands: 14, XXXV, 12 f. 222 ff*.
Agroeca: 14, XXXV, 260 ff*.
Altella spinigera: 14, XXXV, 246*.
Amaurobius: 14, XXXV, 249 ff*.
Anyphaena: 14, XXXV, 257 f*.
Apostenus: 14, XXXV, 255 f.
Araeoncus: 14, XXXV, 194 ff*.
Argenna: 14, XXXV, 244 ff*.
Argiope Brünnichii: 14, XXXV, 20*.
Argyroneta aquatica: 14, XXXV, 239*.
Artanes: 14, XXXV, 324 ff*.
Asagena phalerata: 14, XXXV, 117 f*.
Attus: 14, XXXV, 424 ff*.
Atypus: 14, XXXV, 220 f*.
Aulonia albimana: 14, XXXV, 371*.
Ballus depressus: 14, XXXV, 445*.
Bathyphantes: 14, XXXV, 83 ff*.
Bolyphantes: 14, XXXV, 62 f*.
Callilepis nocturna: 14, XXXV, 317*.
Calommatoidae Deutschlands: 14, XXXV, 12. 220 f*.
Caracladus globipes: 14, XXXV, 212*.
Centromerus: 14, XXXV, 131 ff*.
Cercidia prominens: 14, XXXV, 53 f*.
Ceratinella: 14, XXXV, 127 ff*.
Chalcoscirtus infimus: 14, XXXV, 414*.
Chiracanthium: 14, XXXV, 280 ff*.
Cicurina cinerea: 14, XXXV, 232*.
Cineta gradata: 14, XXXV, 216*.
Clubiona: 14, XXXV, 265 ff*.
Coelotes: 14, XXXV, 222 f*.
Comaroma Simonii: 14, XXXV, 126 f*.
Coriarachne depressa: 14, XXXV, 364 f*.
Cornicularia: 14, XXXV, 184 ff*.
Crustulina guttata: 14, XXXV, 125 f*.
Cryphoeca silvicola: 14, XXXV, 232*.
Cybaeus: 14, XXXV, 230 f*.
Cyclosa conica: 14, XXXV, 41*.
Cyrtophora oculata; 14, XXXV, 41 f*.
Dendryphantes: 14, XXXV, 439 ff*.
Diaea dorsata: 14, XXXV, 367*.
Dictyna: 14, XXXV, 239 ff*.
D. groenlandica: 8, XX, 75*.
Dictynoidae Deutschlands: 14, XXXV, 14. 239 ff*.
Dicymbium: 14, XXXV, 155 f*.
Dicyphus: 14, XXXV, 162 ff*.
Diplocephalus: 14, XXXV, 190 ff*.
Dipoena melanogaster: 14, XXXV, 117*.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Dismodicus: 14, XXXV, 156 ff*.
Dolomedes: 14, XXXV, 408 f*.
Drapetisca socialis: 14, XXXV, 90 f*.
Drassoidae Deutschlands: 14, XXXV, 15 f. 253 ff*.
Drassus: 14, XXXV, 291 ff*.
Dysdera: 14, XXXV, 319 f*.
Dysderoidae Deutschlands: 14, XXXV, 16. 319 ff*.
Echemus rhenanus: 14, XXXV, 301 f*.
Enoplognatha: 14, XXXV, 115 f*.
Entelecara: 14, XXXV, 179 ff*.
Epeira: 14, XXXV, 21 ff*.
Epiblemum: 14, XXXV, 419 ff*.
Episinus: 14, XXXV, 118 ff*.
Eresoidae Deutschlands: 14, XXXV, 18. 411*.
Eresus niger: 14, XXXV, 411*.
Ergane: 14, XXXV, 434 ff*.
Erigone: 8, XX, 74 f*.; 14, XXXV, 174 ff*.
Ero: 14, XXXV, 110 ff*.
Euetrioidae Deutschlands: 14, XXXV, 8. 20 ff*.
Euophrys: 14, XXXV, 447 ff*.
Enryopis: 14, XXXV, 120 ff*.
Gamasomorpha loricata: 14, XXXV, 323*.
Gnaphosa: 14, XXXV, 314 ff*.
Gonatium: 14, XXXV, 158 ff*.
Gongylidiellum: 14, XXXV, 177 f*.
Gongylidium rufipes: 14, XXXV, 176 f*.
Hahnia: 14, XXXV, 233 ff*.
Harpactes: 14, XXXV, 322 f*.
Heliophanes: 14, XXXV, 414 ff*.
Helophora insignis: 14, XXXV, 90*.
Heriaeus hirsutus: 14, XXXV, 368 f*.
Heteropodoidae Deutschlands: 14, XXXV, 18. 410 f*.
Hilaira uncata: 14, XXXV, 211 f*.
Histopona torpida: 14, XXXV, 223 f*.
Hyptiotes paradoxus: 14, XXXV, 55*.
Illenus arenarius: 14, XXXV, 437*.
Kulczýnskiellum: 14, XXXV, 168 ff*.
Labulla thoracica: 14, XXXV, 92 f*.
Lasaeola: 14, XXXV, 122 ff*.
Lathys: 14, XXXV, 246 f*.
Lephthyphantes: 14, XXXV, 71 ff*.
Leptorhoptrum Huthwaithii: 14, XXXV, 149*.
Linyphia: 14, XXXV, 64 ff*.
L. groenlandica: 8, XX, 73 f*.
Liocranum: 14, XXXV, 258 f*.
Lithyphantes corollatus: 14, XXXV, 118*.
Lophocarenum: 14, XXXV, 196 ff*.
Lophomma: 14, XXXV, 182 ff*.
Lycosa: 14, XXXV, 371 ff*.
L. aquilonaris: 8, XX, 76.
Lycosoidae Deutschlands: 14, XXXV, 18. 371 ff*.
Macrargus rufus: 14, XXXV, 190*.
Marptusa: 14, XXXV, 443 f*.
Maso Sundevallii: 14, XXXV, 154 f*.
Meta: 14, XXXV, 47 ff*.
Metopobactrus prominulus: 14, XXXV, 209 f*.
Micaria: 14, XXXV, 284 ff*.
Micrommata: 14, XXXV, 411 f*.
Microneta: 14, XXXV, 146 ff*.
Micryphantes: 14, XXXV, 151 ff*.
Minicia marginella: 14, XXXV, 139*.
Minyriolus: 14, XXXV, 216 ff*.
Misumena: 14, XXXV, 365 ff*.
Misumenoidae Deutschlands: 14, XXXV, 17. 324 ff*.
Nematogmus: 14, XXXV, 210 f*.
Neon: 14, XXXV, 446 f*.
Nesticus cellulanus: 14, XXXV, 93 f*.
Oedipus aenescens: 14, XXXV, 445 f*.
Oedothorax: 14, XXXV, 212 ff*.
Oonops pulcher: 14, XXXV, 323 f*.
Oxypoidae Deutschl.: 14, XXXV, 19. 450 f*.
Oxyptila: 14, XXXV, 355 ff*.
Oxypus ramosus: 14, XXXV, 450 f*.
Pachygnatha. 14, XXXV, 55 ff*.
Panamomops: 14, XXXV, 178 f*.
Pedanosthetus: 14, XXXV, 137 ff*.
Pellenes: 14, XXXV, 422 ff*.
Peponocranium: 14, XXXV, 214 f*.
Phaeocedus braccatus: 14, XXXV, 302*.
Phaulothrix Hardii: 14, XXXV, 167*.
Philaeus: 14, XXXV, 441 ff*.
Philodromus: 14, XXXV, 328 ff*.
Phlegra fasciata: 14, XXXV, 422*.
Pholcoidae Deutschlands: 14, XXXV, 12. 218 f*.
Pholcomma gibbum: 14, XXXV, 129*.
Pholcus: 14, XXXV, 218 f*.
Phrurolithus: 14, XXXV, 263 ff*.
Phyllonethis lineata: 14, XXXV, 94*.
Pirata: 14, XXXV, 405 ff*.
Pisaura mirabilis: 14, XXXV, 409 f*.
Pistius truncatus: 14, XXXV, 369 f*.
Pocadicnemis pumila: 14, XXXV, 187*.
Poecilochroa: 14, XXXV, 317 ff*.
Poeciloneta variegata: 14, XXXV, 91*.
Porrhomma: 14, XXXV, 149 ff*.
Prosthesima: 14, XXXV, 302 ff*.
Pseudicius encarpatus: 14, XXXV, 421 f*.
Runcinia lateralis: 14, XXXV, 369*.
Sagana rutilans: 14, XXXV, 319*.
Salticoidae Deutschlands: 14, XXXV, 19. 412 ff*.
Salticus formicarius: 14, XXXV, 412*.
Scotina: 14, XXXV, 259 f*.
Scytodes thoracica: 14, XXXV, 218*.
Scytoidae Deutschlands: 14, XXXV, 12. 218*.
Segestria: 14, XXXV, 321 f*.
Singa: 14, XXXV, 49 ff*.
Sintula: 14, XXXV, 129 f*.
Steatoda: 14, XXXV, 113 f*.
Stemonyphantes bucculentus: 14, XXXV, 92*.
Synaema globosa: 14, XXXV, 368*.
Synageles: 14, XXXV, 413*.
Tapinocyba: 14, XXXV, 204 ff*.
Tapinopa longidens: 14, XXXV, 93*.
Tarentula: 14, XXXV, 388 ff*.
Tegenaria: 14, XXXV, 226 ff*.
Tetragnatha: 14, XXXV, 57 ff*.
Tetragnathoidae Deutschlands: 14, XXXV, 8. 55 ff*.
Teutana grossa: 14, XXXV, 114*.
Textrix denticulata: 14, XXXV, 223*.
Thanatus: 14, XXXV, 336 ff*.
Th. arcticus: 8, XX, 76*.
Theridioidae Deutschlands: 14, XXXV, 9 ff. 62 ff*.
Theridium: 14, XXXV, 95 ff*.
Thomisus albus: 14, XXXV, 339*.
Th. decipiens: 3, VIII, 11, 151.
Thyreosthenius biovatus: 14, XXXV, 214*.
Tibellus oblongus: 14, XXXV, 338*.
Tigellinus furcillatus: 14, XXXV, 189*.
Titanoeca: 14, XXXV, 248 f*.
Tmarus piger: 14, XXXV, 370 f*.
Tmeticus: 14, XXXV, 164 ff*.
Trachelas nitescens: 14, XXXV, 256 f*.
Trematocephalus perforatus: 14, XXXV, 173*.
Trichoncus: 14, XXXV, 187 ff*.
Trochosa: 14, XXXV, 398 ff*.
Troxochrus: 14, XXXV, 202 ff*.
Tuberta mirabilis: 14, XXXV, 238 f*.
Uloboroidae Deutschl.: 14, XXXV, 8. 54 f*.
Uloborus Walckenaërii: 14, XXXV, 54 f*.
Walkenaëra: 14, XXXV, 140 ff*.
Xysticus: 14, XXXV, 339 ff*.
Zilla: 14, XXXV, 42 ff*.
Zodarioidae Deutschlands: 14, XXXV, 12. 220*.
Zodarium germanicum: 14, XXXV, 220*.
Zora: 14, XXXV, 253 ff*.

Acarina.

Grönländische Milben: 8, XX, 77 ff* (Kramer).
Antennophorus Uhlmanni als Ameisengast: 11, XXVI, 8.
Bdella arctica: 8, XX, 79 f*.
Halacarus: 8, XX, 82.
Hermannia carinata: 8, XX, 81 f*.
Leiosoma globifer: 8, XX, 80 f*.
Rhombognathus notops: 8, XX, 83.
Rhyncholophus: 8, XX, 77 f.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hydrachnidae.

Charakteristik der Familie: 9, XXII, 32 ff. Geschichte der H.-Kunde: 9, XXII, 1 ff. Deutschlands H.: 9, XXII* (Piersig).
Acercus: 9, XXII, 169 ff*. 470 f*.
Albia: 9, XXII, 489 f.
Arrenurus: 9, XXII, 272 ff*. 489*.
Atax: 9, XXII, 41 ff*.
Atractides: 9, XXII, 186 ff*. 471 ff*.
Aturus: 9, XXII, 254 ff*.
Axonopsis: 9, XXII, 245 ff*.
Brachypoda: 9, XXII, 249 ff*.
Cochleophorus: 9, XXII, 60 ff*. 468 f*.
Curvipes: 9, XXII, 80 ff*. 469 f*.
Diplodontus: 9, XXII, 379 ff*.
Eupatra: 9, XXII, 384 ff*.
Eylais: 9, XXII, 415 ff*.
Feltria: 9, XXII, 369 ff*.
Frontipoda: 9, XXII, 241 ff*.
Gnaphiscus: 9, XXII, 487 ff.
Hydrachna: 9, XXII, 436 ff*.
Hydrochoreutes: 9, XXII, 73 ff*.
Hydryphantes: 9, XXII, 386 ff*.
Hygrobates: 9, XXII, 191 ff*.
Lebertia: 9, XXII, 233 ff*. 475 ff*.
Limnesia: 9, XXII, 202 ff*.
Limnochares: 9, XXII, 462 ff*.
Midea: 9, XXII, 267 ff*.
Mideopsis: 9, XXII, 262 ff*.
Oxus: 9, XXII, 237 ff*. 482 ff*.
Panisus: 9, XXII, 406 ff*.
Partnunia: 9, XXII, 410 f.
Piersigia: 9, XXII, 434 f*.
Piona: 9, XXII, 139 ff*.
Pionacercus: 9, XXII, 162 ff*.
Pionopsis: 9, XXII, 156 ff*.
Protzia: 9, XXII, 411 ff*.
Sperchon: 9, XXII, 222 ff*. 477 ff*.
Sperchonopsis: 9, XXII, 230 ff*.
Teutonia: 9, XXII, 219 ff*.
Thyas: 9, XXII, 396 ff*.
Thyopsis: 9, XXII, 409 f*.
Torrenticola: 9, XXII, 259 ff*.
Wettina: 9, XXII, 182 ff*.

MYRIOPODA.

Geruchs- u. Geschmackssinn: 7, XVIII, 132. Entwickelung der Augen: 13, XXXIII, 155 ff. Keimblattbildung: 13, XXXIII, 18 ff*.

Chilopoda.

Drüsen: 3, IX, 2 ff*. Coxalorgan: 3, IX, 19 ff*. Gefässsystem: 3, IX, 21 ff*. Eingeweidenervensystem: 3, IX, 36 ff*.
Henicops: 3, IX, 9. 24 f.
Lithobius: 3, IX, 1. 6 ff*. 24 f.
Scolopendra: 3, IX, 1. 9 ff*. 25 ff*. Entwickelung: 13, XXXIII* (Heymons).
Scolopendra cingulata und Sc. dalmatica. Vorkommen, Lebensweise, Fortpflanzung: 13, XXXIII, 1 ff. Furchung u. Keimblattbildung: 13, XXXIII, 7 ff*. Äussere Entwickelong: 13, XXXIII, 31 ff*. Entwickelung der mesodermalen Organe: 13, XXXIII, 71 ff*. Entwickelung d. ektodermalen Organe: 13, XXXIII, 98 ff*. Entwickelung der Genitalien: 13, XXXIII, 169 ff*. Darmbildung: 13, XXXIII, 190 ff*.
Scutigera: 3, IX, 1 ff*. 19 ff*.

INSECTA.

Mimicry: 3, VIII, II, 6 ff. Geschmacksorgane: 7, XVIII, 124 ff*. Keimblattbildung: 13, XXXIII, 19 ff.

Orthoptera.

Mimicry: 3, VIII, II, 6 ff. 135 ff. 148. Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 121 f. 128 f.
Blattidae. Mimicry: 3, VIII, II, 6 f.
Forficula. Geruchs- u. Geschmackssinn: 7, XVIII, 121 f. Entwickelung der Genitalien: 13, XXXIII, 188.

Pseudoneuroptera.

Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 117 ff. 128 f*.
Aeschna cyanea. Zunge: 7, XVIII, 130*.

Neuroptera.

Mimicry: 3, VIII, II, 11. 139. 148. Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 118 ff. 128.
Sialis niger, mit Echinorhynchus-Larve: 2, VII, I, 37.

Hemiptera.

Mimicry: 3, VIII, II, 9 f. 148. 159. Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 123 f. 130.
Aphidae. Grönländische: 8, XX, 103 ff*.
Cladobius populneus: 8, XX, 116 f*.
Coccidae. Metamorphose, verglichen mit der von Heterodera: 1, II, 48 f.
Psyllidae. Grönländische: 8, XX, 103 ff*. (Rübsaamen).
Smilia inflata: 3, VIII, II, 151*.
Tychea groenlandica: 8, XX, 115 f*.

Diptera.

Mimicry: 3, VIII, II, 77 f. 136 f. 148. Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 116 f. 129. Keimblätter: 13, XXXIII, 220 ff*.
Boletina arctica: 8, XX, 104 ff*.
Braula coeca als Bienenparasit: 11, XXVI, 8.
Cecidomyidae. Grönländische: 8, XX, 103 ff* (Rübsaamen).
Muscidae. Keimblätter: 13, XXXIII, 214 ff. 224 f.
Mycetophilidae. Grönländische: 8, XX, 103 ff* (Rübsaamen).
Sciaridae. Grönländische: 8, XX, 103 ff*. (Rübsaamen).
Sciara: 8, XX, 106 ff*.

Lepidoptera.

Mimicry: 3, VIII, II, 19 ff*. Sinnesorgane (Geruch und Geschmack): 7, XVIII, 104 ff*. 129. Duftorgane der männlichen Schmetterlinge: 15, XXXVIII* (Illig). Flügelgeäder: 3, VIII, I, 2 ff*. L. des Bismarck-Archipels: 11, XXVII* (Pagenstecher); 12, XXIX* (Pagenstecher).

Heterocera.

H. des Bismarck-Archipels: 12, XXIX* (Pagenstecher).

Microlepidoptera.

Orneodidae des Bismarck-Archipels: 12, XXIX, 241 f.
Pterophoridae des B.-A.: 12, XXIX, 238 ff.
Pyralidae des B.-A.: 12, XXIX, 157 ff*.
Tineidae des B.-A.: 12, XXIX, 226 ff.
Tortricinae des B.-A.: 12, XXIX, 223 ff.

Geometrina.

Epiplemidae des Bismarck-Archipels: 12, XXIX, 129.
Geometridae des B.-A.: 12, XXIX, 130 ff*.
Uraniidae des B.-A.: 12, XXIX, 123 ff.

Noctuina.

Noctuidae des Bismarck-Archipels: 12, XXIX, 69 ff*.
Pechipogon barbalis. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 17 f*.

Bombycina.

Aganaidae des Bismarck-Archipels: 12, XXIX, 44 ff.
Agaristidae des B.-A.: 12, XXIX, 65 ff*.
Arctiidae des B.-A.: 12, XXIX, 49 ff*.
Callidulidae des B.-A.: 12, XXIX, 29 ff.
Cossidae des B.-A.: 12, XXIX, 27 ff.
Drepanulidae des B.-A.: 12, XXIX, 33.
Hepialus hecta. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 16 f*.
Limacodidae des Bismark-Archipels: 12, XXIX, 39.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Liparidae des B.-A.: 12, XXIX, 39 ff.
Lymantriidae des B.-A.: 12, XXIX, 39 ff.
Psychidae des B.-A.: 12, XXIX, 25 ff.
Saturniidae des B.-A.: 12, XXIX, 6 ff.
Syntomidae des B.-A.: 12, XXIX, 23 f.
Tinaegeriidae des B.-A.: 12, XXIX, 22 f.
Thyridiidae des B.-A.: 12, XXIX, 34 ff.
Zygaenidae des B.-A.: 12, XXIX, 24 f.

Sphingina.

Acherontia atropos. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 19 f*.
Notodontidae des Bismarck-Archipels: 12, XXIX, 20.
Sesiidae des B.-A.: 12, XXIX, 20 ff.
Sphingidae des B.-A.: 12, XXIX, 9 ff. 242 f*.
Sphinx ligustri. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 19 f*.

Rhopalocera.

Rh. des Bismarck-Archipels: 11, XXVII* (Pagenstecher); 12, XXIX, 261 ff.
Acraeidae des B.-A.: 11, XXVII, 59 f. 143. 148 f.
Armandia: 3, VIII, I, 107 f.
Colias edusa. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 9 f*.
Danaidae des Bismarck-Archipels: 11, XXVII, 43 ff*. 138 ff. 148 f.
Danais. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 12 ff*. 20 ff*.
Doritis: 3, VIII, I. 110.
Euploea. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 7 ff*. 23 f*.
Eurema excavata. Duftorgane: 15. XXXVIII, 3. 9*.
Euryades: 3, VIII, I, 104 f.
Eurycus: 3, VIII, I. 105 f.
Hesperidae des Bismarck-Archipels: 11, XXVII, 128 ff. 142 f. 156 ff.
Hypermnestra: 3, VIII, I, 110.
Leptocircus: 3, VIII, I. 103 f.
Luehdorfia: 3, VIII, I, 109.
Morphidae des Bismarck-Archipels: 11, XXVII, 92 ff. 143. 150 ff.
Neotropidae des B.-A.: 11, XXVII, 58 ff. 148 f.
Nisoniades tages. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 11 f*.
Nymphalidae des Bismarck-Archipels: 11, XXVII, 60 ff*. 143. 150 ff.
Libytheidae des B.-A.: 11, XXVII, 102*. 143. 150 ff.
Lycaena. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 5 ff*.
Lycaenidae des Bismarck-Archipels: 11, XXVII, 103 ff*. 141 f. 143. 154 ff.
Papilionidae. Entwurf eines natürlichen Systems: 3. VIII, I* (Haase). Einteilungsprinzipien: 3, VIII, I, 15 ff. Bedeutung des natürlichen Systems für die Mimicry-Theorie: 3, VIII, II, 82 ff. Flügelgeäder: 3, VIII, I, 2 ff*. Grundformen der Zeichnung: 3, VIII, I, 10 ff*. Zusammenfassung der Resultate aus der Zeichnung: 3, VIII, I, 100 ff. Paläarktische P.: 3, VIII, I, 17 ff. 118. Indo-australische: 3, VIII, I, 21 ff*. 117 ff.; Mimicry derselben: 3, VIII, II, 83 ff*. 144 f. Afrikanische P.: 3, VIII, I, 59 ff*. 118 ff. Amerikanische: 3, VIII, I, 74 ff*. 117 ff.; Mimicry derselben: 3, VIII, II, 89 ff*. Neotropische P., Mimicry: 3, VIII, II, 146 f. P. des Bismarck-Archipels: 11, XXVII, 14 ff*. 136 f. 143. 146 f.
Parnassius: 3, VIII, I, 111.
Pieridae des Bismarck-Archipels: 11, XXVII, 31 ff*. 137 f. 143. 146 f.
Pieris napi. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 4 f*.
Satyridae des Bismarck-Archipels: 11, XXVII, 94 ff. 141. 143. 150 ff.
Sericinus: 3, VIII, I, 106 f.
Syrichthus malvae. Duftorgane: 15, XXXVIII, 3. 11*. 15 f*.
Teinopalpus: 3, VIII, I, 102 f.
Thais: 3, VIII, I, 108 f.

Coleoptera.

Mimicry: 3, VIII, II, 11 ff*. 134 ff*. 143. 148. Sinnesorgane (Geruch und Geschmack): 7, XVIII, 67 ff*. 128.
Atemeles als Ameisengast: 11, XXVI, 9. 13. 42 ff. u. ö.
Cetonia aurata, infiziert mit Echinorhynchus: 2, VII, II, 139.
Clavigeridae als Ameisengäste: 11, XXVI, 47. 119.
Dinarda als Ameisengast: 11, XXVI, 38 ff. 84 f. 88 u. ö.
Dorylosthetus als Ameisengast: 11, XXVI, 52 f*.
Dytiscus marginalis. Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 67 ff*. Sinnesorgane der Larve: 7, XVIII, 84 ff*. Nahrung: 7, XVIII, 67 f. Zähmong des Käfers: 11, XXVI, 82.
Ecitodulus erassicornis als Ameisengast: 11, XXVI, 50.
Ecitomorpha als Ameisengast: 11, XXVI, 49*.
Homoeusa als Ameisengast: 11, XXVI, 45.
Hydrophilus. Sinnesorgane (Geruch und Geschmack): 7, XVIII, 88 f.
Lachnosterna, infiziert mit Echinorhynchus: 2, VII, II, 139 f.
Lomechusa als Ameisengast: 11, XXVI, 9. 15. 42 ff. u. ö.
Melolontha vulgaris, infiziert mit Echinorhynchus: 2, VII, II, 138.
Mimeciton als Ameisengast: 11, XXVI, 49*. 53.
Myrmedonia als Ameisengast: 11, XXVI, 45 ff. 50.
Oryctes nasicornis, infiziert mit Echinorhynchus: 2, VII, II, 139.
Terapus als Ameisengast: 11, XXVI, 50.
Xenocephalus Goeldii als Ameisengast: 11, XXVI, 50.

Hymenoptera.

Mimicry: 3, VIII, II, 10 f. 139. 143. Sinnesorgane (Geruch u Geschmack): 7, XVIII, 98 ff*. 129 f*.
Ecitopria crassicornis: 11, XXVI, 55 f*. 127*.
Formicidae. Psychische Fähigkeiten: 11, XXVI* (Wasmann). Grundlagen der Reflextheorie Bethes: 11, XXVI, 4 ff. Kennen die Ameisen sich untereinander?: 11, XXVI, 10 ff. Wie finden die Ameisen ihren Weg?: 11, XXVI. 19 ff*. Können die Ameisen sehen?: 11, XXVI, 34 ff*. Besitzen die Ameisen Mitteilungsvermögen?: 11, XXVI, 59 ff*. Formen des Lernens: 11, XXVI, 82 ff.
Proctotrupidae. Mimicry: 11, XXVI, 53 ff*.
Solenopsia imitatrix als Ameisengast: 11, XXVI, 53 ff*. Diagnose: 11, XXVI, 126 f*.
Tetramopria aurocincta: 11, XXVI, 56 ff*. 128 f*.
T. cincticollis: 11, XXVI, 56. 128 ff*.
Tropidopria formicaria. Beschreibung: 11, XXVI. 129.
Tr. fuliginosa. Beschreibung: 11, XXVI, 129.
Tr. longicornis. Beschreibung: 11, XXVI, 129.
Vespa vulgaris. Zunge: 7, XVIII, 130*.

MOLLUSCA.

Mimicry: 3, VIII, II. 78. Sinnesorgane (Geruch und Geschmack): 7, XVIII, 155 ff. Tiefseeformen: I. 35 f.

Lamellibranchiata.

Sinnesorgane (Geruch u. Geschmack): 7, XVIII, 168 ff.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gastropoda.

Chemischer Sinn: 7, XVIII, 156 ff.

Heteropoda.

Tiefseeformen: I, 36.
Atlanta Peronii: I, 36.
A. Quoyana: I, 36.
Carinaria mediterranea. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 172 f.
Firoloida Lesueurii: I, 36.
Pterotrachea mutica: I, 36.
Pt. scutata: I, 36.

Pulmonata.

Limax agrestis. Sporocysten in der Leber: 1, IV, 19.
Succinea amphibia. Infiziert von Leucochloridium: 1, IV, 5 ff*. 41 ff. Regeneration der Fühler: 1, IV, 14.

Pteropoda.

Tiefseeformen: I, 35 f.
Cleodora subulata: I, 35
Clio longicaudatus: I, 36.
Clionopsis Krohnii: I, 36.
Cymbulia: I, 36.
Creseis acicula: I, 35.
Cr. conica: I, 35.
Hyalea tridentata: I, 35.
Hyalocylis striata: I, 35.
Pneumodermon: I, 36,
Spirialis: I, 51.
Sp. rostralis: I, 36. 56.
Sp. trochiformis: I, 36. 56.
Sp. recurvirostra: I, 36. 56.
Tiedemannia: I, 35.

Cephalopoda.

Chemischer Sinn: 7, XVIII, 173. Tiefseeformen: I, 36.. Verbreitungsgebiet in der Tiefsee: I, 51.
Rossia (?) sp.: I, 36*.

TUNICATA.

Tiefseeformen: I, 37 ff.

Appendiculariae.

Verticale Verbreitung: I, 51. Tiefseeformen: I, 37 ff. Appendicularien der Grönland-Expedition: 8, XX, 25 ff*.
Appendicularia sicula: I, 38.
Fritillaria borealis: 8, XX, 35 f*.
Megalocercus abyssorum: I, 40 ff*. 56.
Oikopleura. Feinerer Bau der Gehäuseanlage: 8, XX, 25 ff*.
Oi. Chamissonis: 8, XX, 42 f.
Oi. cophocerca: I, 37. 39. 40.
Oi. dioica: 8, XX, 30 f*.
Oi. fusiformis: I, 37; 8, XX, 30.
Oikopleura labradoriensis: 8, XX, 31 ff*.
Oi. spissa: I, 37. 38.
Oi. Vanhöffeni: 8, XX, 33 ff*.
Stegosoma pellucidum: I, 37 ff*. 56.
Vexillaria speciosa: I, 38.

Ascidiae.

Holosome Ascidien des magalhaensisch-südgeorgischen Gebietes: 12, XXXI* (Michaelsen).
Agnesia: 12, XXXI, 4 ff*.
Alloeocarpa: 12, XXXI, 20. 25 f. 32 ff*.
Ascidia tenera: 12, XXXI, 12 f.
Boltenia: 12, XXXI, 109 ff*.
Chelysoma: 12, XXXI, 5 f.
Chorizocormus: 12, XXXI, 16. 19 f. 26 f.
Ciona intestinalis. Chemischer Sinn: 7, XVIII, 173 f.
Corella: 12, XXXI, 5 f. 10 f.
Corynascidia: 12, XXXI, 5 f.
Cynthia: 12, XXXI, 101 ff*.
Goodsiria: 12, XXXI, 15.
Gynandrocarpa: 12, XXXI, 29 ff.
Hypobythius: 12, XXXI, 5 f.
Molgula: 12, XXXI, 123 ff*.
Oculinaria: 12, XXXI, 15.
Paramolgula: 12, XXXI, 135 ff*.
Polystyela: 12, XXXI, 16.
Polyzoa: 12, XXXI, 13 ff. 27 ff. 44 ff*.
Pyrosomata. Vertikale Verbreitung: I, 51. Tiefseeformen: I, 42.
Pyrosoma atlanticum: I, 42.
Styela: 12, XXXI, 69 ff*.
Synstyela: 12, XXXI, 16.
Thylacium: 12, XXXI, 15.

Salpae.

Tiefseeformen: I, 42.
Doliolidae. Tiefseeformen: I, 42.
Doliolum: I, 60.
Salpa democratica-mucronata: I, 42. 51. 60.
S. maxima-Africana: I, 42.

VERTEBRATA.

Mimicry: 3, VIII, II, 78 ff. 136. 138 ff. 148 f. Rudimentäre Augen der V.: 4, XIII* (Kohl); 5, XIV* (Kohl).

Amphioxus lanceolatus.

Sinnesorgane: 7, XVIII, 192.

Pisces.

Riech- und Schmeckvermögen: 7, XVIII, 183 ff. Seitenlinie: 7, XVIII, 191 f. Tiefseeformen: I, 43. Distomen der Fische: 6, XVI, 5 ff*.
Ammocoetes, s. Petromyzon.
Argyropelecus hemigymnus. Nervensystem u. Leuchtorgane: 13, XXXII* (Handrick). Schädel: 13, XXXII, 3 ff*. Wirbelsäule: 13, XXXII, 5. Gehirn: 13, XXXII, 6 ff*. Spinalnerven: 13, XXXII, 27 ff*. Sympathicus: 13, XXXII, 32 ff*. Pinealorgan: 13, XXXII, 37 f*. Parapinealorgan: 13, XXXII, 7*. 39*. 41*. Seitenorgansystem und Gehörorgan: 13, XXXII, 41 ff*. Modifizierte Muskelzonen: 13, XXXII, 60 f*.
Krohnios filamentosus: I, 43.
Myxine glutinosa. Auge: 4, XIII, 48 ff*.; 5, XIV, 193 ff.
Petromyzon Planeri. Auge: 4, XIII, 1 ff*.; 5, XIV, 185 ff.
Platessa. Larven: 1, 51.
Scyllium. Geruchs- und Geschmackssinn: 7, XVIII, 184 ff.
Typhlichthys subterraneus. Auge: 4, XIII, 59 ff*.; 5, XIV, 204 ff.

Amphibia.

Mimicry: 3, VIII, II, 78 f. 138. 151. Riech- u. Schmeckvermögen: 7, XVIII, 191 ff. Seitenlinie: 7, XVIII, 191 f.
Proteus anguineus. Auge: 4, XIII, 66 ff*.; 5, XIV, 207 ff.
Ranidae. Distomen der Frösche: 6, XVI, 56 ff*.
Siphonops annulatus. Auge: 4, XIII, 100 ff*.; 5, XIV, 221 ff.

Reptilia.

Mimicry: 3, VIII, II, 79 f. 138. 148.
Anguis fragilis. Zahnbildung: 6, XVII, 92*.
Tropidonotus. Auge: 4, XIII, 117 u. ö. 139 f.
Typhlops braminus. Auge: 4, XIII, 137 ff*.; 5, XIV, 231 ff.
T. vermicularis. Auge: 4, XIII, 116 ff*.; 5, XIV, 231 ff.

Aves.

Mimicry: 3, VIII, II, 80 f. 136. 139. 148. Infiziert mit Distomum macrostomum: 1, IV, 25 f. 42 f. 51.
Passer domesticus. Phyllopneuste. Sitta europaea. Sylvia. } Infektionsversuche mit Distomum macrostomum: 1, IV, 25 f

Mammalia.

Mimicry: 3, VIII, II, 81. 136. 149. Ontogenie des Zahnsystems: 6, XVII*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

(Leche); Phylogenie des Zahnsystems: 15, XXXVII* (Leche).

Marsupialia.

Gebiss: 6, XVII, 83 ff*.
Didelphys marsupialis. Gebiss: 6, XVII, 84 ff*.
Macropus nalabatus. Gebiss: 6, XVII, 97 ff*.
Phascolarctus cinereus. Gebiss: 6, XVII, 96 f*.
Myrmecobius fasciatus. Gebiss: 6, XVII, 89 ff*.
Perameles nasuta. Gebiss: 6, XVII, 93.
Trichosurus vulpinus. Gebiss: 6, XVII, 94 ff*.

Cetacea.

Gebiss: 6, XVII, 119 ff*.
Balaenoptera borealis. Gebiss: 6, XVII, 122 f.
Phocaena communis. Gebiss: 6, XVII, 119 ff*.

Edentata.

Gebiss: 6, XVII, 108 ff*.
Bradypus. Gebiss: 6, XVII, 114 ff*.
Manis tricuspis. Gebiss: 6, XVII, 116 f.
Tamandua tridactyla. Gebiss: 6, XVII, 116 f.
Tatusia hybrida. Gebiss: 6, XVII, 110 ff*.
T. peba. Gebiss. 6, XVII, 110 ff*.

Insectivora.

Gebiss: 6, XVII, 11 ff*.
Condylura cristata. Gebiss: 6, XVII, 54 f.
Crossopus fodiens. Gebiss: 6, XVII, 47 ff.
Ericulus setosus. Gebiss: 6, XVII, 45 f.
Erinaceidae. Phylogenie des Zahnsystems: 15, XXXVII* (Leche). Skelet: 15, XXXVII, 48 ff*. Muskulatur: 15, XXXVII, 62 ff*. Integument: 15, XXXVII, 67 ff*. Verdauungs- und Atmungsorgane: 15, XXXVII, 70 f. Gehirn: 15, XXXVII, 72. Genitalorgane: 15, XXXVII, 73 ff*. Verwandtschaftsverhältnisse: 15, XXXVII, 76 ff. Geographische Verbreitung, Genealogie: 15, XXXVII, 92 ff.
Erinaceus: 15, XXXVII, 7 ff. Gebiss: 15, XXXVII, 17 ff*. Skelet: 15, XXXVII, 48 ff*. Muskulatur: 15, XXXVII, 63 ff. Integument: 15, XXXVII, 67 ff. Verdauungs- u. Atmungsorgane: 15, XXXVII, 67 f. Gehirn: 15, XXXVII, 72. Genitalien: 15, XXXVII, 72 ff*. Verwandtschaftsverhältnisse, Systematik, Verbreitung: 15, XXXII, 81 ff.
Erinaceus europaeus. Gebiss: 6, XVII, 11 ff*.
Er. micropus. Gebiss: 6, XVII, 43*.
Galerix exilis. Gebiss: 15, XXXVII, 7. 10 ff*. Gliedmassenskelet: 15, XXXVII, 61*. Verwandtschaftsverhältnisse: 15, XXXVII, 77 f.
Gymnura rafflesii: 15, XXXVII, 7 ff. Gebiss: 15, XXXVII, 11 ff*. Skelet: 15, XXXVII, 48 ff*. Muskulatur: 15, XXXVII, 62 ff*. Integument: 15, XXXVII, 67 ff*. Lebensweise: 15, XXXVII, 68. 78. Verdauungs- und Atmungsorgane: 15, XXXVII, 70 f. Genitalia: 15, XXXVII. 72 ff*. Verwandtschaftsverhältnisse: 15, XXXVII, 80.
Hylomys suillus: 15, XXXVII, 7 ff. Gebiss: 15, XXXVII, 11 ff*. Skelet: 15, XXXVII, 48 ff*. Muskulatur: 15, XXXVII, 62 ff. Integument: 15, XXXVII, 67 ff*. Lebensweise: 15, XXXVII, 68. Verdauungs- und Atmungsorgane: 15, XXXVII, 70 f. Gehirn: 15, XXXVII, 72 Genitalia: 15, XXXVII, 72 ff*. Verwandtschaftsverhältnisse: 15, XXXVII, 78 f.
Lanthanotherium: 15, XXXVII, 7. Gebiss: 15, XXXVII, 10 ff. Verwandtschaftsverhältnisse: 15, XXXVII, 78.
Necrogymnurus. Gebiss: 15, XXXVII, 7. 10 ff*. Schädel: 15, XXXII, 52 ff*. Verwandtschaftsverhältnisse: 15, XXXVII, 76.
Palaeoerinaceus. Gebiss: 15, XXXVII, 7 f. 21 u. ö. Schädel: 15, XXXVII, 52 ff*. Verwandtschaftsverhältnisse: 15, XXXVII, 80 f.
Scalops aquaticus. Gebiss: 6, XVII, 51 ff*.
Sorex vulgaris. Gebiss: 6, XVII, 47 ff.
Talpa europaea. Gebiss: 6, XVII, 50 f. Bau u. Entwickelung des Auges: 5, XIV, 1 ff*. 240 ff.
Tetracus: 15, XXXVII, 7. Gebiss: 15, XXXVII, 10 ff. Verwandtschaftsverhältnisse: 15, XXXVII, 78.

Chiroptera.

Gebiss: 6, XVII, 74 ff*.
Cynonycteris aegyptiaca. Gebiss: 6, XVII, 80.
Desmodus rufus. Gebiss: 6, XVII, 77 ff*.
Phyllostoma hastatum. Gebiss: 6, XVII, 75 ff*.
Vesperugo serotinus. Gebiss: 6, XVII, 80 ff.

Carnivora.

Die Wirbel der Land-Raubtiere: 15, XXXVI* (Stromer von Reichenbach). Wirbel fossiler Raubtiere: 15, XXXVI, 238 ff*. Gebiss: 6, XVII, 56 ff*.
Ailurus fulgens. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 135 ff*.
Amphicyon Lemanensis. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 249 f*.
Arctitis. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 119 ff*.
Bassariscus astuta. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 139 ff*.
Canis. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 207 ff*. 259*.
C. familiaris. Gebiss: 6, XVII, 60 f.
Cryptoprocta. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 102 ff*.
Cynaelurus. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 98 ff*.
Eupleres. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 123 ff.
Felis. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 87 ff*.
F. domestica. Gebiss: 6, XVII, 56 ff*.
Galictis barbara. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 168 ff*.
Gulo luscus. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 173 ff.
Hyaena. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 151 ff.
Icticyon venaticus. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 225 ff*.
Lutrinae. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 199 ff*.
Meles. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 183 ff*.
Mellivora. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 177 ff.
Mustelidae. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 162 ff*. 262 ff.
Mydaus meliceps. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 188 ff*.
Nycterentes. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 216 ff.
Otocyon megalotis. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 219 ff*.
Phoca groenlandica. Gebiss: 6, XVII, 62 ff*.
Potamotherium Valetoni. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 240 ff*.
Proailurus Lemanensis. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 250 f*.
Procyonidae. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 128 ff*.
Proteles. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 157 ff.
Suricata tetradactyla. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 115 ff*.
Ursidae. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 144 ff.
Viverridae. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 107 ff*.
Zorilla libyca. Wirbelsäule: 15, XXXVI, 193 ff*.

Homo.

Gebiss: 6, XVII, 124 ff*. Drei Grönländerschädel: 8, XX, 84 ff* (Sommer).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

2. Namen- und Sach-Register.

Die Originalmitteilungen der Autoren sind gesperrt gedruckt.

A.

Abbot. Papilio: 3, VIII, I, 81.
Adlerz, G. Psychologie der Ameisen: 11. XXVI, 2 f. 95.
Adolph, G. E. Insektenflügel: 3, VIII, I, 7.
Agassiz, A. Organisches Leben in grösseren Meerestiefen: I, I. 3.
— Tiefseefauna: I, 46. 48.
— Tiefseefischerei des Challenger: I, 46.
— Arachnactis: 8, XX, 3 u. ö.
— Margelidae: 7, XIX, 16. 23.
— Loboerocis: 1, III, 15.
Agassiz, L. Desmonema: I, III, 17 f.
Ahrens, A. Leucochloridium: I, IV, 6. 12.
Albert I, Fürst von Monaco. Fauna des Meeresgrundes: 7, XIX, 258.
— Pelagische Tiere: 7, XIX, 211.
Alenitzin, W. Frontonia: I, V, 41.
Allman, G. J. Sarsia: 7, XIX, 5.
— Bryozoen, Längs- u. Quermuskeln der Leibeswand: 2, VI, 28.
— Süsswasserbryozoen als Bewohner der Oberfläche: 2, VI, 15.
— Paludicella: 2, VI, 124. 127.
— Phylactolaemata, Spermatogenesis: 10, XXIII, 6; Eier: 10, XXIII, 17; Knospung: 2, VI, 17; Tentakeln: 2, VI, 55; Nervensystem: 2, VI, 57; Oesophagus: 2, VI, 58; Statoblasten: 2, VI, 68. 74.
— Plumatella: 2, VI, 3; Plum. fruticosa: 2, VI, 121.
Anderson, J. Erinaceidae: 15, XXXVII, 21. 55. 56 u. ö.
André, E. Psychologie der Ameisen: 11, XXVI, 3.
Andres, A. Echinorhynchus: 2, VII, II, 76. 88.
Anpassung, s. Mimicry.
Apstein, C. Oikopleura: 8, XX, 31.
Arndt, R. Spezifische Sinnesorgane: 7, XVIII, 16 f.
Aronsohn, E. Geruch: 7, XVIII, 49 f. 55 f.
Artari. Rhizopoda: 4, XII, 70. 80.
Asper, G. Vordringen des Lichtes im Wasser: I, 59.
— Bryozoen der Alpenseen: 2, VI, 15.
Attems, C. Maxillen der Arthropoden: 13, XXXIII, 65.
Auerbach, L. Spermatozoen: 10, XXIII, 7. 10.
Augen. Iridopigmentäre und retinopigmentäre A.: 7, XIX, 242 ff.
— A. der Polyphemiden: 11, XXVIII* (Miltz).
— Entwickelung der A. bei Scolopendra: 13, XXXIII, 150 ff*.
— Gesichtssinn der Ameisen: 11, XXVI, 34 ff*.
— Zahl der Facetten im Ameisenauge: 11, XXVI, 48.
— Rudimentäre A. der Wirbeltiere: 4, XIII* (Kohl); 5, XIV* (Kohl).
Aurivillius, Ch. Lepidoptera, Duftorgane: 15, XXXVIII, 25.

B.

Baird, W. Diaptomus: 8, XXI, 37.
Balbiani, G. Infusoria: I, V, 2.
— Didinium nasutum: I, V, 15 f.
— Frontonia: 1, V, 38.
Balfour, F. Peripatus: 3, IX, 31. 37 f.
Ballowitz, E. Zahnbildung: 6, XVII, 8. 108. 113.
Baltzer, C. Echinorhynchus: 2, I, VII, 21 f. 25 f. 28. 32. 33 f. 42. 61. 91 f; 2, VII, II, 4 f. 7. 77.
Barrois, J. Bryozoenlarven, Homologie: 10, XXIII, 82 f.
— Phylactolaemata, Larve: 2, VI, 120 f. 122 f.; Entoderm: 10, XXIII, 77 f.
Barrois, J. Darmbildung bei Alcyonidium: 2, VI, 46. 127; bei Lepralia: 2, VI, 48.
— Masse graisseuse bei Gymnolaemen: 2, VI, 126.
— Lepralia, Mesodermbildung: 10, XXIII, 81.
Barrois, Th. Hydrachniden: 9, XXII, 21 ff.
Bate, Spence. Tiefseefischerei: I, 45.
Bates, H. W. Mimicry: 3, VIII, II, 1 f. 13. 16 ff. 83. 98 u. ö.
— Papilio: 3, VIII, I, 76.
Baume. Zahnbildung: 6, XVII, 8 ff. 12 u. ö.
Behrens. Mimicry: 3, VIII, II, 4.
Beneden, van. Echinorhynchus: 2, VII, II, 118. 133.
— Asellus aquaticus: 3, X, 9 f.
Beneden, Ed. van. Arachnactis: 8, XX, 3 u. ö.
Beneden, P. J. van. Hydrachniden: 9, XXII, 9.
Bergh, R. S. Nervenzellen von Aulostoma: 13, XXXIV, 26 f.
Berlese, A. Hydrachniden: 9, XXII, 20.
Berthold, G. Vertikale Verbreitung der Meeresalgen: I, 60.
Bertkau, Ph. Lepidoptera, Duftorgane: 15, XXXVIII, 16. 19.
Bethe, A. Ameisen als Reflexmaschinen: 11, XXVI, 1. 3. 4 ff. u. ö.
Bidder. Geruch: 7, XVIII, 55.
Biedermann, R. Tintinnen: 8, XX, 47 ff.
Bichringer. Sporocysten: 1, IV, 16. 19.
Bilharz. Echinorhynchus: 2, VII, I, 57.
Biocrystallisation: 7, XIX, 73 ff.; 10, XXIII, 81.
Bismarck-Archipel. Lepidopterenfauna: 11, XXVII* (Pagenstecher).
Blainville, de. Echinorhynchus: 2, VII, 1, 36; 2, VII, II, 1.
— Wirbelsäule der Raubtiere: 15, XXXVI, I.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Blainville, de. Zahnwechsel: 6, XVII, 11. 45. 50.
Blanchard, R. Trematodes: 6, XVI, 153. 173.
— Distomum: 6, XVI, 78.
Blanford, W. T. Erinaceus: 15, XXXVII, 86.
Blankaart, S. Cyclopiden: 4, XI, 1.
Blaue, J. Riechen und Schmecken: 7, XVIII, 61 f.
Bloch, M. E. Echinorhynchus: 2, VII, I, 20. 36.
Blochmann. Trematodes: 6, XVI, 236.
Bloomfield, J. E. Lumbricus, Spermatogenesis: 10, XXIII, 10.
Blumberg. Amphistomum: 6, XVI, 142. 206.
Blutbildung bei Scolopendra: 13, XXXIII, 78 ff.
Boeck, A. Cyclops: 8, XXI, 158 f.
Böhm, R. Knospung der Margeliden: 7, XIX, 10. 14 ff. 24. 30. 33 ff.
Bösenberg, W. Die Spinnen Deutschlands: 14, XXXV*.
Boettger, O. Mimicry: 3, VIII, II, 78.
Bojanus, L. Echinorhynchus: 2, VII, II, 20. 71.
Boisduval. Tagfalter: 11, XXVII, 4. 37. 40 u. ö.
— Papilio: 3, VIII, I, 92.
Bovallius, C. Phronima: 7, XIX, 109 u. ö.
— Amphipoda Hyperiidea: 7, XIX, 111 f.
— Mimonectes: 3, VIII, II, 4.
Boveri, Th. Arachnactis: 8, XX, 3 u. ö.
Brady, G. S. Cyclops: 4, XI, 98 u. ö.; 8, XXI, 149.
— Harpacticidae: 5, XV, 24 u. ö.
— Centropagidae: 8, XXI, 38. 40 u. ö.
— Ostracoda: 12, XXX, 8 u. ö.
Braem, F. Knospung der Hydroiden: 7, XIX, 29.
— Untersuchungen über die Bryozoen des süssen Wassers: 2, VI*.
— Die geschlechtliche Entwickelung von Plumatella fungosa: 10, XXIII*.
Brandes, G. Trematodes: 6, XVI, 119 ff. 124. 225.
— Argyropelecus, Leuchtorgane: 13, XXXII, 1. 52 54 u. ö.
Brandt. Soricidae, Gebiss: 6, XVII, 47.
Brandt, C. Schwebvermögen pelagischer Tiere: 7, XIX, 100.
— Tiefseefauna des Mittelmeeres: I, 49.
— Zoochlorella: I, V, 40.
— Radiolarien: I, 61.
— Tiefsee-Radiolarien: I, 7 ff.
— Leuchten der Radiolarien: 7, XIX, 210.
— Die Tintinnen (der Grönlandexpedition): 8, XX, 45 ff*.
Breitenbach, W. Sinnesorgane des Schmetterlingsrüssels: 7, XVIII, 112.
Brauer, A. Coelom bei Scorpio: 13, XXXIII, 141.
Brauer, F. Mimicry: 3, VIII, II, 77 f.
Braun, M. Trematodes: 6, XVI, 119. 124 f. 145. 171. 173 u. ö.
— Distomum: 6, XVI, 21.
Brunn, von. Zahnbildung: 6, XVII, 7.
Brunner, C Mimicry: 3, VIII, II, 9.
— Blattidae: 3, VIII, II, 6.
Brutpflege. Sphaeromidae: 3, X, 24 ff*.
— Scolopendra: 13, XXXIII, 4 ff.
Brazelius, R. M. Hydrachniden: 9, XXII, 9 f.
Buchholz, R. Balanus: 7, XIX, 84. 87. 90.
— Hemioniscus: 3, X, 24.
Bürger, O. Darmbildung bei Chalicodoma: 13, XXXIII, 204.
Bütschli, O. Infusoria: 1, V, 2 ff.
— Verschiebung des Mundes bei Infusorien: 1, V, 34.
— Cyttarocylis: 8, XX, 48.
— Didinium Balbianii: 1, V, 16 f.
— Dileptus: 1, V, 24.
— Dinophrya: 1, V, 19.
— Lembadion: I, V, 57.
— Nassula: 1, V, 31.
— Prorodon teres: 1, V, 14.
— Urocentrum: 1, V, 51. 53. 54
— Distomum: 6, XVI, 89. 206.
Bullar. Cymothoidae: 3, X, I.
Burmeister, H. Hydrachniden: 9, XXII, 6.
— Papilio: 3, VIII, I, 2.
Burow, C. H A. Acanthocephalen: 2, VII, I, 24. 36; 2, VII, II, 1. 21. 71. 116.
Busch, W. Sarsia: 7, XIX, 10.
— Margeliden: 7, XIX, 14.
Butler. Tagfalter: 11, XXVII, 4 f. 29 u. ö.

C.

Calandruccio, S. Echinorhynchus: 2, VII, II, 135.
Canestrini, S. Hydrachniden: 9, XXII, 25 f.
Canu, E. Eurytemora: 8, XXI, 100. 108.
— Cyclops: 8, XXI, 149.
Carpenter, W. B. Tiefenfauna des Mittelmeeres: I, 48.
— Tomopteris: I, 21.
Carrière, J. Facettenauge: 11, XXVIII, 25 ff. 31. 33.
— Auge von Petromyzon: 4, XIII, 4 f.
Carter, H. J. Urocentrum: 1, V, 53.
— Spongia: 10, XXIV, I, 3. 5. 47; 10, XXIV, II, 6. 11 f.
Carus, C. G. Leucochloridium: 1, IV, 5 ff. 12.
— Zirkulation der Leibeshöhlenflüssigkeit bei Plumatella: 10, XXIII, 95.
Caspary, R. Plumatella: 2, VI, 2. 3.
Cerebrum, s. Gehirn.
Chabry. Zahnbildung: 6, XVII, 6 ff. 44. 83. 108 f. 115.
Chamisso, A. von. Oikopleura: 8, XX, 42.
Chierchia, G. Tiefseefauna: I, 46.
— Finder von Tiefsee-Siphonophoren: I, 1.
— Medusen: 1, III, 5 f.
Christoph. Hypermnestra: 3, VIII, I, 110.
Chun, C. Die pelagische Tierwelt in grösseren Meerestiefen und ihre Beziehungen zu der Oberflächenfauna: I*.
— Atlantis. Biologische Studien über pelagische Organismen: 7, XIX*.
— Leuchtorgane und Facettenaugen: 7, XIX, 191 ff*.
— Mimicry: 3, VIII, II, 159.
— Knospung der proliferierenden Medusen: 7, XIX, 1 ff*.
— Knospenfolge bei Halistemma: 2, VI, 44.
— Ctenophoren: 8, XX, 15 u. ö.
— Auricularia nudibranchiata: 7, XIX, 53 ff*.
— Kalkrädchen der Auricularien: 10, XXIII, 81.
— Augen der Tiefseecrustaceen: 11, XXVIII, 5 ff. u. ö.
— Pelagische Tiefsee-Schizopoden: 7, XIX, 137 ff*.
— Mimonectes: 3, VIII, II, 4.
— Sekundäre Geschlechtscharaktere der Männchen von Phronima: 7, XIX, 107 ff*.
— Nauplien der Lepaden: 7, XIX, 77 ff*.
Cilien. Bestimmung der Zahl bei Infusorien: 1, V, 66 f.
— Wimperzellen der Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 29 ff*.
— Cilienbildung: 10, XXIII, 58 f*. 81.
Claparède, E. Infusoria: 1, V, 2. 8.
— Cinetochilum: 1, V, 49.
— Cyclidium: 1, V, 62.
— Lembadion: 1, V, 57.
— Pleuronema: 1, V, 60.
— Lizzia: 7, XIX, 43 f.
— Tomopteris: I, 21.
— Lepaden: 7, XIX, 84.
— Hydrachniden: 9, XXII, 10.
Claus, C. Spiraldrehung des Stammes der Siphonophoren: I, 15.
— System der Rhizostomen: I, III, 36 ff.
— Evadne: 7, XIX, 255.
— Süsswasser-Copepoden Deutschlands: 4, XI, 6 f. u. ö.; 5, XV, 17 u. ö.; 8, XXI, 11 u. ö.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Claus, C. Phronimiden: I, 29; Phronima: 7, XIX, 109 u. ö.
— Platysceliden: I, 29.
— Lepaden: 7, XIX, 91 f. 95. 98 f.
— Cladoceren-Auge: 11, XXVIII, 15 f. 20 u. ö.
— Schizopoden-Auge: 7, XIX, 219 u. ö.
— Euphausia, Leuchtorgane: 7, XIX, 197. 202 u. ö.
Cloquet, J. Echinorhynchus: 2, VII, 1, 20. 36. 58. 88; 2, VII, II, 21. 71.
Cobbold, F. Echinorhynchus: 2, VII, II, 118.
Coelom. Bildung und Gliederung bei Arthropoden: 13, XXXIII, 87 ff*.
Cohn, Ferd. Infusoria: 1, V, 2 ff.
— Cyclidium: 1, V, 64.
— Nassula: I, V, 31.
Configliachi und Rusconi. Auge von Proteus: 4, XIII, 67.
Cori, J. Phylactolaemata, Reifung der Geschlechtsprodukte: 2, VI, 118; Excretionsöffnung: 2, VI, 53 f.; 10, XXIII, 20.
Cragin, F. W. Cyclops: 8, XXI, 155.
Cranium. 3 Grönländerschädel: 8, XX, 84 ff*. (Sommer).
Creplin. Acanthocephalen: 2, VII, I, 20. 24. 36. 58.
Creutzburg. Distomum: 6, XVI, 109.
Croneberg, A. Hydrachniden: 9, XXII, 19.
Cunningham, J. T. Nyctiphanes, Leuchtorgane: 7, XIX, 199. 203 u. ö.
Cunningham, R. O. Ascidien: 12, XXXI, 14 u. ö.

D.

Daday, E. von. Cyclops: 4, XI, 40 u. ö.; 8, XXI, 162 f.
— Canthocamptus: 5, XV, 22 u. ö.
— Diaptomus: 8, XXI, 31. 38 u. ö.
Dana, J. D. Leuchten der Euphausien: 7, XIX, 196 f. 203.
Danneil. Schmetterlinge des Bismarck-Archipels: 12, XXIX, 2 f.
Davenport, C. B. Obelia: 7, XIX, 27.
— Bryozoenlarven, Homologie: 10, XXIII, 83 f.
— Knospenfolge bei Phylactolämen und Gymnolämen: 10, XXIII, 88.
— Phylactolaemata, Eier: 10, XXIII, 17; Embryonalentwickelung: 10, XXIII, 45. 50; Gastrulation: 10, XXIII, 77 ff.
— Cristatella-Embryo: 10, XXIII, 85.
De Geer, C. Hydrachniden: 9, XXII, 2 f.
Dendy. Spongia: 10, XXIV, I, 4. 47 u. ö.; 10, XXIV, II, 10. 13 u. ö.
Desfosses, M. Auge von Proteus: 4, XIII, 69.
Dewitz. Papilio: 3, VIII, I, 100.
Diesing, K. M. Infusoria: 1, V, 2.
— Trematodes: 6, XVI, 242.
— Leucochloridium: I, IV, 8.
— Rhopalophorus: 2, VII, I, 93. 124.
Dietze, C. Mimicry: 3, VIII, II, 20 f.
Dimorphismus, geschlechtlicher. Heterodera Schachtii: 1, II, 13 ff.
Dissogonie der Ctenophoren: I, 62 ff.
Distant, W. L. Mimicry: 3, VIII, II, 130 f.
Dobson, G. E. Zahnbildung: 6, XVII, 50 f.
— Erinaceidae: 15, XXXVII, 21. 60 u. ö.
Döderlein. Spongia: 10, XXIV, I, 4 f. u. ö.
— Zahnbildung: 6, XVII, 149 f.
Dohrn, A. Archizoëa gigas: 1, 25; 7, XIX, 80 u. ö.
— Anceus: 3, X, 24.
— Asellus: 3, X, II. 37.
— Salpa maxima in Grundnetzen: I, 42.
Doppelknospe. Phylactolaemen: 2, VI, 19 ff*.; 10, XXIII, 54 f*.
Dorsalorgan. Entwickelung bei Scolopendra: 13, XXXIII, 157 f*.
Dottersubstanz bei Paludicella: 2, VI, 126.
— D. des Statoblasten: 2, VI, 76. 97 ff. Ihre Beziehung zu den Organen des Embryo: 2, VI, 103 f.
Dotterzellen. Distomum: I, IV, 27 f. 39.
Dreyer, E. Kalkkörper: 7, XIX, 67. 74 f.
Driesch, H. Phylogenetische Methodik: 15, XXXVII, 2 f.
Drüsen der Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 14 ff*. 27 ff*.
— Entwickelung bei Scolopendra: 13, XXXIII, 98 ff*. Siehe auch Duftorgane.
Dubois, R. Chemischer Sinn der Mollusken: 7, XVIII, 163 ff. 169 ff.
Dufour, L. Chilopoda: 3, IX, 2.
Duftdrüsen, Duftschuppen, s. Duftorgane.
Duftorgane der männlichen Schmetterlinge: 15, XXXVIII* (Illig).
Dugès, A. Hydrachniden: 9, XXII, 6 f.
Dujardin, F. Infusoria: 1, V, 2.
— Cyclidium: I, V, 62.
— Lionotus: 1, V, 20.
— Panophrys: I, V, 41.
— Uronema: I, V, 45.
— Leucochloridium: I, IV, 8.
— Echinorhynchus: 2, VII, II, I. 72. 107. 117.
— Hydrachniden: 9, XXII, 8.
Duvernoy. Oniscidae: 10, XXV, 8 ff.
— Soricidae, Gebiss; 6, XVII, 47.

E.

Eberhard, E. Siagonophorus: 1, V, 19.
Ebner, V. von. Kalkkörper: 7, XIX, 73 f.
Edwards, s. Milne E.
Ehrenberg, Chr. Infusoria: 1, V, 2.
— Colpidium: I, V, 44.
— Glaucoma: I, V, 35.
— Leucophrys: I, V, 65.
— Prorodon teres: I, V, 14.
Ei. Zwei Zonen im Plasma: 2, VI, 114 f*.; 10, XXIII, 17 f*. 31 ff*. 36*.
— Chromatische Körnchen im Plasma: 2, VI, 114 f*.; 10, XXIII, 17 f*. 31 f*. 35 f*. 39 ff*. 72 f.
— Contractile Vacuolen im Keimfleck: 10, XXIII, 15 f. 71.
— Amöboide Formveränderungen des Keimflecks: 10, XXIII, 16. 71.
— Bisquitförmige Gestalt des Keimflecks: 10, XXIII, 16 f. 71 f.
— Distomum macrostomum: 1, IV, 38 f*.
— Verhältnis der Eizellen zu den Keimballen der Trematoden: I, IV, 52.
— Siehe auch Kern.
Eibildung. Distomum: 1, IV, 28.
— Heterodera Schachtii: 1, II, 29 f.
— Echinorhynchus: 2, VII, II, 83 ff*.
— Tomopteris: I, 21 ff*.
— Plumatella: 10, XXIII, 13 ff*.
— Isopoda: 3, X, 9 ff*.
Eichhorn. Tentakeln der Phylactolaemen: 2, VI, 55.
— Plumatella: 2, VI, 2.
Eimer, Th. Wechselsinnesorgane: 7, XVIII, 27.
— Papilio, Zeichnung: 3, VIII, I, 11 ff. 30 ff. 82. 112.
Eisen, G. Vexillaria speciosa: 1, 38.
Eisig, H. Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 12. 32.
— Sinnesorgane der Capitelliden: 7, XVIII, 153.
— Speicheldrüsen der Tracheaten: 3, IX, 15 f.
— Darmblatt bei Insekten: 13, XXXIII, 210 f.
— Chilopoda: 3, IX, 17. 19.
Elditt. Plumatella: 2, VI, 2.
Ellermann. Wimperzellen: 13, XXXIV, 33.
Emery, C. Psychologie der Ameisen: II, XXVI, 1 f. 80 f.
Encystierung. Distomum macrostomum: I, IV, 61 f*.
Entz, G. Infusoria: 1, V, 2.
— Codonella: 8, XX, 47.
— Nassula: I, V, 28.
— Urocentrum: 1, V, 54.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Epiphysis cerebri, s. Pinealorgan, Parapinealorgan.
Ercolani. Cercaria armata: 6, XVI, 237. 241.
Escherich, K. Keimblätter der Insekten: 13, XXXIII, 213 ff.
Eschscholtz. Pelagia flaveola: 1, III, 13.
Eskimos, s. Grönländer.
Exner, S. Facettenaugen: 7, XIX, 194. 231 u. ö.; 11, XXVIII, 5. 48 ff.

F.

Fabre, M. Scolopendra: 13, XXXIII, 2.
— Genitalien v. Scolopendra: 13, XXXIII, 189.
Fabre-Domergue, P. Frontonia: 1, V, 41.
— Monodinium Balbianii: 1, V, 17.
— Pleuronema: 1, V, 60.
Fabricius, O. Grönländische Ctenophoren: 8, XX, 15 u. ö.
Facettenauge, s. Augen.
Fauna des Meeresgrundes. Ernährung: I, 49; Herkunft: I, 49.
— Pelagische Fauna der Oberfläche: I, 60 ff. Periodisches Auf- und Absteigen der pelagischen F.: I, 50 ff. Vertikale Verbreitung derselben: I, 44 ff.
— Spezialfaunen s. unter der betreffenden Tiergruppe.
Faussek, V. Keimblätter der Cephalopoden: 13, XXXIII, 212 f.
Faxon, W. Tiefseecrustaceen: 7, XIX, 258.
Felder. Phaedyma: 11, XXVII, 84.
Felder, C. u. R. Mimicry: 3, VIII, II, 83. 89.
— Papilionidae: 3, VIII, I, 16. 22 ff. 30 ff. u. ö.
Fettkörper. Bildung bei Scolopendra: 13, XXXIII, 84 ff.
Fewkes, W. Margelidae: 7, XIX, 23.
Fickert, C. Papilionidae: 3, VIII, I, 22 f. 29. 71.
Filhol, M. H. Erinaceidae: 15, XXXVII, 56.
Fischer. Trematodes: 6, XVI, 151. 197.
Fischer, S. Copepoda: 4, XI, 6 u. ö.; 5, XV, 22 u. ö.; 8, XXI, 22.
— Cyclops: 8, XXI, 152. 160 f.
— Centropagidae: 8, XXI, 59 ff. 88 ff. u. ö.
Flemming. Sinneszellen der Molluskenhaut: 7, XVIII, 159 f. 167.
Flimmerepithel: 7, XVIII, 12.
Flimmerzellen, s. Cilien.
Flora, pelagische. Vertikale Begrenzung nach unten: I, 58 ff.
Flower. Säugetiere, Gebiss: 6, XVII, 67. 83.
Flügelgeäder. Lepidoptera: 3, VIII, I, 2 ff*.
Fol, H. Vordringen des Lichtes im Wasser: I, 58 f.
— Atrophie bei geschlechtsreifen Appendicularien: I, 39.
— Oikopleura: I, 38; 8, XX, 30.
Forbes, E. Organisches Leben in grösseren Meerestiefen: I, I.
— Sarsiaden: 7, XIX, 9 f.
— Margeliden: 7, XIX, 14.
— Cyclops: 8, XXI, 150. 153.
Forbes, H. O. Mimicry: 3, VIII, II, 81.
Forbes, S. A. Cyclops: 8, XXI, 159.
Forel, A. Geruchssinn: 7, XVIII, 45. 49 50; Geruchssinn der Käfer: 7, XVIII, 91.
— Geschmacksorgane der Insekten: 7, XVIII, 125 ff.
— Fühler der Lepidopteren: 7, XVIII, 104 f.
— Psychologie der Ameisen: 11, XXVI, 1 f. u. ö.
Forel, F. A. Vordringen des Lichtes in Schweizer Seen: I, 58.
— Auf- und Absteigen pelagischer Süsswassertiere: I, 52.
— Bryozoen der Alpenseen: 2, VI, 15.
Fraipont. Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 29. 37.
Fraisse. Isopoda: 3, X, 24.
Frenzel, J. Untersuchungen über die mikroskop. Fauna Argentiniens, Teil I: Die Rhizopoden und Helioamöben: 4, XII*.
Frey, J. Cyclopidae: 8, XXI, 164 ff.
Frič, J. Al. Cyclops: 4, XI, 35. 39.
— Canthocamptus: 5, XV, 19.
— Diaptomus: 8, XXI, 37.
Friedrich. Oniscidae: 3, X, 2. 13 ff.
Fromentel, E. Infusoria: 1, V, 2.
Froschammer, J. Mimicry: 3, VIII, II, 131.

G.

Gaffron, E. Distomum: 6, XVI, 143. 145 ff. 150. Nervensystem von Distomum: 1, IV, 36.
— Peripatus: 3, IX, 35.
Gahan, Ch. J. Mimicry: 3, VIII, II, 160.
Gaillard, Cl. Erinaceidae, Gebiss: 15, XXXVII, 24. 25. 27.
Gallen. Grönländische G.: 8, XX, 103 ff*. (Rübsaamen).
Ganin, J. Embryonalentwickelung bei Nematoden: 1, II, 37 f.
Gazagnaire, J. Geschmacksorgan der Käfer: 7, XVIII, 76.
Gebiss. Stammesgeschichtl. Bedeutung des Milchgebisses: 15, XXXVII, 42 ff.
Gebiss. Progressive Entwickelung des G.: 15, XXXVII, 44 ff.
— Siehe auch Zahnsystem.
Geer, C. de. Hydrachniden: 9, XXII, 2 f.
Gefässsystem. Entwickelung bei Scolopendra: 13, XXXIII, 78 ff*.
Gehirn von Argyropelecus: 13, XXXII, 6 ff*.
— Siehe auch Nervensystem.
Gegenbaur, C. Rhizophysa: I, 16.
Gehörorgan von Argyropelecus: 13, XXXII, 50 f*.
Genitalorgane, Genitalzellen, siehe Geschlechtsorgane, Geschlechtszellen.
Geruch, s. Sinnesorgane.
Gerstäcker, A. Mimicry: 3, VIII, II, 2. 7 f. 11. 16. 78. 159.
— Facettenauge: 11, XXVIII, 7. 37.
— Phronima: 7, XIX, 112.
— Isopoda, Brutpflege: 3, X, 42.
— Sphaeroma: 3, X, 3.
— Schizopodenaugen: 7, XIX, 193. 260.
— Verbreitung der Mysideen: 7, XIX, 185.
Geschlechtsorgane. Entwickelung bei Arthropoden: 13, XXXIII, 185 ff.
— Entwickelung bei Scolopendra: 13, XXXIII, 169 ff.
Geschlechtszellen. Bildung der G. bei Arthropoden: 13, XXXIII, 30.
— Siehe auch Ei, Eibildung, Spermatogenesis.
Geschmack, s. Sinnesorgane.
Gesichtssinn, s. Augen, auch Sinnesorgane.
Gibraltar. Tiefe der Meerenge: I, 48.
Giebel. Säugetiere: 6, XVII, I.
Giesbrecht, W. Tiefsee-Untersuchungen von Chun: 7, XIX, S. III.
— Copepoden: 4, XI, 15. 18 u. ö.; 5, XV, 9 u. ö.; 7, XIX, 243. Tiefsee-Copepoden: I, 25 ff. Leuchten der Copepoden: 7, XIX, 210.
— Centropagidae: 8, XXI, 5 ff. u. ö.
— Calanidae: 8, XXI, 145.
Giglioli, E. Tiefsee-Untersuchungen: I, 48
— Verticale Begrenzung der Tiefseefauna: I, 57.
Godman. Tagfalter: 11, XXVII, 4 f. u. ö.
— Papilio: 3, VIII, I, 77. 81.
Goette, A. Pelagia: 1, III, 12 f.
— Furchung und Keimblattbildung bei Nematoden: 1, II, 34. 37 f.
Goeze, J. A. E. Echinorhynchus: 2, VII, I, 20. 33. 36. 58. 88; 2, VII, II, 70, 116.
Goodrich, E S. Segmentierung des Arthropodenkopfes: 13, XXXIII, 136.
Goto, S. Laurer'scher Kanal: 6, XVI, 234 f.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Graber, V. Geruch und Geschmack: 7, XVIII, 45 ff.
— Riechen im Wasser: 7, XVIII, 56 f. 59.
— Chemischer Sinn bei Hirudo: 7, XVIII, 143.
— Geruchssinn der Käfer: 7, XVIII, 91 f.
— Geschmackssinn von Triton: 7, XVIII, 191.
— Herz der Insekten: 3, IX, 24.
Grassi, B. Echinorhynchus: 2, VII, II, 135.
— Scolopendrella: 3, IX, 35.
Gray. Sericinus: 3, VIII, I, 106.
Greeff, R. Rhizopoda: 4, XII, 72. 87. 91.
— Echinorhynchus: 2, VII, I, 1. 24 f. 38. 89. 125; 2, VII, II, 2. 17. 23. 55. 59. 74. 92. 108. 133 f.
— Alciopa: I, 24. 25.
— Tomopteris: I, 21. 24.
Grenacher, H. Facettenaugen: 7, XIX, 194. 213 u. ö.; II, XXVIII, 40.
Grobben, C. Facettenauge: II, XXVIII, 36 ff.
— Cirripedien: 7, XIX, 95 f.
Grönlandexpedition. Zoologische Ergebnisse: 8, XX*.
Grönländer. Schädel: 8, XX, 84 ff*.
Groom, Th. Cirripedia, Entwickelung: 7, XIX, 80 u. ö.
Groos. Spiele der Tiere: 11, XXVI, 87.
Gruber, A. Amoeba: 4, XII, 2. 22. 93 u. ö.
— Copepoden Deutschlands: 4, XI, 7 u. ö.; 8, XXI, 21 u. ö.
— Infusoria: 1, V, 2.
Grützner. Flimmerepithel: 7, XVIII, 12.
Guerne, J. de. Centropagidae: 8, XXI, 49 u. ö.
Guppy. Cassiopeia: 1, III, 26.

H.

Haan, W. de. Papilionidae: 3, VIII, I, 49 f. 57; 3, VIII, II, 82.
Haase, E. Chilopoden-Entwickelung: 13, XXXIII, 70.
— Geophilidae: 3, IX, 17.
— Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlage eines natürlichen Systems der Papilioniden: 3, VIII*.
Haddon. Gymnolaemata, Polypidbildung: 10, XXIII, 95.
Haeckel, E. Panpsychismus: 11, XXVI, 4.
— Sinnesorgane: 7, XVIII, 2. 16. 29. 31 f. 35.
— Radiolarien: I, 11. 45.
— Entwickelung von Physophora: I, 15.
— Medusen: 1, III, 7. 11 f. 13 f. 15 u. ö.
— Margelidae: 7, XIX, 10. 16. 23.
— Sarsia: 7, XIX, 4 ff.
Häcker, V. Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 12.
Hagen, B. Tagfalter: 11, XXVII, 6. 29. 30. 41 u. ö.
Haller, B. Lobus lateralis thalami: 13, XXXII, 8.
Haller, G. Hydrachniden: 9, XXII, 13.
Hallez, P. Furchung bei Nematoden: 1, II, 34.
Hamann, O. Acanthocephalen: 2, VII, I, 57; 2, VII, II, 143 ff.
Hampson. Heterocera: 11, XXVII, 2; 12, XXIX, 3 ff.
Handlirsch, A. Mimicry: 3, VIII, II, 10.
Handrick, K. Zur Kenntnis des Nervensystems u. der Leuchtorgane des Argyropelecus hemigymnus: 13, XXXII*.
Hanstein, R. von. Wechselsinnesorgane: 7, XVIII, 25 f. 31.
Harger. Sphaeroma: 3, X, 3. 26 f.
Harmer, S. F. Alcyonidium: 10, XXIII, 84.
— Cyclostomata, Keimblattbildung: 10, XXIII, 79 f.
— Lichenopora: 10, XXIII, 76.
Harris, G. Auge von Myxine: 4, XIII, 48.
Hartert, E. Mimicry: 3, VIII, II, 10.
Hartmann, E. von. Spezifische Sinnesorgane: 7, XVIII, 16.
Hartwig, W. Cyclops vernalis: 8, XXI, 151.
— Diaptomus: 8, XXI, 66. 71.
Hatschek, B. Segmentierung der Anneliden: 13, XXXIII, 59 ff.
— Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 10. 12. 29. 31 u. ö.
— Knospung der Phylactolaemen: 2, VI, 19. 22 f.
— Herz der Arthropoden: 3, IX, 31.
Hauser. Fühler der Lepidopteren: 7, XVIII, 104 ff.
— Fühler der Hymenopteren: 7, XVIII, 98 ff.
Haut der Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 13 f*.
— Entwickelung der Haut und der Hautdrüsen bei Scolopendra: 13, XXXIII, 98 ff*.
Hautsinnesorgane von Argyropelecus: 13, XXXII, 41 ff*.
Heathcote, F. G. Augen bei Julus: 13, XXXIII, 155.
— Julus, Speicheldrüsen: 3, IX, 15.
Heckert, G. Leucochloridium paradoxum. Monographische Darstellung der Entwickelungs- und Lebensgeschichte des Distomum macrostomum: 1, IV*.
— Leucochloridium: 6, XVI, 151. 179 u. ö.
Heider, C. Darmbildung bei Insekten; 13, XXXIII, 226.
Heller, C. Cyclops: 4, XI, 105. 165.
— Pieridae: 11, XXVII, 35. 37.
Henle. Echinorhynchus: 2, VII, II, I.
Hennings, C. Tömösvary'sches Organ: 13, XXXIII, 122.
Hensel. Zahnbildung: 6, XVII, 135.
— Leucochloridium: 1, IV, 12.
Herbst, C. Beiträge zur Kenntnis der Chilopoden: 3, IX*.
Herdman, W. A. Ascidien: 12, XXXI, 2 f. 4 f. 13 ff. u. ö.
Hermann, J. F. Hydrachniden: 9, XXII, 4.
Herrick, C. L. Cyclops: 4, XI, 60 u. ö.: 8, XXI, 151. 153.
— Canthocamptus: 5, XV, 19 u. ö.
— Centropagidae: 8, XXI, 38. 88 u. ö.
Hertwig, O. Spezifische Energie der Zelle: 7, XVIII, 22.
Hertwig, O. u. R. Wechselsinnesorgane: 7, XVIII, 27.
— Enterocoelie der Lepidopteren: 13, XXXIII, 215 f.
Hertz. Zahnbildung: 6, XVII, 8. 16.
Hess, C. Auge von Proteus: 4, XIII, 70 f. 74. 77 u. ö.
— Auge von Talpa: 5, XIV, 7 f. 65.
Hesse, R. Sinnesorgane der Lumbriciden: 7, XVIII, 150 (Citat und Originalnotiz).
— Cyclops: 8, XXI, 156.
— Sphaeroma: 3, X, 2 f. 25 f. 33.
Heymons, R. Die Entwickelungsgeschichte der Scolopender: 13, XXXII*.
Hilgendorf. Spongia: 10, XXIV, I, 4 f.
Hirn, s. Gehirn.
Hoek, P. P. C. Cyclops: 4, XI, 62 u. ö.
— Eurytemora: 8, XXI, 105. 110.
Hofer, B. Plankton: 7, XIX, 251 f. 259.
— Blatta: 3, IX, 38.
Hoffmann. Zahnbildung: 6, XVII, 143. 155.
Honrath. Tagfalter: 11, XXVII, 29. 59 f. 74 f.
— Acraea: 11, XXVII, 6. 59.
Hoppe-Seyler. Diffusion von Gasen im Wasser: 7, XVIII, 193.
Horsfield, Th. Papilionidae: 3, VIII, I, 21; 3, VIII, II, 98.
Hübner. Papilio: 3, VIII, I, 76. 99.
Hyatt, A. Phylactolaemata: 10, XXIII, 95.
Hypophysis cerebri von Argyropelecus: 13, XXXII, 8*.

J.

Jäger, G. Geruch: 7, XVIII, 56.
Jägerskiöld. Trematodes: 6, XVI, 205.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

James-Clark, H. Urocentrum: I, V, 54.
Janet, Ch. Gliederung des Insektenkörpers: 13, XXXIII, 63.
— Psychologie der Ameisen: 11, XXVI, 3. 9. 54.
Jaržinsky, Th. Echinorhynchus: 2, VII, II, 2 f.
Ihering, von. Atta sexdens: 11, XXVI, 117 f.
Illig, K. G. Duftorgane der männlichen Schmetterlinge: 15, XXXVIII*.
Imhof, O. E. Fischerei mit dem Schliessnetz: I, 4.
— Copepoden Deutschlands: 4, XI, 9 u. ö.; 5, XV, 48 u. ö.; 8, XXI, 77 u. ö.
Instinkt und Intelligenz: 11, XXVI, 76 ff. 82 ff.
Joliet, L. Gymnolaemata: 10, XXIII, 75.
Jordan. Papilio: 11, XXVII, 23 f. 30.
Joseph, G. Cyclopidae: 8, XXI, 166.
— Geruchsorgane der Insekten: 7, XVIII, 51.
— Geschmacksorgan derselben: 7, XVIII, 77. Geschmacksorgan der Schmetterlingsraupen: 7, XVIII, 114.
— Auge von Proteus: 4, XIII, 68 f.
Jourdan, E. Wechselsinnesorgane: 7, XVIII, 26 32.
— Geruch: 7, XVIII, 55. Riechorgane der Schnecken: 7, XVIII, 167.
— Geschmackssinn der Dekapoden: 7, XVIII, 134.
Juel. Trematodes: 6, XVI, 115. 118. 122. 142. 170. 173. 199 u. ö.
Jullien, J. Geschlechtlich erzeugte Jugendformen von Plumatella: 10, XXIII, 95.
— Cristatella, Embryo: 10, XXIII, 85.
Jurine, L. Copepoden: 4, XI, 2 u. ö.; 5, XV, 19 u. ö.; 8, XXI, 36.

K.

Kaiser, J. Die Acanthocephalen und ihre Entwickelung: 2, VII*.
Kalkkörper (Kalkrädchen) der Echinodermen (Auricularia): 7, XIX, 66 ff*.; 10, XXIII, 81.
Keferstein, W. Tomopteris: I, 19.
Keimblätter. Homologie: 7, XIX, 47 ff.
— K. der Arthropoden: 13, XXXIII, 212 ff.
Keimblattbildung. Scolopendra: 13, XXXIII, 7 ff*.
— Myriopoden u. Insekten: 13, XXXIII, 18 ff.
Keimfleck, s. Ei.
Kennel, J. von. Mimicry: 3, VIII, II, 73.
— Coelom von Peripatus: 13, XXXIII, 90.
Kennel, J. von. Ventralorgane von Peripatus: 13, XXXIII. 126 f.
— Entwickelung der Geschlechtsorgane bei Peripatus: 13, XXXIII, 186 ff.
Kent, W. S. Infusoria: 1, V, 2.
— Cinetochilum: 1, V, 49.
— Urocentrum: 1, V, 53.
— Uronema: 1, V, 45.
Kerbert. Trematodes: 6, XVI, 118.
— Distomum Westermanni: 1, IV, 56.
Kern. Eier von Stylocheiron u. anderen Euphausiden: 7, XIX, 159 ff*.
— Chromatische Körnchen im Plasma des Eies von Plumatella, ihre Umwandlung zu Kernen (Sichelkernen): 10, XXIII, 17 ff*. 31 ff*. 39 ff*. 72 f.
— Siehe auch Ei.
Kernteilung, direkte. Distomum macrostomum: 1, IV, 46 f.
Kessler, K. Echinorhynchus: 2, VII, II, 134.
Kheil, N. Papilionidae: 3, VIII, 1, 69.
King, K. L. Diaptomus: 8, XXI, 177.
Kingsley, J. S. Coelom bei Limulus: 13, XXXIII, 141.
Kirby, F. W. Mimicry: 3, VIII, II, 1.
— Lepidoptera: 3, VIII, I, 16. 78. 84 ff. 90 f.; 3, VIII, II, 22.
Kishinouye, K. Coelom bei Agalena: 13, XXXIII, 140.
Klaatsch. Oikoblasten: 8, XX, 25. 28.
Kleinenberg, N. Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 10. 12. 32.
Knospung. Coelenterata: 7, XIX, 25 ff.
— Margeliden: 7, XIX, 11 ff*.
— Sarsiaden: 7, XIX, 4 ff*. 22.
— Knospenfolge bei Siphonophoren und Phylactolaemen: 2, VI, 44.
— Phylactolaemata: 2, VI, 17 ff*.
— Paludicella: 2, VI, 125 ff*.
— K. d. Phylactolaemen u. Gymnolaemen verglichen: 2, VI, 127 ff.
Knüpfer, P. Echinorhynchus: 2, VII, I, 62. 92; 2, VII, II, 5. 79 f.
Koch, C. L. Copepoden: 4, XI, 2 ff. u. ö.; 8, XXI, 36.
— Hydrachniden: 9, XXII, 7 f.
Köhler, R. Echinorhynchus: 2, VII, I, 33. 61 ff. 92; 2, VII, II, 5. 27.
Kölliker, A. Querstreifung der Muskelfasern: 5, XIV, 32.
— Zahnbildung: 6, XVII; 6 ff. 14 f. 17. 57.
Koenike, F. Hydrachniden: 9, XXII, 26 ff.
Kohl, C. Rudimentäre Wirbeltieraugen: 4, XIII*; 5, XIV*.
Kohl, F. Corydia: 3, VIII, II, 6.
Kolar. Papilio: 3, VIII, 1, 76.
Kolbe. Mimicry: 3, VIII, II, 17.
Kollmann. Zahnbildung: 6, XVII, 7 ff. 127.
Korotneff, A. Phylactolaemata, Spermatogenesis: 10, XXIII, 6 ff.; Befruchtung: 10, XXIII, 21; Oöcium: 10, XXIII, 22. 24; Embryonalentwickelung: 10, XXIII, 44 ff. 49 52.
— Plumatella, Primärknospen: 10, XXIII, 56.
Kowalewski, A. Freischwimmende Actinienlarven: I, 12
Kraepelin, K. Geschmacksorgan der Dipteren: 7, XVIII, 129 f.
— Fühler der Käfer: 7, XVIII, 92 f. Fühler d. Hymenopteren: 7, XVIII, 99.
— Porenplatten der Hymenopteren: 7, XVIII, 76.
— Bryozoen d. Wasserleitung: 2, VI, 15 f.
— Paludicella: 2, VI, 124.
— Phylactolaemata, Embryonalentwickelung: 2, VI, 116 ff.; 10, XXIII, 46. 49. 52; Spermatogenesis: 10, XXIII, 6 ff. 17; Eier: 10, XXIII, 17 f. 21; Oöcium: 10, XXIII, 22; Larven: 2, VI, 121; Ausschlüpfen der Larve: 10, XXIII, 61; Verwandlung der Larve: 10. XXIII, 67; Nervensystem: 2, VI, 48 f. 57; Darm: 2, VI, 58 ff.; Querstreifung am Retraktor: 2, VI, 64; Tunica muscularis: 10, XXIII, 57; Funiculus: 2, VI, 66 f; Statoblastenbildung: 2, VI, 69. 78. 80; Statoblasten, Keimung: 2, VI, 89 f.
— Cristatella: 2, VI, 13 f. 27. 81.
— Lophopus, Blasenzellen des Leibeshöhlenepithels: 2, VI, 27.
— Plumatella polymorpha: 2, VI, 4 ff.
— Plum. princeps: 2, VI, 9 f.
— Geschlechtlich erzeugte Jugendformen von Plum.: 10, XXIII. 95.
Kramer, P. Grönländische Milben: 8, XX, 77 ff*.
— Hydrachniden: 9, XXII, 13 ff.
Krause, E. Mimicry: 3, VIII, II, 6. 133.
Krause, W. Auge von Myxine: 4, XIII, 49. 58.
— Auge von Petromyzon: 4, XIII, 2.
— Auge von Proteus: 4, XIII, 68. 95 f.
Krendowskij, M. Hydrachniden: 9, XXII, 16 ff.
Krohn, A. Eleutheria: 7, XIX, 10.
— Podocoryne: 7, XIX, 14.
— Lepaden: 7, XIX, 90.
Kühn, J. Heterodera Schachtii: I, II, 10. 12.
Kükenthal, W. Zahnbildung: 6, XVII, 42. 62. 64. 67 u. ö.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

L.

Lachmann, J. Infusoria: 1, V, 2. 8.
— Cinetochilum: 1, V, 49.
— Cyclidium: 1, V, 62.
— Lembadion: 1, V, 57.
— Pleuronema: 1, V, 60.
Lacordaire, Th. Coleoptera: 3, VIII, II, 12 ff.
Ladenburger, R. Copepoda: 4, XI, 8.
Lamarck, J. B. Echinorhynchus: 2, VII, I, 36.
Lampe. Spongia: 10, XXIV, I, 4.
Lande, A. Cyclops: 4, XI, 40 u. ö.; 8, XXI, 152. 162.
Lang, Alb. Hydroiden-Knospung: 7, XIX, 29.
Lang, Arn. Trematodes: 6, XVI, 152. 237.
— Balanus: 7, XIX, 87 u. ö.
Langerhans. Auge von Petromyzon: 4, XIII, 2. 20.
Latreille. Oniscidae: 10, XXV, 7 f.
Lauterborn, R. Cyttarocylis: 8, XX, 60.
La Valette. Isopoda: 3, X, 2. 9 f.
Lebert, H. Hydrachniden: 9, XXII, 11.
Lécaillon, A. Darmbildung bei Insekten: 13, XXXIII, 209 f.
Leche, W. Zur Entwickelungsgeschichte des Zahnsystems der Säugetiere, zugleich ein Beitrag zur Stammesgeschichte dieser Tiergruppe. Teil 1. Ontogenie: 6, XVII*. Teil 2. Phylogenie. Heft 1. Die Familie der Erinaceidae: 15, XXXVII*.
Leichmann, G. Beiträge zur Naturgeschichte d. Isopoden: 3, X*.
— Isopoda, Brutsäcke u. Kiemenlamellen: 10, XXV, 14.
Leidy, J. Rhizopoda: 4, XII, 4. 21 ff. u. ö.
Lendenfeld, R. von. Spongia: 10, XXIV, I, 13. 18. 21; 10, XXIV, II, 11. 23 u. ö.
— Geographische Verbreitung der Medusen: 1, III, 46.
— Argyropelecus, Leuchtorgane: 13, XXXII, 1.
Lenhossék, M. von. Hautsinnesorgane von Lumbricus: 7, XVIII, 148 ff.
Lenz, H. Grönländische Spinnen: 8, XX, 73 ff*.
Lereboullet. Oniscidae: 10, XXV, 8 ff. 12.
Lernen bem Menschen und bei den Tieren: 11, XXVI, 82 ff.
Lespès, Ch. Echinorhynchus: 2, VII, I, 37. 89; 2, VII, II, 118. 134.
Lesson, R. P. Chrysaora Blossevillei: 1, III, 15.
— Desmonema Gaudichaudi: 1, III, 18 f.
Lesson, R. P. Ascidien: 12, XXXI, 13 ff.
Leuchtorgane: 7, XIX, 191 ff*.
— Euphausidae: 7, XIX, 196 ff*.
— Stylocheiron: I, 31.
— Argyropelecus: 13, XXXII* (Handrick).
Leuckart, R. Dissogonie u. Pädogenesis: I, 64.
— Trematodes: 6, XVI, 123. 127. 138. 154. 171 f. u. ö.
— Distomum tereticolle, Eier: 1, IV, 41.
— Entwickelung der Nematoden: 1, II, 48.
— Allantonema: 1, II, 13.
— Ascaris, Cuticula: 1, II, 14.
— Heterodera Schachtii: 1, II, 10.
— Trichosoma crassicauda: 1, II, 47.
— Acanthocephalen: 2, VII, I, 1. 21 ff. 24 f. 28 u. ö.; 2, VII, II, 4. 16 f. 24 f. 42 u. ö.
— Tomopteris: 1, 21.
— Isopoda: 3, X, 9.
— Auge von Proteus: 4, XIII, 69.
Levinsen, G. M. R. Ctenophoren: 8, XX, 15 u. ö.
— Distomum: 6, XVI, 173. 218.
Leydig, F. Wechselsinnesorgane: 7, XVIII, 27.
— Echinorhynchus: 2, VII, II, 2. 74.
— Gefässe bei Arthropoden: 3, IX, 31. 35.
— Facettenauge: 11, XXVIII, 37.
— Lebensweise der Polyphemiden: 11, XXVIII, 54.
— Geschmacksorgane bei Amphipoden u. Isopoden: 7, XVIII, 141 f.
— Oniscidae: 10, XXV, 10 f. 19. 20 ff.
— Chilopoda, Drüsen: 3, IX, 13.
— Taster der Coleopteren: 7, XVIII, 75.
— Fühler der Lepidopteren: 7, XVIII, 109.
— Apis, Drüsen: 3, IX, 3. 15.
— Auge von Petromyzon: 4, XIII, 2; von Siphonops: 4, XIII, 100; von Proteus: 4, XIII, 67 f. 84.
— Argyropelecus, Leuchtorgane: 13, XXXII, 1. 53 f. u. ö.
Lieberkühn, N. Urocentrum: 1, V, 54.
— Heterodera: 1, II, 9.
Lilljeborg, W. Cyclops: 8, XXI, 158.
— Harpacticidae: 5, XV, 22 u. ö.
— Centropagidae: 8, XXI, 36 u. ö.
Lindemann, K. Echinorhynchus: 2, VII, II, 2. 23.
Lindgren. Spongia: 10, XXIV, II, 9.
Linstow, O. von. Trematodes: 6, XVI, 139. 175. 194 u. ö.
— Distomum: 6, XVI, 31. 40. 48 u. ö.
— Echinorhynchus: 2, VII, I, 21. 43. 125; 2, VII, II, 17. 24. 59. 74. 109. 134.
Lo Bianco, S. Erscheinungszeit von Tieren des Mittelmeeres: I, 50.
Lo Bianco, S. Auf- und Absteigen pelagischer Tiere: I, 51.
Loeb, J. Heteromorphose: 7, XIX, 27.
Lohmann, H. Die Appendicularien der (Grönland-) Expedition: 8, XX, 25 ff*.
Looss, A. Die Distomen unserer Fische u. Frösche: 6, XVI*.
— Distomum, Entwickelung: 1, IV, 56. 58; Hautschicht: 1, IV, 31 f.
— Leucochloridium paradoxum: 1, IV, 62. Tafeln.
Lovén, S. L. Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 9.
— Evadne: 11, XXVIII, 15.
Lubbock, J. Psychologie der Ameisen: 11, XXVI, 1. 61.
Ludwig, N. Psychologie der Biene: 11, XXVI, 16.
Lütken, C. F. Ctenophoren: 8, XX, 15 u. ö.
Lutz. Distomum: 6, XVI, 172. 240.
Lydekker, R. Erinaceidae: 15, XXXVII, 76. 95.
Lymphoide Organe. Scolopendra: 13, XXXIII, 84 ff*. 95 ff.

M.

Macallum. Sphyranura: 6, XVI, 136. 203.
Mac Leay. Papilio: 3, VIII, I, 88.
Mac Leod. Scolopendra: 3, IX, 14. 16.
Maggi, L. Urocentrum: 1, V, 54.
Magnaghi. Temperaturmessungen im Mittelmeer: I, 47.
Marenzeller, von. Nereis zonata: 8, XX, 125.
Mathew. Australische Tagfalter: 11, XXVII, 12 u. ö.
Mattew. Papilio: 3, VIII, I, 80.
Maupas, E. Infusoria: 1, V, 2. 4.
— Trichocysten: 1, V, 21.
— Colpidium: 1, V, 44.
— Dileptus: 1, V, 24.
— Frontonia: 1, V, 41.
— Glaucoma: 1, V, 35. 36.
— Loxophyllum duplostriatum: 1, V, 22.
Mayer, P. Phronima: 7, XIX, 124 ff.
— Cymothoidae: 3, X, 1 f. 4 f.
Mégnin, P. Echinorhynchus: 2, VII, I, 37; 2, VII, II, 26 f.
Mehlis. Echinorhynchus: 2, VII, I, 20. 36. 57 f.
Meissner, M. Rhizopoda: 4, XII, 100.
Meldola. Mimicry: 3, VIII, II, 20.
Mertens, H. Ctenophoren: 8, XX, 19. 21.
— Oikopleura: 8, XX, 42.
Menge, A. Preussische Spinnen: 14, XXXV, Seite V.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Metschnikoff, E. Cunina: 7, XIX, 25.
— Sarsiaden: 7, XIX, 4 ff.
— Muskeln der Bryozoen: 2, VI, 28.
— Phylactolaemata, Muskelbildung: 10, XXIII, 57; Knospung: 2, VI, 17; Embryonalentwickelung: 2, VI, 116 ff.; Geschlechtsprodukte: 2, VI, 114; Oöcium: 10, XXIII, 22. 24.
Meyen. Statoblasten: 2, VI, 68.
Meyer, A. B. Mimicry: 3, VIII, II, 79.
Meyrick. Schmetterlinge des Bismarck-Archipels: 12, XXIX, 3. 157.
Michael, A. D. Hydrachniden: 9, XXII, 21.
Michaelsen, W. Grönländische Anneliden: 8, XX, 120 ff.
— Die holosomen Ascidien des magalhaensisch-südgeorgischen Gebietes: 12, XXXI*.
Michahelles. Auge von Proteus: 4, XIII, 67.
Milchgebiss, s. Gebiss.
Milne Edwards, A. Beroë: 8, XX, 20
Milne Edwards, H. Hirudo: 7, XVIII, 145.
— Decapoden, Antennen: 7, XIX, 118.
— Oniscidae: 10, XXV, 8.
— Papilio: 3, VIII, I, 80. 92
Miltz, O. Das Auge der Polyphemiden: 11, XXVIII*.
Mimicry: 3, VIII* (Haase).
— Definition: 3, VIII, II, 150.
— Verhältnis zu Analogie u. Convergenz: 3, VIII, II, 139 ff.
— M. zwischen Blütenpflanzen: 3, VIII, II, 4.
— M. bei Tieren: 3, VIII, II, 4 ff*.
— Leucochloridium ~ Insektenlarven: 1, IV, 50 f.
— M. bei Mollusken: 3, VIII, II, 78.
— bei Arachniden: 3, VIII, II, 4 ff.
— bei Mimonectes: 3, VIII, II, 4.
— bei Insekten: 3, VIII, II, 6 ff*.
— bei Orthopteren: 3, VIII, II, 6 ff.
— bei Neuropteren: 3, VIII, II, 11.
— bei Hemipteren: 3, VIII, II, 9 f.
— bei Dipteren: 3, VIII, II, 77 f.
— bei Lepidopteren: 3, VIII, II, 19 ff*.
— bei Coleopteren: 3, VIII, II, 11 ff*.
— bei Hymenopteren: 3, VIII, II, 10 f.
— M der Ameisengäste: 11, XXVI, 41 ff. 123 f.
— M. bei Vertebraten: 3, VIII, II, 78 ff. 136. 138 ff.
— bei Amphibien: 3, VIII, II, 78 f.
— bei Reptilien: 3, VIII, II, 79 f.
Miskin. Australische Tagfalter: 11, XXVII, 41.
Mittelmeer. Beziehung zum Ozean: I, 47 ff.
— Meerenge von Gibraltar: I, 48.
— Temperaturreihen: I, 47.
Mittelmeer. Einfluss der Temperatur auf die pelagische Fauna: I, 54.
Moebius, C. Rhizopoda: 4, XII, 68. 72.
— Cyttarocylis: 8, XX, 60.
— Sarsia: 7, XIX, 10.
— Ctenophoren: 8, XX, 18.
Mojsisowicz. Lumbricus: 7, XVIII, 149.
Molin. Distomum: 6, XVI, 209.
Moniez, R. Distomum: 6, XVI, 32.
— Copepoda: 4, XI, 7 u. ö.; 5, XV, 46 u. ö.
— Hydrachnida: 9, XXII, 21 ff.
Monticelli. Distomum, Hautschicht: 6, XVI, 128 ff. 142. 145. 147. 152 ff. u. ö.
Montrouzier. Tagfalter: 11, XXVII, 4. 27.
Moore, F. Papilionidae: 3, VIII, I, 21; 3, VIII, II, 98.
— Danais: 11, XXVII, 48.
Moquin-Tandon, A. Sinnesorgane der Schnecken: 7, XVIII, 164.
Morgenstern. Zahnbildung: 6, XVII, 8. 125. 127.
Moseley, N. Auf- und Absteigen pelagischer Tiere: I, 50.
Mrázek, A. Cyclops: 4, XI, 63 u. ö.; 8, XXI, 151. 154. 163.
— Harpacticidae: 5, XV, 9 u. ö.
— Diaptomus: 8, XXI, 53. 174.
Müller, Aug. Auge von Petromyzon: 4, XIII, 2.
Müller, C. Trichosoma crassicauda: 1, II, 47.
Müller, Fr. Mimicry: 3, VIII, II, 3.
— Lepidoptera, Duftorgane: 15, XXXVIII, 1 u. ö.
— Papilio: 3, VIII, I, 79 f. 100.
— Nymphalinae: 3, VIII, II, 58 f.
Müller, H. Heterodera: 1, II, 10 f. 15.
— Auge von Petromyzon: 4, XIII, 2.
Müller, Joh. Auge von Myxine: 4, XIII, 48.
Müller, O. F. Echinorhynchus: 2, VII, I, 24. 36; 2, VII, II, 19. 70.
— Copepoden: 4, XI, 1 f. u. ö.; 5, XV, 18 u. ö.; 8, XXI, 38.
— Hydrachniden: 9, XXII, 3.
Müller, W. Deutschlands Süsswasser-Ostracoden: 12, XXX*.
— Papilionidae: 3, VIII, I, 88. 100; 3, VIII, II, 131 f.
— Auge von Myxine: 4, XIII, 48 f. 57 f. Auge von Petromyzon: 4, XIII, 3 f. 25. 36 f. 47.
Murray, J. Euphausia, Leuchtorgane: 7, XIX, 197 f.

N.

Nährzellen im Ovarium von Tomopteris: I, 21 ff*.
Nagel, W. A. Vergleichend physiologische u. anatomische Untersuchungen über den Geruchs- u. Geschmackssinn u. ihre Organe, mit einleitenden Betrachtungen aus der allgemeinen Sinnesphysiologie: 7, XVIII*.
Natanson. Embryonalentwickelung bei Nematoden: 1, II, 37.
Nephridien. Echinorhynchus: 2, VII, II, 46 f*. 88.
— Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 33 ff*. 55 f.
— Phylactolaemen: 2, VI, 53 f.; 10, XXIII, 20.
Nervensystem. Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 21 ff*. 57 ff*. 68 f.
— Phylactolaemata: 2, VI, 47 ff*. 56 f*.
— Entwickelung bei Scolopendra: 13, XXXIII, 104 ff*.
— N. v. Argyropelecus: 13, XXXII* (Handrick).
Nesselkapseln, Bildung: 10, XXIII, 81.
Netz, offenes, mit Zinkeimer: I, 5.
— Schliessnetz: I, 2. 3 ff*.
Neuman, C. Hydrachniden: 9, XXII, 19 f.
Newport, G. Arthropodengehirn: 13, XXXIII, 132
— Geruchssinn der Insekten: 7, XVIII, 84.
— Chilopoda: 3, IX, 23 ff. 36.
Nicolet. Boeckella: 8, XXI, 184.
— Cyclops: 8, XXI, 160.
Nitsche, H. Bryozoa, Längs- und Quermuskeln der Leibeswand: 2, VI, 28.
— Bryozoenlarven, Homologie: 10, XXIII, 85.
— Flustra: 2, VI, 125. 126 f.
— Phylactolaemata, Ausschlüpfen der Larve: 2, VI, 118; Knospung: 2, VI, 17 f. 21 f.; Doppelknospe: 2, VI, 19. 22; Lumen der jungen Knospen: 2, VI, 31; Entwickelung der Einzeltiere: 2, VI, 45 ff.; Funiculus: 2, VI, 66; Statoblastenbildung: 2, VI, 68 f. 71. 76 ff.
— Statoblasten von Plumatella: 2, VI, 5.
— Zellformen des Ectoderms bei Plum.: 2, VI, 27.
Nitzsch. Echinorhynchus: 2, VII, I, 36; 2, VII, II, 20 f. 71.
Noack. Distomum: 6, XVI, 93 u. ö. 176. 191. 197 u. ö.
Nordmann. Leucochloridium: 1, IV, 8.
Nordquist, O. Centropagidae: 8, XXI, 27. 68 u. ö.
Norman, A. Ostracoda: 12, XXX, 8 u. ö.
Nucleolus, s. Ei.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

O.

Oberthür, R. Papilionidae: 3, VIII, I, 58. 72.
Öhrwall, Hj. Geschmackssinn: 7, XVIII, 19 f. 23.
Oersted. Nereis arctica: 8, XX, 125.
Oka, A. Phylactolaemata, Excretionsöffnung: 10, XXIII, 20.
Oken. Leucochloridium: 1, IV, 7.
— Säugetiere, Gebiss: 6, XVII, 1.
Orsini. Medusen: 1, III, 5.
Ortmann, R. Schizopoden: 7, XIX, S. III.
— Boreomysis: 7, XIX, 186.
— Stylocheiron: 7, XIX, 144. 148 f*.
Ostroumoff, A. Bryozoenlarven: 10, XXIII, 84.
Ovogenesis, s. Eibildung.
Owen. Säugetiere, Gebiss: 6, XVII, 1. 47. 50. 145.
Oberflächenfauna, s. Fauna.
Ocean. Einfluss der Temperatur auf die pelagische Fauna: I, 54 f.
— Pacifischer O., Tiefseefauna: I, 49.

P.

Pabst, M. Sphingidae: 3, VIII, II, 74 f
Pagenstecher, A. Die Lepidopterenfauna des Bismarck-Archipels. Mit Berücksichtigung der tiergeograph. und biolog. Verhältnisse systematisch dargestellt. Teil I: Die Tagfalter: 11, XXVII*. Teil II: Die Nachtfalter: 12, XXIX*.
Pagenstecher, H. A. Echinorhynchos: 2, VII, I, 32. 38. 89; 2, VII, II, 2. 22 f. 73. 108. 118.
— Distomum: 6, XVI, 216.
— Tomopteris: 1, 21.
Palumbo. Schliessnetz: I, 4. 46.
Pappenheim, P. Coelom bei Dolomedes: 13, XXXIII, 141.
Parapinealorgan von Argyropelecus: 13, XXXII, 7*. 39*. 41*.
Parker, G. H. Facettenauge: 11, XXVIII, 18. 32. 40. 47.
— Schizopoden, Auge: 7, XIX, 217 u. ö.
Patten, W. Facettenauge: 7, XIX, 225.
— Leuchtorgane der Euphausien: 7, XIX, 199 u. ö.; von Stylocheiron: I, 31.
Pavesi, P. Auf- u. Absteigen pelagischer Süsswassertiere: I, 52.
— Fischerei mit dem Schliessnetz: I, 4.
Peckham, E. Mimicry: 3, VIII, II, 5.
Penard, E. Rhizopoda: 4, XII, 6. 9. 11. 24 u. ö.
Perris. Geruchssinn bei Käfern: 7, XVIII, 96.
Perty, M. Infusoria: 1, V, 2.
— Ptyxidium ovulum: 1, V, 65.
Petersen, von. Schliessnetz und photographischer Kipp-Apparat für Tiefseeversuche: I, 2. 4. 58 f.
— Tiefseefauna des Mittelmeeres: I, 49.
Pfeffer, G. Südgeorgische Ascidien: 12, XXXI, 2.
Pfeffer, W. Sensibilität der Pflanzen: 7, XVIII, 14.
— Bakterien: 7, XVIII, 9.
Photographischer Kipp-Apparat nach v. Petersen: I, 58 f*.
Phylogenie. Ph. des Zahnsystems der Erinaceidae: 15, XXXVII* (Leche).
— Methodik der Stammesgeschichte: 15, XXXVII, I ff.
Pieper. Leucochloridium: 1, IV, 12.
Piersig, R. Deutschlands Hydrachniden: 9, XXII*.
Pinealorgan v. Argyropelecus: 13, XXXII, 37 ff*.
Pintner. Trematodes: 6, XVI, 203. 219. 232.
Pizon, A. Molgula: 12, XXXI, 123 f.
Plate, L. Geruchsorgan der Schnecken: 7, XVIII, 166.
Plateau. Geruchssinn: 7, XVIII, 45.
— Chilopoda: 3, IX, 9. 16.
— Taster der Insekten: 7, XVIII, 81 ff.
Poggenpol, M. J. Cyclops: 4, XI, 62. 64 u. ö.
— Diaptomus: 8, XXI, 61.
Poirier. Trematodes: 6, XVI, 173. 175. 198.
Poléjaeff. Spongia: 10, XXIV, I, 4; 10, XXIV, II, 26.
Poppe, S. A. Copepoda: 4, XI, 8 f. u. ö.; 5, XV, 37 u. ö.; 8, XXI, 48 f. 64 u. ö.
— Diaptomus: 8, XXI, 172.
Ponchet. Zahnbildung: 6, XVII, 6 ff. 44. 83. 108 f. 115.
Poulton, E. B. Mimicry: 3, VIII, II, 133 f. 139.
— Myrmecobius, Gebiss: 6, XVII, 89.
Pratz, E. Copepoden Deutschlands: 4, XI, 7. 179 ff.
Prenant. Trematodes: 6, XVI, 242.
Protz, A. Hydrachniden: 9, XXII, 29 f.
Prouho, H. Alcyonidium duplex: 10, XXIII, 74 f.
— Phylactolaemata, Gastrulation: 10, XXIII, 77 ff.
— Bryozoenlarven, Homologie: 10, XXIII, 84.
— Chemischer Sinn von Asterias: 7, XVIII, 175 ff.
Psychologie. Ameisen: 11, XXVI* (Wasmann).
Putnam, F. W. Auge von Typhlichthys: 4, XIII, 60 ff.

R.

Rajewski. Polygordios-Larve: 13, XXXIV, 9 f. 29.
Raondohr. Leucochloridium: 1, IV, 6 f.
Ranke, J. Übergangssinnesorgane: 7, XVIII, 27. 30 f. 38 f.
— Grönländerschädel: 8, XX, 95 ff.
Rathke, H. Isopoda: 3, X, 25. 36 ff.
— Auge von Petromyzon: 4, XIII, 1.
Rawitz, B. Wechselsinnesorgane: 7, XVIII, 25. 31.
— Hautsinnesorgane der Mollusken: 7, XVIII, 170.
Reakirt. Sericinus: 3, VIII, I, 106.
Réaumur. Statoblasten der Phylactolaemen: 2, VI, 68.
Regeneration. Succinea amphibia: 1, IV, 14.
Redtenbacher, J. Flügelgeäder bei Insekten: 3, VIII, I, 3 ff.
Rehberg, H. Copepoden Deutschlands: 4, XI, 7 f. u. ö.; 5, XV, 31 u. ö.; 8, XXI, 39. 60 u. ö.
Reichenbach, s. Stromer von R.
Reinhard, W. Phylactolaemata, Spermatogenesis: 10, XXIII, 6 ff; Eier, 2, VI, 115; 10, XXIII, 17 f. 21; Oocium: 10, XXIII, 22; Embryonalentwickelung: 2, VI, 116 ff.; 10, XXIII, 49. 52; Ausschlüpfen der Larve: 10, XXIII, 61; Statoblastenbildung: 2, VI, 68. 71. 77.
— Cristatella: 2, VI, 44.
— Säugetiere, Gebiss: 6, XVII, 45. 60. 67. 109 ff.
Reuter, O. M. Mimicry: 3, VIII, II 9 f.
Ribbe, C. Tropische Schmetterlinge: 12, XXIX, 1.
— Tagfalter: 11, XXVII, 6. 10 f. u. ö.
Richard, J. Copepoda: 4, XI, 17 u. ö.; 5, XV, 30 u. ö.; 8, XXI, 20 u. ö.
Richtungskörper. Bildung derselben bei Asellus aquaticus: 3, X, 21 ff*.
Ridley. Spongia: 10, XXIV, I, 4. 47 u. ö.; 10, XXIV, II, 15.
Riechen, s Sinnesorgane.
Riley. Papilio: 3, VIII, I, 80.
Rink. Grönländer: 8, XX, 99.
Röse, C. Zahnbildung: 6, XVII, 7 ff. 26. 84. 100 f. 109. 117. 125 ff. 140.
Roesel von Rosenhof, A. J. Statoblasten: 2, VI, 68.
— Hydrachniden: 9, XXII, 1 f.
Rössler, A. Mimicry: 3, VIII, II, 21.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rohde, E. Subcuticula der Nematoden: 2, VII, I, 28 54.
Rosenberg, E. Gebiss: 15, XXXVII, 44.
Rosenstadt. Asellus aquaticus: 3, X, 17. 20.
Roussean. Erinaceus, Gebiss: 6, XVII, 11.
Rothschild, W. von. Tagfalter: 11, XXVII, 17. 19 f. u. ö.
Rudolphi, C. A. Leucochloridium: 1, IV, 7.
— Echinorhynchus: 2, VII, I, 24. 33. 36. 58; 2, VII, II, 20. 71.
Rübsaamen, E. H. Grönländische Mycetophiliden, Seiariden, Cecidomyiden, Psylliden, Aphiden u. Gallen: 8, XX, 103 ff*.
Ruland, F. Fühler der Käfer: 7, XVIII, 92 ff.
— Taster von Dytiscus: 7, XVIII, 75.
— Fühler der Hymenopteren: 7, XVIII, 99 ff.
Rzewuski. Echinorhynchus: 2, VII, I, 57.

S.

Säfftigen, A. Echinorhynchus: 2, VII, I, 3. 21 ff. 25. 32. 33 40 u. ö.; 2, VII, II, 5. 7. 27. 41. 44. 48 ff. u. ö.
— Nervensystem der Phylaetolaemen: 2, VI, 49. 57.
Sablertz. Säugetiere, Gebiss: 6, XVII, 11 f. 67 ff.
Saint Rémy, G. Gehirn der Arthropoden: 13, XXXIII, 129. 140 u. ö.
Salensky, W. Echinorhynchus: 2, VII, I, 21. 60.
— Nervensystem d. Pilidium: 13, XXXIV, 25. 37.
Salvin. Tagfalter: 11, XXVII, 4 f. u. ö.
— Papilio: 3, VIII, I, 77. 81.
Samassa, P. Cladoceren-Auge: 11, XXVIII, 8. 16. 18 f. u. o.
Samenbildung, s. Spermatogenesis.
Sarasin, E. Vordringen des Lichtes im Wasser: I, 59.
Sarasin, P. u. F. Auge von Ichthyophis: 4, XIII, 101.
Sars, G. O. Copepoda: 4, XI, 28 u. ö.; 5, XV, 39 u. o.; 8, XXI, 24. 37 u. ö.
— Asellus aquaticus: 3, X, 11. 19.
— Schizopoden-Auge: 7, XIX, 213 u. ö.
— Gnathophausia: 7, XIX, 153.
— Mysis: 7, XIX, 155.
— Nematoscelis: I, 30. 56.
— Stylocheiron: I, 30 f. 56; 7, XIX, 142. 144 u. ö.
— Leuchtorgane der Euphausien: 7, XIX, 198 202 u. ö.
Sars, M. Knospende Medusen: 7, XIX, 3. 11 ff.
— Beroë: 8, XX, 20.
Schacht, H. Heterodera: 1, II, 8 f. 15.
Schädel von Argyropelecus: 13, XXXII, 3 ff*.
— 3 Grönländerschädel: 8, XX, 84 ff*. (Sommer).
Schatz, E. Lepidoptera, Flügelgeäder: 3, VIII, I, 3 ff. 71.
— Tagfalter: 11, XXVII, 2. 13 f. u. ö.
— Papilio: 3, VIII, I, 2.
— Luehdorfia: 3, VIII, I, 109.
Schaudinn, F. Rhizopoda: 4, XII, 151.
Schauinsland, H. Distomum: 6, XVI, 17, 47; Eier von D.: 1, IV, 39. 41.
Scheitelplatte der Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 22 f*. 57 ff*.
Schewiakoff, W. Beiträge zur Kenntnis der holotrichen Ciliaten: I, V*.
— Verbreitung der Protozoen: 4, XII, 152 ff.
Schiemenz, P. Pteropoden und Heteropoden der Tiefsee: I, 35 f.
— Apis, Drüsen: 3. IX, 3.
Schilde, J. Mimicry: 3, VIII, II, 127 ff.
Schizocoel bei Arthropoden: 13, XXXIII, 92 ff*.
Schlampp, K. W. Auge von Proteus: 4, XIII, 71 f. 76 u. ö.
Schliessnetz: I, 2. 3 ff*.
Schlosser, M. Erinaceidae, Gebiss: 15, XXXVII, 24; 6, XVII, 12.
Schmankewitsch, W. Cyclops: 8, XXI, 161 f.
Schmarda. Hirudo ceylonica: 7, XVIII, 146.
Schmecken, s. Sinnesorgane.
Schmeil, O. Deutschlands freilebende Süsswasser-Copepoden. Teil I: Cyclopidae: 4, XI*. Teil 2: Harpacticidae: 5, XV*. Teil 3: Centropagidae: 8, XXI*.
Schmidt, A. Cystenbildung bei Nematoden: I, II, 47.
— Heterodera: 1, II, 9 f.
Schmidtlein, F. Listen über Erscheinungszeit von Tieren des Mittelmeeres: I, 50.
Schneider, A. System der Nematoden: 1, II, 18.
— Echinorhynchus: 2, VII, I, 1. 22. 25. 27. 39. 43 ff. 56 u. ö.; 2, VII, II, 3. 9. 12. 24. 48 u. ö.
Schneider, R. Cyclops: 4, XI, 165.
— Canthocamptus: 5, XV, 32.
Schöbl. Oniscidae: 3, X, 13 ff. 33.
Schuberg, A. Verschiebung des Mundes bei Infusorien: 1, V, 34.
— Urocentrum: 1, V, 53.
— Distomum: 6, XVI, 251.
Schulthess. Echinorhynchus: 2, VII, I, 57.
Schultze, M. Auge von Petromyzon: 4, XIII, 2.
Schultze, O. Gefässe der Retina: 5, XIV, 178.
Schulze, F. E. Rhizopoda: 4, XII, 49 ff. 60. 72 u. ö.
— Schwammnadeln: 7, XIX, 74.
— Sarsia: 7, XIX, 10.
Schumann, E. Leucochloridium: 1, IV, 12.
Schutzfärbung und schützende Ähnlichkeit: 3, VIII, II, 150 ff*.
Schwalbe, G. Zahnbildung: 6, XVII, 136. 139 u. ö.
— Geschmackssinn der Fische: 7, XVIII, 191.
Schwarze. Trematodes: 6, XVI, 151. 179. 191. 197 u. ö.
— Distomum: 6, XVI, 90 u. ö.; 1, IV, 52 f. 56 f. 59 f.
— Cercarien: 1, IV, 16. 27.
Schwebvermögen pelagischer Crustaceen: 7, XIX, 100 ff*.
Schwink. Säugetiere, Gebiss: 6, XVII, 12. 16. 56.
Scott, W. B. Insectivora, Gebiss: 15, XXXVII, 41.
Scudder, S. H. Papilio: 3, VIII, I, 80. 92.
Secret, belebtes: 10, XXIII, 58 f. 81 f.
Sedgwick, A. Peripatus: 3, IX, 8. 35; Ursegmenthöhle von P.: 13, XXXIII, 89; „Ektodermal hump" bei P.: 13, XXXIII, 159; Entwickelung der Genitalien bei P.: 13, XXXIII, 185 ff.
Seeliger, O. Comatula: 7, XIX, 60. 67.
— Gehäuse von Oikopleura: 8, XX, 29.
Segmentierung. Arthropoda: 13, XXXIII, 59 ff.
Sehorgane, s. Augen.
Seitenlinie, Seitenorgansystem, s. Sinnesorgane.
Seitz, A. Mimicry: 3, VIII, II, 6. 75. 83 u. ö.
— Precis Iphita: 3, VIII, II, 153.
Selenka, E. Kalkkörper von Cucumaria: 7, XIX, 66
Seligo, A. Copepoden Deutschlands: 4, XI, 13 u. ö.; 8, XXI, 71.
Semon, R. Auricularien: 7, XIX, 58 ff.
— Kalkkörper der Echinodermenlarven: 7, XIX, 66 f.
— Genealogie der Dipnoer: 15, XXXVII, 2.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Semper, C. Mimicry: 3, VIII, II, 7. 78.
— Euphausia, Leuchtorgane: 7, XIX, 197.
— Auge von Proteus: 4, XIII, 69.
— Auge von Talpa: 5, XIV, 13.
Semper, G. Australische Tagfalter: 11, XXVII, 48.
Siebold, C. Th. von. Trematodes: 6, XVI, 238.
— Leucochloridium: 1, IV, 8 f. 12.
— Acanthocephalen: 2, VII, I, 20. 24. 33. 38. 89. 119; 2, VII, II, 1 f. 6. 22. 72. 100. 107. 117.
— Süsswasserbryozoen: 2, VI, 2. 3 f.
— Plumatella: 10, XXIII, 16.
— Diaptomus: 8, XXI, 28.
— Oniscidae: 10, XXV, 9.
— Apis, Drüsen: 3, IX, 3.
Sigsbee, C. D. Schliessnetz: I, 3.
Simroth, H. Chemischer Sinn der Mollusken: 7, XVIII, 160 f. 164 ff.
Sinnesorgane. Phylogenese spezifischer S.: 7, XVIII, 1 ff.
— Echinodermata: 7, XVIII, 175 ff.
— Vermes: 7, XVIII, 143 ff.
— Crustacea: 7, XVIII, 133 ff*.
— Araneida: 7, XVIII, 132.
— Myriopoda: 7, XVIII, 132.
— Insecta: 7, XVIII, 67 ff*. 72 ff*.
— Mollusca: 7, XVIII, 155 ff.
— Amphioxus: 7, XVIII, 192.
— Geruchs- und Geschmackssinn u. ihre Organe: 7, XVIII* (Nagel).
— Riechen im Wasser: 7, XVIII, 49 ff.
— Geruch und Geschmack der Coelenteraten: 7, XVIII, 180 ff.
— Geschmacksorgane der Insekten: 7, XVIII, 124 ff*.
— Geruchssinn der Ameisen: 11, XXVI, 10 ff. 19 ff. u. ö.
— Tastsinn der Ameisen: 11, XXVI, 49*.
— Geruch u. Geschmack der Fische und Amphibien: 7, XVIII, 183 ff.
— Gehörorgan von Argyropelecus: 13, XXXII, 50 f*.
— Hautsinnesorgane von Argyropelecus: 13, XXXII, 41 ff*.
— Seitenlinie der Fische u. Amphibien: 7, XVIII, 191 f.
— Seitenorgansystem von Argyropelecus: 13, XXXII, 41 ff*.
— Siehe auch Augen.
Skelet von Argyropelecus: 13, XXXII, 3 ff*.
Sluiter, C. P. Ascidien: 12, XXXI, 2 f. 24.
Smith, F. Mimicry: 3, VIII, II, 78.
Smith, H. G. Tagfalter: 11, XXVII, 22 f. 36 u. ö.
Sollas. Spongia: 10, XXIV, I, 4. 7. 11 u. ö.; 10, XXIV, II, 6.
Sommer. Distomum: 6, XVI, 174. 197.
Sommer, W. Drei Grönländerschädel: 8, XX, 84 ff*.
Sonsino. Distomum: 6, XVI, 111. 196.
Sostarič, D. Cyclops: 4, XI, 40 u. ö.
— Harpacticidae: 5, XV, 20.
Sowinsky, B. Centropagidae: 8, XXI, 21. 37 u. ö.
— Cyclops: 8, XXI, 164.
Spence. Mimicry: 3, VIII, II, 1.
Spengel, J. W. Polygordius-Larve: 13, XXXIV, 37.
— Chemischer Sinn der Mollusken: 7, XVIII, 155.
Spermatogenesis. Distomum macrostomum: 1, IV, 36 f*
— Heterodera Schachtii: 1, II, 23 f*.
— Echinorhynchus: 2, VII, II, 30 ff*.
— Plumatella: 10, XXIII, 3 ff*.
Spinalnerven von Argyropelecus: 13, XXXII, 27 ff*.
Spuler, A. Papilionidae: 3, VIII, II, 156 f.
Stahl. Aethalium septicum: 7, XVIII, 9.
Staudinger. Mimicry: 3, VIII, II, 89. 129 f.
— Papilionidae: 3, VIII, I, 2. 52. 55. 76.
Steenstrup, J. Leucochloridium: 1, IV, 8. 44 f.
Stein, F. Infusoria: 1, V, 2 f.
— Colpidium: 1, V, 44.
— Cyclidium: 1, V, 62.
— Cyrtosomum: 1, V, 41.
— Glaucoma: 1, V, 35.
— Holophrya discolor: 1, V, 12.
— Lembadion: 1, V, 57.
— Nassula: 1, V, 28. 31.
— Pleuronema: 1, V, 60.
— Urocentrum: 1, V, 54.
Steiner, J. Geruchssinn der Haifische: 7, XVIII, 190.
Stiles, Ch. W. Echinorhynchus: 2, VII, II, 139 f.
Stoller, J. H. On the organs of respiration of the Oniscidae, 10, XXV*.
Stossich. Distomum: 6, XVI, 178 218.
Strahl. Decapoden, Antennen: 7, XIX, 118.
Ströse. Echinorhynchus: 2, VII, I, 57.
Stokes, A. Balantizoon agile: 1, V, 9
— Urotricha platystoma: 1, V, 8.
Stromer von Reichenbach, E. Die Wirbel der Land-Raubtiere, ihre Morphologie und systemat. Bedeutung: 15, XXXVI*.
Strubell, A. Untersuchungen über den Bau und die Entwickelung des Rübennematoden Heterodera Schachtii Schmidt: 1, II*.
Studer, Th. Tiefsee-Siphonophoren: I, 1, 45.
— Cyclops: 8, XXI, 162.
Symbiose. Zoochlorellen u. Infusorien: 1, V, 40.
Symes, D. Mimicry: 3, VIII, II, 132 f.
Sympathicus von Argyropelecus: 13, XXXII, 32 ff*.
Szczawinska. Facettenauge: 7, XIX, 232 f.

T.

Tastsinn der Ameisen: 11, XXVI, 49*.
Tauber. Säugetiere, Gebiss: 6, XVII, 11 f. 34. 46. 60 f. u. ö.
Tellkampf, Th. G. Auge von Typhlichthys: 4, XIII, 59.
Temperatur. Einfluss auf die pelagische Fauna: I, 54.
Templeton. Cyclops: 8, XXI, 160.
Thallwitz, J. Distomum microstomum: 3, VIII, II, 149.
— Entomostraken: 4, XI, 13.
— Diaptomus: 8, XXI, 61.
Theobald, W. Mimicry: 3, VIII, II, 79.
Thiele, J. Studien über pazifische Spongien: 10, XXIV*.
Thieme, O. Mimicry: 3, VIII, II, 13 ff. 131.
Thomas. Marsupialia, Gebiss: 6, XVII, 83 f. 89. 105. 108.
Thomson, G. M. Cyclops: 8, XXI, 156 f.
— Guernea: 8, XXI, 185.
Thomson, Wyville. Untere Begrenzung der pelagischen Flora: I, 60.
Thorndike, E. L. Psychologie der Tiere: 11, XXVI, 92.
Tiefseefauna: 1* (Chun).
Tömösváry, E. Sinnesorgane bei Myriopoden: 13, XXXIII, 118.
— Geophilidae: 3, IX, 18 f.
Tömösvary'sches Organ. Entwickelung, Bedeutung: 13, XXXIII, 118 ff*. 122 ff.
Tomes-Holländer. Zahnbildung: 6, XVII, 8. 15. 17. 45.
Topsent. Spongia: 10, XXIV, I, 18 f. 37. u. ö.; 10, XXIV, II, 13 u. ö.
Tracheen. Entwickelung bei Scolopendra: 13, XXXIII, 103 f*.
Trembley, A. Statoblasten der Phylactolaemen: 2, VI, 68. 89.
Treub. Heterodera javanica: 1, II, 11.
Treutler, F. A. Echinorhynchus: 2, VII, I, 20. 37.
Treviranus. Oniscidae: 10, XXV, 7. 15. 43.
— Hydrachniden: 9, XXII, 5.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Trimen, R. Mimicry: 3, VIII, II, 3. u. ö. 117.
— Papilionidae: 3, VIII, I, 69 f.
Trochophora-Studien: 13, XXXIV* (Woltereck).
Trouessart, E. Bdella: 8, XX, 79 f.

U.

Ucke. Auge von Petromyzon: 4, XIII, 5 f.
Uljanin, W. N. Cyclops: 4, XI, 42 u. ö.; 8, XXI, 157.
— Canthocamptus: 5, XV, 34.
— Diaptomus: 8, XXI, 39. 61.
Ussow, M. Argyropelecus, Leuchtorgane: 13, XXXII, 1. 53. 55.

V.

Vallentin, R. Nyctyphanes, Leuchtorgane: 7, XIX, 199. 203 u. ö.
Vanhöffen, E. Auftrieb im Umanak-Fjord: 8, XX, 37.
— Untersuchungen über semaeostome u. rhizostome Medusen: 1, III*.
— Untersuchungen über Anatomie und Entwicklungsgesch. von Arachnactis albida Sars: 8, XX, 3 ff*.
— Cyttarocylis: 8, XX, 62.
— Sarsia: 7, XIX, 6. 10.
— Die grönländischen Ctenophoren: 8, XX, 15 ff.
— Oikopleura: 8, XX, 31.
Vávra, W. Ortracoda: 12, XXX, 8 u. ö.
Vayssière, A. Genitalien von Scolopendra: 13, XXXIII, 189.
Vejdovský, F. Tomopteris: I, 19 ff.
— Lumbricus: 7, XVIII, 149.
Velten, C. Geruchssinn der Pulmonaten: 7, XVIII, 164.
Verhoeff, C. Maxillen der Arthropoden: 13, XXXIII, 65.
— Anamorphose der Scolopendriden: 13, XXXIII, 70 f.
Vernet, H. Cyclops: 4, XI, 154 u. ö.
Verworn, M. Schwimmplättchen der Ctenophoren: 7, XVIII, 12.
— Magen der Phylactolaemen: 2, VI, 58.
— Excretionsorgan bei Phyl.: 2, VI, 53.
— Funiculus der Phyl.: 2, VI, 67.
— Statoblasten: 2, VI, 69. 75 ff. 99.
— Cristatella, Gleitmembran: 2, VI, 28.
Viallanes, H Arthropodengehirn: 13, XXXIII, 129. 140 u. ö.
Vigelius, W. J. Bugula: 10, XXIII, 81.
Vignier, C. Tomopteris: I, 19.
Villot, M. A. Echinorhynchus: 2, VII, I, 37; 2, VII, II, 135.
Virchow, R. Grönländerschädel: 8, XX, 95 ff.
Voeltzkow, A. Aspidogaster: 6, XVI, 212 f.
Vogt, C. Arachnactis: 8, XX, 3 u. ö.
— Physophora: I, 15.
— Bolina: 8, XX, 18.
— Dipurena: 7, XIX, 6 ff.
— Leucochloridium: 1, IV, 8.
— Canthocamptus: 5, XV, 20 f.
— Chilopoda: 3, IX, 17. 24. 33.
Voigt, W. Branchiobdella: 10, XXIII, 10.
Voll, A. Gefässe der Retina: 5, XIV, 178.
Vom Rath, O. Copepoda: 4, XI, 34.
— Lepaden: 7, XIX, 92.
— Geschmackssinn der Dekapoden: 7, XVIII, 134. 136.
— Fühler der Käfer: 7, XVIII, 92 f.
— Fühler d. Lepidopteren: 7, XVIII, 109.
Vosseler, J. Copepoden Deutschlands: 4, XI, 9 u. ö.; 5, XV, 10 u. ö.; 8, XXI, 16. 19 u. ö.
— Begattung der Copepoden: 7, XVIII, 141.
Vosmaer. Spongia: 10, XXIV, 1, 23.

W.

Wagener, G. Distomum: 5, XVI, 244; D. tereticolle: I, IV, 42.
— Leucochloridium: 1, IV, 9.
— Heterodera: 1, II, 9.
— Acanthocephalen: 2, VII, I, 24. 33. 37. 89; 2, VII, II, 72. 107 f. 117 f.
Wagner, M. Mimicry: 3, VIII, II, 131.
Wagner, N. Porcellio: 10, XXV, 10.
Waldeyer, W. Zahnbildung: 6, XVII, 7 f. 17.
Waldschmidt. Auge von Siphonops: 4, XIII, 101. 105.
Wallace, A. R. Mimicry: 3, VIII, II, 2 f. 20 u. ö. 80 ff. 82 ff. 98. 101. 117 u. ö.
— Austromalayische Lepidopterenfauna: 11, XXVII, 9 f.
— Papilionidae: 3, VIII, I, 21 f. 42 f.
Walter. Trematodes: 6, XVI, 118. 124 f. 186 u. ö.
— Cyclops: 4, XI, 52.
Wasmann, E. Taster der Insekten: 7, XVIII, 82.
— Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen: 11, XXVI*.
Watson. Hesperidae: 11, XXVII, 128. 130.
Weber. Geruch: 7, XVIII, 49.
— Trichoniscidae: 3, X, 2.
Wedl. Echinorhynchus: 2, VII, I, 36.
Weinland, D. F. Echinorhynchus: 2, VII, I, 37.
Weismann, A. Knospenbildung: 7, XIX, 26 ff.
— Auf- und Absteigen pelagischer Süsswassertiere: I, 52 f.
— Cladoceren-Auge: 11, XXVIII, 15 f. 32. 33 u. ö.
— Daphniden, Brutpflege: 3, X, 41.
— Lepidoptera, Duftorgane: 15, XXXVIII, 1. 5.
Welcker. Schädelmessung: 8, XX, 98.
Werner. Mimicry: 3, VIII, II, 80.
Westrumb, A. H. L. Echinorhynchus: 2, VII, I, 20. 24. 33. 36. 58. 61. 88. 119. 123; 2, VII, II, 21. 107.
Westwood. Papilio: 3, VIII, I, 74 f.
Wheeler, W. M. Enterocölie bei Insekten: 13, XXXIII, 216.
Wiedersheim, R. Auge von Myxine: 4, XIII, 49; von Petromyzon: 4. XIII, 5; von Siphonops: 4, XIII, 101. 103; von Proteus: 4, XIII, 69 f.
Wiegmann. Leucochloridium: 1, IV, 7 f.
Willemoes-Suhm, R. von. Lepas: 7, XIX, 80 ff. u. ö.
Willey, A. Dorsalorgan der Insekten: 13, XXXIII, 159 ff.
Wimperzellen, s. Cilien.
Winge, H. Säugetiere, Gebiss: 6, XVII. 34. 60. 83. 89. 93.
— Soricidae, Gebiss: 15, XXXVII, 30.
Winnertz. Sciarinae: 8, XX, 107.
Winton, W. E. de. Erinaceidae: 15, XXXVII, 18. 53.
Winterknospen, s. Paludicella.
Wirbel der Landraubtiere: 15, XXXVI* (Stromer von Reichenbach).
— W. fossiler Raubtiere: 15, XXXVI, 238 ff*.
— Wirbelsäule von Argyropelecus: 13, XXXII, 5.
Wolff. Geruchssinn der Biene: 7, XVIII, 51.
Woltereck, R. Trochophora-Studien, I. Über die Histologie der Larve und die Entstehung des Annelids bei den Polygordius-Arten der Nordsee: 13, XXXIV*.
Wood-Mason, J. Mimicry: 3, VIII, II, 82.
— Papilionidae: 3, VIII, I, 52 f.
Woodward, M. F. Säugetiere, Gebiss: 6, XVII, 84. 98 ff. 103. 139.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Woodward, M. F. Erinaceidae, Gebiss: 15, XXXVII, 11. 12 ff. u. ö
Wright, R. Trematodes: 6, XVI, 136. 171. 203.
Wrzesniowski, A. Infusoria: I, V, 2.
— Cinetochilum: 1, V, 49.
— Dileptus: 1, V, 24.
— Lionotus: 1, V, 22.
Wundt, W. Psychologie der Zelle: 7, XVIII, 3. 8.
— Wechselsinnesorgane: 7, XVIII, 28.
— Spezifische Sinnesorgane: 7, XVIII, 15 f.
Wyman, J. Auge von Typhlichthys: 4, XIII, 59 ff.

Y.

Yung. Chilopoda: 3, IX, 17. 24. 33.

Z.

Zacharias, O. Leptodora: 11, XXVIII, 54.
— Copepoden Deutschlands: 4, XI, 12 u. ö.; 8, XXI, 64 u. ö.
Zaddach. Plumatella: 2, VI, 2. 3.
Zahnsystem der Säugetiere. Ontogenie: 6, XVII* (Leche).
— Phylogenie, 1. Erinaceidae: 15, XXXVII* (Leche).
— Siehe auch Gebiss.
Zeder, J. G. H. Acanthocephalen: 2, VII, I, 20. 24. 58. 88; 2, VII, II, 20.
Zeller, E. Leucochloridium: I, IV, 9. 12. 15; 6, XVI, 236.
— Auge von Proteus: 4, XIII, 71.
Zenker, J. C. Echinorhynchus: 2, VII, I, I.
Ziegler, H. E. Trematodes: 6, XVI, 112. 116. 158. 179. 191. 200 u. ö.
— Cercarien: 1, IV, 16.
— Gasterostomum: 1, IV, 60.
— Psychologie der Ameisen: 11, XXVI, 3. 78 ff.
Ziehen, Th. Spezifische Sinnesorgane: 7, XVIII, 16.
Zirbel, s. Epiphysis cerebri.
Zittel, K. A. Myrmecobius, Gebiss: 15, XXXVII, 36.
Zograf, N. von. Chilopoda: 3, IX, 9, 16. 24.
— Geophilus: 13, XXXIII, 18. 65. 123 u. ö.
Zschokke F. Distomum: 6, XVI, 6. 21. 34. 172 f. 197.
— Cyclops: 4, XI, 45.
Zoja, R. Hydra, chemischer Sinn: 7, XVIII. 182.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zoologica (bis Bd 8 unter dem Namen Bibliotheca Zoologica)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: 15

Autor(en)/Author(s): Chun Carl

Artikel/Article: Zoologica. Original-Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Zoologie 1-31