

innerhalb der Antennalfäße, wurde auch für *Syntomis phegea* und *Macroglossa stellatarum* sichergestellt.

Bei dieser Gelegenheit will ich endlich erwähnen, daß beim Seidenspinner der *Nervus suprainestinalis* zeitweise in das Innere der Aorta eindringt, und eine Weile im Lumen derselben verläuft; dasselbe findet eben so im Larvenzustande wie bei der Imago statt, wenn auch mit jenen Modalitäten, welche die verschiedene Endigungsweise der Aorta in beiden Entwicklungsphasen mit sich bringt.

Padua, R. Stazione Bacologica Sperimentale.

#### 4. Die Begattung der *Lacerta vivipara* (und *agilis*).

Von H. Chr. C. Mortensen.

eingeg. 13. September 1887.

Leider sind in meiner kleinen Mittheilung über diese Sache (s. Zool. Anz. 1887, No. 259) während des Reinschreibens einige Worte ausgefallen, welche die Herren Zoologen gütigst p. 464 hinzufügen wollen, so daß da zu stehen kommt:

»Diese Begattungszeichen bleiben lange (nämlich bis zum nächsten Hautwechsel) — oft Monate, in einzelnen Fällen fast den Sommer hindurch sichtbar.«

Copenhagen, 10. September 1887.

### III. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc.

#### 1. Linnean Society of New South Wales.

31<sup>st</sup> August, 1887. — 1) Botanical. — 2) Notes on *Zelotypia Stacyi*, and an account of a Variety. By A. Sidney Olliff, F.E.S. This paper contains a few notes on the larva and pupa of the magnificent Hepialid described by the late Mr. A. W. Scott, under the name *Zelotypia Stacyi*, and a description of a variety which is named var. *sinuosa* on account of certain differences in its markings. The specimens were obtained by Mr. Thornton at Newcastle, and the larva and pupa are now in the collection of the Australian Museum. — 3) A Revision of the Staphylinidæ of Australia. Part III. By A. Sidney Olliff, F.E.S., Assistant Zoologist, Australian Museum. This paper contains descriptions of the genera and species belonging to the subfamily Staphylininæ. A number of species are characterized as new, and several genera are added to the Australian list, of which *Actinus*, *Mysolius*, and *Colonia* (n. g.) are perhaps the most interesting. Many new localities for known forms are recorded. — 4) Miscellanea Entomologica, No. 4. »The Helæides.« By William Macleay, F.L.S., &c. In this paper the winged genera of the subfamily only are included: the apterous genera are to form the subject of another paper. All the known species of *Encara* and *Pterohelæus* are re-described and grouped in sections and subsections, and a number of new species are described. — 5) Description of three new species of Mammals from North West Australia. By E. P. Ramsay, F.R.S.E. In this paper are described (1) A new species

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Mortensen Hans Christian Cornelius (Ch. C.)

Artikel/Article: [4. Die Begattung der Lacerta vivipara \(und agilis\) 563](#)