

deutsame Überreste zusammengesetzter Augen seien, veranlaßte ihn zu einer Überschätzung des systematischen Werthes dieses Merkmals. Es giebt so manche andere, phylogenetisch nicht minder bedeutsame Merkmale, die Claus nur deshalb minder imponieren, weil sie längst bekannt sind, so die Fünfgliedrigkeit des Abdomens, die Schwimmfußform des fünften Thoraxfußes u. a. m. Der Beziehungen der Parapontellinae zu den Pontellinae sind so viele, daß man jene als Zweig des Pontellidenastes aufzufassen hat, an welchem die Rückbildung der dorsalen Augen (und des ventralen ebenfalls) noch weiter vorgeschritten ist, als sie es schon bei *Monops* und *Pontellina* im Vergleich zu den übrigen Genera der Pontellinae ist.

(Schluß folgt.)

#### 4. Berichtigung.

Von Dr. Bergendal in Lund.

In meinem vor Kurzem in Öfversigt af Kongl. Svenska Vet. Akad. Förhandlingar 1893 No. 9 p. 589 veröffentlichten Aufsätze »Einige Bemerkungen über die Rotiferengattungen *Gastroschiza* Bergendal und *Anapus* Bergendal« habe ich, wie der sachverständige Leser ohne Weiteres einsieht, die Speciesnamen *G. foveolata* Jägerskiöld und *G. flexilis* Jägerskiöld durchgängig verwechselt. Wo *G. foveolata* steht, soll also *G. flexilis* gelesen werden und umgekehrt. Nur in der Zeile 5 p. 597 bleibt *G. flexilis* stehen.

Lund, im März 1894.

## II. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc.

### Zoological Society of London.

6th February, 1894. The Secretary read a report on the additions that had been made to the Society's Menagerie during the month of January, 1894. — Mr. Sclater exhibited a fine mounted specimen of the Riverhog of Madagascar from the Tring Museum, lent for exhibition by the Hon. W. Rothschild, F.Z.S., and pointed out that three distinct species of this well-marked genus of *Suidae* were now known to occur in the Ethiopian Region. A communication from Mr. Last gave an account of the habits of this animal, as observed in Madagascar. — Mr. Sclater also exhibited a stuffed specimen of the Whitebilled Great Northern Diver (*Colymbus Adamsi*) from Norway, which had been lent to him by Prof. R. Collett, F.M.Z.S., and made remarks on the distribution of the species, and on its interest as occasionally occurring on the British coast. — Prof. Howes read a paper on synostosis and curvature of the spine in fishes, with especial reference to the Common Sole. — Mr. F. E. Beddard, F.R.S., gave an account of the development of the Tadpole of an African Frog (*Xenopus laevis*), as observed in specimens of this Batrachian hatched and reared in the Society's Gardens. — Mr. Chas. W. Andrews gave an account of some remains of the extinct gigantic bird

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Bergendal D.

Artikel/Article: [4. Berichtigung 95](#)