

12) *Xenia plicata* n. sp.

Tentakeln mit drei regelmäßigen Reihen sehr kurzer und runder Wärrchen auf jeder Seite der Mittellinie. Die Achse des Tentakels bleibt in ihrer ganzen Länge frei.

Basaltheil der Colonie in Form eines dicken, von Längsfalten durchzogenen Stammes, dessen oberes Ende eine leicht eingebogene Fläche ist. Auf dieser stehen die ansehnlichen von langen Tentakeln gekrönten Polypen. Die Tentakeln tragen in jeder Reihe 18 bis 22 Wärrchen.

Der Stamm ist dunkelgrau. Die Polypenkörper hellgrau.

13) *Xenia rubens* n. sp.

Tentakeln mit 5—6 unregelmäßigen Reihen sehr kurzer Wärrchen, welche die ganze innere Oberfläche des Tentakels bedecken.

Basaltheil der Colonie in Form eines längeren als breiten, glatten, gelappten Stammes. Seine breite convexe Oberfläche trägt zahlreiche Polypen. In jeder Reihe stehen 18—20 Pinnulae.

Die Farbe des Stammes ist im Formol röthlich, die des Polypenkörpers graugelb.

14) *Xenia samoënsis* Kollik.

Da sich in der kurzen Beschreibung dieser Form keine Angabe über Größe, Zahl und Gestalt der Pinnulae findet, läßt sich diese Species nicht in eine der drei Untergattungen einreihen.

Jena, den 22. April 1895.

5. Megaloglossus Woermanni Pgst.

Diagnose des erwachsenen Männchens.

Von Yngve Sjöstedt, Upsala.

eingeg. 2. Mai 1895.

Megaloglossus Woermanni Pgst.

Mas adult. feminae similis sed scuto pectorali lato albo distinguendus.

Habit. Kamerun, Ekundu; Febr. 1892.

II. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc.**1. Deutsche Zoologische Gesellschaft.**

Fünfte Jahresversammlung in Straßburg i/E.

vom 4.—6. Juni 1895.

1. Sitzung: Dienstag, den 4. Juni, 10 Uhr Vorm.

Ansprache des Vorsitzenden.

Bericht des Schriftführers.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Sjöstedt Yngve

Artikel/Article: [5. Megalogolossus Woermanni Pgst. 274](#)