

4. Diagnoses reptilium et batrachiorum novorum ab ill. Dr. Christ. Rutenberg in insula Madagascar collectorum.

Auctore Dr. O. Boettger.

Pachydactylus dubius n. sp.

Forma et statura medius inter *P. Cepedianum* var. *madagascariensem* Gray¹ et *P. laticauda* Boettg.¹, sed aperturis nasalibus magis lateribus et squamis nasalibus minoribus, inter se separatis squamulis 3 internasalibus in transversum positis. Pori femorales utrimque solum 12—13. Rostrale postice truncatum, media parte leviter incisum. Submentalia 8 perparva, magnitudine aequalia, squamulas sequentes gulares magnitudine vix superantia. Squamae dorso-laterales trunci pro genere magnae, rotundae, lentiformes, planulatae; squamae caudae latae, deplanatae, parum distincte verticillatae majores, verticillus singulus e seriebus squamarum 5—6 compositus.

Supra sordide castaneus, antice flavescenti, postice caeruleo variegatus et maculatus, strigis lateralibus binis vicinis nigrescentibus, membris basique caudae caerulescentis eleganter obscure vermiculatis, gula parteque tota infera flavescente unicolore (spec. unic.).

Long. total. 109; capitis 16, trunci 35, caudae 58 mm.

Sicut sequentes species varietatesque novae ab ill. Dr. Hubert Ludwig, directore musei Bremensis, benigne communicatus.

Hyperolius renifer n. sp.

Lingua parva, parum lata, cylindratopiriformis, postice leviter emarginata.

Corpus fere subclavatum, in regione capitidis latius, postice angustatum. Caput breve, obtusatum, rostro non truncato, subaltum, fronte distincte longitudinaliter concavum, tympano occulto; clypeus gularis maris multo latior quam longior, reniformis, postice media parte emarginatus. Glandulae prope angulum oris distinctae, crebrae. Cutis dorsi laevis. Digi manus $\frac{1}{3}$, pedis $\frac{3}{4}$ palmati. Tuberculus singulus parvus in metatarso. Articuli subdigitales perdistincti; caeterum plantae manus pedisque sicut venter parsque interna femorum glandulosogranulatae.

Supra obscure olivaceus, ab oculo usque ad lumbos taenia longitudinali singula laterali subdistincta albida ornatus. Circa anum albidus; infra totus fusculus. Humerus femurque supra colore carentes (spec. unic.).

¹ Vide Carus' Zoolog. Anzeiger 1880. p. 280.

Long. total. ♂ 21; membr. anter. 15, poster. 36 mm. Clypeus gularis ♂ 4 mm longus, $6\frac{1}{2}$ latus.

Hyperolius Rutenbergi n. sp.

Lingua mediocris, cordiformis, postice distincte emarginata.

Corpus pro latitudine longum, subfusiforme. Caput breve, rostro acutiusculo, oculis eminentibus, tympano occulto; clypeus gularis maris latissimus, semicircularis, postice media parte non emarginatus. Glandulae prope angulum oris nullae, sed plica singula libera cutanea curvata ad latera menti a regione tympanali usque ad clypeum gularem decurrente. Cutis dorsi laevis, ventri glandoso-granulata; pars interna femorum fere laevis. Digihi manus fere $\frac{1}{4}$, pedis plus quam $\frac{1}{2}$ palmati. Articuli subdigitales subdistincti; disci scannerii minimi, articulati.

Supra griseo-ater, strigis longitudinalibus 5 argenteis ornatus, scil. 1) striga mediana dorsali inter orbitas incipiente usque ad anum decurrente, 2) striga laterali a rostro incipiente super orbitam ad anum decurrente, 3) striga laterali a rostro incipiente, sub orbita labium superum cingente, usque ad lumbos decurrente. Mentum zona argentea Δ -formi et clypeo sordide argenteo, griseo indistincte maculato ornatum. Vesica clamatoria atra. Membra striga longitudinali argentea singula, in radio et in tibia binis eleganter lineata; femur supra colore carens et sicut venter pallide carneum (spec. unic.).

Long. total. ♂ 25; membr. anter. 18, poster. 37 mm. Clypeus gularis ♂ fere 3 mm longus, $5\frac{1}{2}$ latus.

Polypedates dispar Boettg. var. *leucopleura* m.

A typo² rostro subtruncato, tubis minus apertis, colore laetiore discrepans. ♀ supra griseo-isabellina, punctulis nigris irregularibus hic illuc sparsa, striga alba labium superum cingente strigisque binis albis in lateribus corporis, superiore perdistincta, latiore ornata (spec. unic.).

Long. total. ♀ 33; membr. anter. 19, poster. 52 mm.

Hylambates microtympanum n. sp.

Lingua magna, crassa, late cordiformis, postice bicornis; dentes palatales duos acervulos formantes fastigia postica choanarum distincte superantes. Aperturae choanarum tubarumque aequa fere magnitudine.

Corpus hylaeiforme, rostro rotundato-subacuminato, maxilla infera antice distincte truncata, cantho rostralii parum acuto, aperturis nasa-

² Vide Jahresber. d. Senckenberg. naturf. Gesellsch. 1878/79. p. 86 et Boettger, Rept. u. Amph. von Madagascar, II. Nachtrag, p. 32.

libus mediis inter rostrum et bulbos satis parvos modiceque eminentes sitis, regione frenali alta. Membrana tympani sub cute subocculta, minima, $\frac{1}{3}$ bulbi vix superans. Plica cutanea supertympanalis angusta parumque distincta. Cutis dorsi laevissima, nitida; ventri, laterum, femorum densissime et valide glanduloso-granulata. Disci scansorii minimi, articulati. Digihi bini externi manus basi membrana conjunctiva distincta juncti, bini interni liberi, nec illis oppositi. Pedes $\frac{2}{3}$ palmati. Articuli subdigitaIes parum distincti; plantae omnes membranaque natatoria distinete glanduloso-granulatae. Digitus secundus manus primo longior; tertius omnium valde longissimus. Tuberculus parum validus ad basin hallucis.

Supra griseus, lacunis nigrescentibus anguste albolimbatis, hic illie confluentibus, vario modo eleganter variegatus, membris eodem modo transversim taeniatis. Latera corporis clunesque sordide albo-maculata punctataque. Infra totus fusculus (spec. unic.).

Long. total. 27; membr. anter. 21, poster. 49 mm.

Francofurtum ad Moenum, Idibus Decbr. 1880.

III. Mittheilungen aus Instituten, Gesellschaften etc.

1. Società Entomologica Italiana, Firenze.

Adunanza del 26. Decbre. 1880. — Gribodo, Descrizioni di quattro nuove specie di Imenotteri raccolte in Calabria dal Segretario (Cavanna) *Selandria Vollenhoveni*, *Pelissus Vollenhoveni*, *Proctotrupes meridionalis*, *Panurgus Cavannae*). — C. Della Torre, Alcuni Esapodi viventi nella grotta di Oliero (Bassano). — Camerano, Mostruosità di una *Triphaena fimbria* L. e sulla *Gracilia timida* Ménét. in Piemonte. — Piolti, *Chrysomela menthastris* Suff. monstruosa. — Failla Tedaldi, *Rosalia alpina* melanotica di Sicilia. — Fiori, *Hippoboscitae* di recente raccolte nel Modenese. — Cavanna e Gentile, Grande quantità di *Macroscytus brunneus* Fab. a Porto Maurizio il 4. Luglio 1880. — Stefanelli, Comunic. intorno a Libellulidi della Toscana. — Fanzago, Descrizione del *Lithobius brachycephalus* n. sp. raccolta dal Segr. Cavanna nelle Marche. — Cavanna, Annunzio relativo ai Materiali raccolti in Basilicata (nuove specie di Aracnidi studiati da Simon etc. etc.)

IV. Personal-Notizen.

Indian Museum. Calcutta.

Superintendent: John Anderson, M.D., F.R.S., F.L.S., F.Z.S. etc.

Deputy Superintendent: James Wood-Mason, F.L.S., etc.

First Assistant Superintendent: Geoffrey Nevill, F.L.S. etc.

Second Assistant Superintendent: Oscar L. Fraser.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Boettger Oskar

Artikel/Article: [4. Diagnoses reptilium et batrachiorum novorum ab ill. Dr. Christ. Rutenberg in insula Madagascar collectorum 46-48](#)