

Verzeichnis der Großschmetterlinge aus der Umgebung von Magdeburg und des Harzgebietes.

Zusammengestellt von **Gustav Bornemann**, Magdeburg.

Der Verfasser hat sich schon seit Jahren die Aufgabe gestellt, eine Zusammenstellung der Schmetterlingsfauna von Magdeburg und Umgebung herauszugeben. Die Schwierigkeit dieser Arbeit hat ihn immer wieder zurückgeschreckt, sah er doch ein, dass die Herausgabe einer solchen ersten Zusammenstellung noch viele Mängel und Fehler aufweisen würde. —

Das Erscheinen der Schmetterlingsfauna von Berlin im Jahre 1902 und der Fauna des Königreichs Sachsen, herausgegeben vom Entomologischen Verein Iris in Dresden im Jahre 1905, hat ihm neue Anregung gegeben, die bereits angefangene Arbeit von neuem aufzunehmen und dank der unermüdlichen Beihilfe seiner entomologischen Freunde nunmehr zu Ende zu bringen. —

Für die Zusammenstellung sind diese beiden erwähnten Arbeiten vorbildlich gewesen. Das Gebiet umfasst Magdeburg mit seiner Umgebung bis zu ca. 50 Kilometer Entfernung; auch ist das Harzgebiet, das für die Magdeburger Sammler günstig liegt und vielfach als Ferien- und Sommer-Aufenthalt benutzt wird, mit hineingezogen worden. Die Verzeichnisse der Grossschmetterlinge des nordöstlichen Harzrandes von W. Reinecke und der Grafschaft Wernigerode von H. Fischer sind bei der Arbeit mit benutzt worden. —

Der Anordnung und Benennung der einzelnen Familien, Gattungen und Arten liegt der Katalog von Staudinger und Rebel III. Auflage 1901 zu Grunde. Die Flugzeit der Schmetterlinge, die Beobachtungen über deren Häufigkeit oder Seltenheit sind von den Mitgliedern der entomologischen Vereinigung Magdeburg festgestellt. Ein gleiches gilt von dem Vorkommen der Raupen, soweit eigene Beobachtungen gemacht worden sind. Bei den nicht beobachteten Raupen sind Erscheinungszeit und Futterpflanze nach den sichersten Quellen ausgefüllt. Bei selteneren, wenig verbreiteten Arten ist der genaue Fundort angegeben.

Magdeburg, im April 1912.

Gustav Bornemann.

Abkürzungen:

R. = Raupe.

♂ = Mann.

♀ = Weib.

I. Papilionidae.

1. *Papilio* (L.) Latr.

1. *P. podalirius* L. Mai bis Mitte Juli; häufig im Harz, vereinzelt bei Alvensleben und im Barleber Busch. R. Juli, August an *Prunus*-Arten.
2. *P. machaon* L. Mai, Juni und Juli, August; überall häufig auf Wiesen, Feldern und an Dämmen. R. bis in den Oktober hinein auf Doldenpflanzen.
- a) *ab. gen. aest. aurantiaca* Spr. unter der Stammform.

2. *Parnassius* Latr.

3. *P. mnemosyne* L. Anfang Juni; an einzelnen Stellen im Harz nicht selten, beobachtet im Bodetal, im Selketal, bei Stiege, Lauterberg und Stolberg. R. im Frühjahr an Lerchensporen.

II. Pieridae.

3. *Aporia* Hb.

4. *A. crataegi* L. Juni, Juli; verbreitet, tritt sehr vereinzelt auf, doch in manchen Jahren (zuletzt 1888) sehr häufig. R. überwintert im gemeinschaftlichen Gespinst, im Mai erwachsen an *Prunus*- und *Crataegus*-Arten.

4. *Pieris* Schrk.

5. *P. brassicae* L. Mai bis Oktober in 2 bis 3 Generationen; überall gemein. R. vom Juni ab an Kohlarten.
6. *P. rapae* L. in 2 Generationen vom April bis September; häufig. R. an Kohlarten, Reseda und Kapuzinerkresse.
- a) *v. (et ab.) leucotera* Stdf. zuweilen unter der Stammform.

7. **P. napi L.** April bis August in 2 Generationen; sehr häufig auf Waldwiesen, Lichtungen und an buschigen Abhängen. R. Juni bis Oktober an Kreuzblütlern.

a) *gen. aest. napaeae Esp.* als II. Generation.

8. **P. daplidice L.** Juli bis September; nicht selten an Dämmen. R. an *Sisymbrium* im Mai bis Juli.

a) *gen. vern. bellidice O.* April, Mai; seltener als die Stammform. R. Juli, August.

5. **Euchloë Hb. (*Anthocharis B.*)**

9. **E. cardamines L.** April bis Juni; häufig auf Wiesen, in lichten Waldungen und in den Anlagen. R. Juni, Juli an Wiesenschaumkraut, Turmkraut und Kressenarten.

6. **Leptidia Billb. (*Leucophasia Stph.*)**

10. **L. sinapis L.** Juli, August; vereinzelt im lichten Laubgehölz. R. an Hornklee, Linsen usw. im Juni.

a) *gen. vern. lathyri Hb.* Frühjahrs-Generation. Mai, Juni; vereinzelt wie die Stammform.

b) *gen. aest. dimiensis B.* selten unter der Sommer-Generation.

7. **Colias (F.) Leach.**

11. **C. hyale L.** vereinzelt im Mai, häufig Juli bis September auf Wiesen und Kleefeldern. R. an Kleearten.

12. **C. edusa F.** Juli bis September; selten, in einzelnen Stücken beobachtet. 1908 mehrfach noch im Oktober gefangen. R. wie vorige Art.

13. **C. myrmidone Esp.** sehr selten; 1 Stück bei Möckern gefangen.

8. **Gonopteryx Leach.**

14. **G. rhamni L.** Überwinterte Stücke in den ersten warmen Frühlingstagen; von Anfang Juli an gemein in lichten Wäldern, auf Wiesen und in den städtischen Anlagen. R. Juni bis August an Faulbaum.

III. **Nymphalidae.**

A. **Nymphalinae.**

9. **Apatura F.**

15. **A. iris L.** Juli; nicht selten, in Waldungen, wo die Futterpflanze wächst. R. Herbst bis Juni an Salweide.

a) *ab. jole Schiff.* sehr selten unter der Stammform.

16. **A. ilia Schiff.** Juni, Juli; nicht selten, in Waldungen, wo die Futterpflanze zu finden. R. Herbst bis Juni an Zitterpappel.
 a) *ab. (et v.) clytie Schiff.* häufiger als die Stammform.

10. Liminitis F.

17. **L. populi L.** Juni, Juli; stellenweise häufig, in Waldungen, wo die Futterpflanze zu finden. R. Herbst bis Mai an Zitterpappel.
 a) *ab. ♂ tremulae Esp.* nicht selten unter der Stammform.
 18. **L. sibylla L.** Juni, Juli; häufig, in Laubwaldungen, wo Geisblatt wächst. R. Herbst bis Mai an wildem Geisblatt.

11. Pyrameis Hb.

19. **P. atalanta L.** August bis Juli; nicht selten in den Anlagen und auf Waldwegen. R. Mai bis Oktober zwischen zusammengezogenen Blättern an Nesseln.
 20. **P. cardui L.** August bis Frühjahr; nicht selten auf Wiesen, Feldern und an Dämmen, in manchen Jahren häufig. R. Juli, August in dünnem Gespinste an Distelarten und Nesseln.

12. Vanessa F.

21. **V. jo L.** Juli bis Mai; überall häufig. R. Mai bis Herbst gesellig an Nesseln.
 22. **V. urticae L.** Juni bis Mai; überall sehr häufig in mehreren Generationen. R. Mai bis Herbst gesellig an Nesseln.
 23. **V. xanthomelas Esp.** Juni, Juli; selten im Harz. R. Mai, Juni an Weiden.
 24. **V. polychloros L.** Juli bis Mai; häufig in den Anlagen und an Wegen. R. Mai, Juni gesellig an Ruster, Weide, Kirsche und Birnbäumen.
 25. **V. antiopa L.** Ende Juli bis Mai; häufig. R. Juni, Juli gesellig an Birke, Weide und Pappel.
 a) *ab. hygiaea Hdrch.* durch Kälte-Einwirkung gezogen.

13. Polygonia Hb.

26. **P. c. album L.** Juni bis Mai; häufig in 2 Generationen. R. Mai bis September einzeln an Nessel und Hopfen.
 a) *ab. f-album Esp.* sehr selten, bei Schönebeck 1 Stück gefangen.

14. Araschnia Hb.

27. **A. levana L.** April, Mai; häufig in Wäldern. R. August, September gesellschaftlich an Nessel.
 a) *gen. aest. prorsa L.* Juli, August; häufig. R. Juni, Juli.
 b) *ab. porima O.* selten, häufiger auf Eis gezogen.

15. *Melitaea* F.

28. **M. maturna** L. Juni; selten, im Harz bei Ballenstedt, bei Thale im Steinbachtal. R. im Frühjahr, erst an niederen Pflanzen, später an Weide und Esche.
29. **M. aurinia** Rott. Mai, Juni; nicht selten auf feuchten Wiesen bei Ramstedt, Mahlpfuhl, Vaethen, Helmstedt. R. bis Anfang Mai an Skabiosen.
30. **M. cinxia** L. Juni; häufig auf trockenen Wiesen in der Kreuzhorst, bei der Klus, bei Alvensleben und Vaethen. R. bis Anfang Mai an Wegerich, Schafgarbe usw.
31. **M. phoebe** Knoch. Juni, Juli; selten, Möckern, Forsthaus Planken. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
32. **M. didyma** O. Juli, August; nicht selten, Möckern, Burg, Letzlinger Heide. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
33. **M. athalia** Rott. Juni, Juli; überall häufig auf Waldwiesen und an Bergabhängen. R. bis Mai an Wachtelweizen.
34. **M. aurelia** Nick. Juli; nicht selten, bei Planken und Vaethen. R. bis Juni an niederen Pflanzen.
35. **M. dictynna** Esp. Juni, Juli; nicht selten auf feuchten Waldwiesen bei Vaethen, Stendal, Alvensleben, Klappermühle usw. R. bis Frühjahr an Wegerich usw.

16. *Argynnis* F.

36. **A. aphirape** Hb. Juli; sehr selten, im Ellernbruch an der Ehle. R. bis Frühjahr an Natterwurz.
37. **A. selene** Schiff. Mai und Juli, August; überall häufig auf Wiesen und Waldlichtungen. R. bis Frühjahr und im Juni an Veilchen.
38. **A. euphrosyne** L. wie vorige Art, aber weniger verbreitet auf Wiesen und Waldwegen. R. wie vorige Art.
39. **A. pales** Schiff. v. *arsilache* Esp. Juli; häufig im Oberharz bei Oderbrück, Sonneberger Weghaus. R. bis Frühjahr an Veilchen.
40. **A. dia** L. Mai, Juni und Juli, August; häufig auf Waldwiesen, Biederitzer Busch, Kreuzhorst, Alvensleben, Neuwaldensleben. R. wie *A. selene*.
41. **A. ino** Rott. Ende Juni, Juli; häufig auf sumpfigen Waldwiesen, Vaethen, Ramstedt, Möser, Weissewarthe. R. bis Frühjahr an Wiesenknopf.
42. **A. lathonia** L. im Frühjahr und Spätsommer; überall häufig auf Wegen und Feldern. R. an Stiefmütterchen.
43. **A. aglaja** L. Juli; überall häufig auf Waldwiesen und Waldlichtungen. R. bis Mai an Hundsveilchen.

44. **A. niobe** L. Juni, Juli; häufig auf freien Waldplätzen. R. bis Mai an Veilchen.
- a) *ab. pelopia* Bkh. Im hiesigen Gebiet mehrere Stücke gefangen, bei Planken und Weissewarthe.
- b) *ab. eris* Meig. Häufiger als die Stammform.
45. **A. adippe** L. Juli; weniger häufig als *A. niobe*, auf bergigen Waldwiesen bei Planken, Alvensleben, Klus. R. wie vorige Art.
- a) *ab. et v. cleodoxa* O. selten unter der Stammform.
46. **A. paphia** L. Juli, August; häufig auf Waldwegen, Waldwiesen und Lichtungen. R. bis Mai an Veilchen, Brombeeren usw. Mehrere Albinos bei Neuwaldensleben.
- a) *ab. ♀ (dimorph) valesina* Esp. Nicht selten unter der Stammform.

B. Satyrinae.

17. Melanargia Meig.

47. **M. galathea** L. Juli, August; überall häufig auf Wiesen. R. bis Juni an Gräsern.
- a) *ab. ♀ leucomelas* Esp. selten unter der Stammform.
- b) *v. procida* Hbst. je 1 Stück am Fort bei Neustadt-Magdeburg und bei Möser gefangen.
- c) *ab. galene* O. 1 Stück im Biederitzer Busch gefangen.

18. Erebia Dalm.

48. **E. epiphron** Kn. Juni, Juli; nicht selten im Harz (Brockengebiet).
49. **E. medusa** F. Mai, Juni; häufig auf Waldwegen und Waldwiesen. R. bis Mai an Gräsern.
50. **E. aethiops** Esp. Juli, August; häufig im Harz in Wäldern. R. bis Juni an Gräsern.
51. **E. ligea** L. Juli; häufig im Harz in Wäldern.

19. Satyrus (Latr.) Westw.

52. **S. alcyone** Schiff. Juli, August; nicht selten in Kiefernwäldern. R. bis Juni an Gräsern.
53. **S. briseis** L. Juli, August; nicht selten, an sonnigen Abhängen, namentlich an Porphyrfelsen bei Neuwaldensleben und Alvensleben. 1 Stück im Pilm gefangen.
54. **S. semele** L. Juli, August; überall häufig. R. bis Frühjahr an Gräsern.

55. **S. statilinus** Hufn. August; nicht häufig, in sandigen Kiefernsonnungen, hinter Möser, bei Gerwisch, Zielitz, Tochheim und in der Klus. R. bis Frühjahr an Gräsern.

56. **S. dryas** Sc. Juli; häufig, bei Planken und Colbitz. R. bis Frühjahr an Gräsern.

20. *Pararge* Hb.

57. **P. aegeria** L. v. **egerides** Stgr. Mai bis Anfang August in 2 Generationen; überall häufig in Wäldern. R. an Gräsern.

58. **P. megaera** L. Mai bis September; 2 Generationen, überall häufig auf Feldwegen und Wiesen. R. an Gräsern.

59. **P. maera** L. Juni und August, September; häufig im Harz an steinigten Orten. R. bis Mai und im Juli an Gräsern.

60. **P. achine** Sc. Juli; im Hillerslebener Busch, häufig bei Ballenstedt (Harz) in Laubwaldungen. R. bis Mai an Gräsern.

21. *Aphantopus* Wallgr.

61. **A. hyperanthus** L. Juni, Juli; häufig im Laubwald und auf Waldwiesen. R. bis Mai an Gräsern.

a) *ab. arete* Müll. selten unter der Stammform.

22. *Epinephele* Hb.

62. **E. jurtina** L. (*janira* L.) Juni bis August; überall gemein. R. bis Frühjahr an Gräsern.

63. **E. lycaon** Rott. Juli bis September; häufig auf trockenen Grasplätzen, bei Möser, Möckern und in der Klus. R. bis Juni an Gräsern.

64. **E. tithonus** L. Juli; selten, auf Waldwiesen, bei Möser, bei Tochheim, im Biederitzer Busch und in der Klus. R. bis Juni an Gräsern.

23. *Coenonympha* Hb.

65. **C. hero** L. Juni, Juli; stellenweise nicht selten, auf Waldwiesen und an lichten Waldplätzen, bei Weissewarthe und Alvensleben. R. bis Frühjahr an Gräsern.

66. **C. iphis** Schiff. Juni, Juli; häufig auf Waldwiesen und in Waldlichtungen. R. wie vorige Art.

67. **C. arcania** L. Juni bis August; häufig in Waldlichtungen und auf Waldwiesen. R. wie vorige Arten.

68. **C. pamphilus** L. Mai bis September; überall gemein, auf Wegen und Wiesen. R. bis Mai und im Juli, August an Gräsern.

69. **C. tiphon Rott.** Juni, Juli; selten, auf feuchten Wiesen, bei Möser, Vaethen, Barby und in der Klus. R. bis Mai an *Carex*-Arten.

IV. Erycinidae.

24. Nemeobius Stph.

70. **N. lucina L.** Mai; nicht häufig, auf lichten Waldplätzen, bei Ramstedt, Alvensleben. R. bis Frühjahr an Ampfer und Primeln.

V. Lycaenidae.

25. Thecla F.

71. **T. spini Schiff.** Juli; selten, in lichten Laubwäldern, bei Burg. R. Mai, Juni an Schlehe und Kreuzdorn.
 a) *ab. lynceus Hb.* 1 ♀ unter der Stammform gefangen.
72. **T. w. album Knoch.** Juni, Juli; nicht selten, in Laubwäldern, bei Wolmirstedt, Barby, in der Kreuzhorst, im Biederitzer Busch. R. Mai an Rüster. Mordraupe.
73. **T. ilicis Esp.** Juni, Juli; selten, im Laubwald, bei Ramstedt, Weissewarthe, am Harzrand häufig. R. Mai an Eichen. Mordraupe.
74. **T. pruni L.** Mai, Juni; häufig im lichten Laubwald. R. April, Mai an Schlehe. Mordraupe.

26. Callophrys Billb.

75. **C. rubi L.** April, Mai und Juli; nicht häufig, bei Ramstedt, Alvensleben, häufiger im Harz. R. an Ginster und Brombeeren.

27. Zephyrus Dalm.

76. **Z. quercus L.** Juli; häufig in Eichenwäldern, im Biederitzer Busch, in der Kreuzhorst. R. Mai, Juni an Eiche.
 a) *ab. ♀ bellus Gerh.* sehr selten unter der Stammform.
77. **Z. betulae L.** Juli, August bis Oktober; überall häufig. R. Mai bis Juli an Schlehe und Pflaume.

28. Chrysophanus Hb. (Polyommatus Latr.)

78. **C. virgaureae L.** Juni bis August; häufig auf Waldwiesen. 1893 ist bei Plötzky ein Zwitter gefangen, rechts ♀, links ♂. R. bis Mai an Ampferarten.
79. **C. dispar Hw. v. rutilus Wernb.** Juni, Juli; selten, auf sumpfigen lichten Waldstellen, bei Mahlpfuhl, Weissewarthe, Burg. R. August, bis Mai an Wasserampfer.

80. **C. hippothoë L.** Juni, Juli; häufig auf feuchten Wiesen. R. bis Mai an Ampfer.
- a) *ab. confluens Gerh.* selten unter der Stammform.
81. **C. alciphron Rott.** Juni bis August; stellenweise häufig, auf feuchten Waldwiesen und Waldwegen. R. August bis Mai an Ampfer.
82. **C. phlaeas L.** Mai und August, September; überall gemein. R. Herbst bis April und Juni—September an Ampfer.
- a) *ab. schmidtii Gerh.* sehr selten, einmal im Gebiet gefangen.
- b) *gen. aest. eleus F.* selten unter der Sommer-Generation.
83. **C. dorilis Hufn.** Mai und Juli bis Oktober; gemein auf Wiesen und Wegen. R. bis April und Juni bis August an Ampfer.
84. **C. amphidamas Esp.** (helle Hb.) sehr selten nach Fischer bei Wernigerode Mai, Juni.

29. **Lycaena F.**

85. **L. argiades Pall.** Mai und Juli, August, selten, auf Rainen und Wegen, Tangermünde, Arneburg, Arendsee. R. bis April und Juni an Kleearten
- a) *gen. vernal. polysperchon Berg.* Mai, ist die seltenere Frühlingsform
86. **L. argus L.** (aegon Schiff) Juli, häufig auf trockenen Grasplätzen und in der Heide. R. bis Juni an Ginster.
87. **L. argyrognomon Bergstr.** (argus Esp.) Juni, Juli, seltener als argus L. R. an Steinklee bis Juni.
88. **L. optilete Knoch.** Juli; selten, auf moorigen Waldwiesen, bei Mahlpfuhl. R. bis Juni an Sumpfheidelbeere und Sumpfporst.
89. **L. baton Bergstr.** Mai und Juli; selten, bisher nur bei Tochheim gefangen.
90. **L. orion Pall.** Juni; selten, im Harz an der Rosstrappe, bei Rieder und Elbingerode. R. August an Fetthenne.
91. **L. astrarche Bergstr.** Mai und Juli, August; nicht häufig, auf lichten Waldplätzen, bei Alvensleben, Tangermünde, im Biederitzer Busch und in der Klus. R. bis April und Juni, Juli an Reiherschnabel.
- a) *ab. (et v.) allous Hb.* selten unter der Stammform.
92. **L. icarus Rott.** Mai und Spätsommer; überall sehr häufig. Im Jahre 1894 ist in der Klus ein Zwitter gefangen links ♂, rechts ♀. R. bis Mai und Juni bis August an Hauhechel, Ginster usw.
- a) *ab. icarinus Scriba.* vereinzelt unter der Stammform.
- b) ♀ *ab. (dimorph) caerulea Fuchs.* nicht selten unter der Stammform.
93. **L. amandus Schn.** Juni, Juli; nicht häufig auf nassen Waldwiesen, bei Möser, Vaethen, Weissewarthe, Dolle, Arneburg. R. bis Mai an Wicke.

94. **L. bellargus Rott.** Mai und Juli bis September; stellenweise häufig, Leipziger Chaussee, Rote Horn. R. bis April und Juni, Juli an der Kronwicke und an Ginster.
- a) *ab. cinnides Stgr.* selten unter der Stammform.
- b) *ab. cernuus Esp.* nicht selten unter der Stammform.
95. **L. coridon Poda.** Juli, August; häufig an Dämmen und sonnigen Abhängen, Leipziger Chaussee, Rote Horn, Ramstedt. R. bis Juni an Kronwicke.
- a) *ab. cinnus Hb.* unter der Stammform.
96. **L. damon Schiff.** Juli, August; nicht häufig, im Harz bei Pansfelde und Gernrode. R. bis Juni an Esparsette.
97. **L. minimus Fuessl.** Mai bis Juli; selten bei Planken, Vaethen, Ramstedt, Mahlpfuhl, Helmstedt, im Harz häufiger. R. bis Mai an Steinklee und Kronwicke.
98. **L. semiargus Rott.** Juni, Juli; häufig auf Waldwiesen. R. bis August, September an Steinklee.
99. **L. cyllarus Rott.** Mai, Juni; selten auf lichten Waldplätzen, bei Planken, Vaethen, Ramstedt und im Harz. R. bis April an Steinklee, Ginster usw.
100. **L.alcon F.** Juni, Juli; selten auf nassen Waldwiesen, bei Mahlpfuhl, Arneburg.
101. **L. euphemus Hb.** Juli; selten, auf feuchten Wiesen. R. bis Juni an Wiesenknopf.
102. **L. arion L.** Juli, August; nicht selten auf lichten Waldplätzen, Möser, Ramstedt, Planken, Dolle, Alvensleben und beim Herrenkrug. R. bis Juni an Quendel.
103. **L. arcas Rott.** Juli; selten, auf feuchten Wiesen, bei Mahlpfuhl, Planken. R. bis Juni an Wiesenknopf.

30. *Cyaniris Dalm.*

104. **C. argiolus L.** April, Mai und Juli, August; ziemlich häufig in den Anlagen und auf lichten Waldplätzen. R. Mai bis September an Faulbaum.
- a) *gen. aest. parvipuncta Fuchs.* unter der Stammform im Juli.

VI. *Hesperiidae.*

31. *Heteropterus Duméril. (Steropes B.)*

105. **H. morpheus Pall.** Juli; stellenweise nicht selten auf Sumpfwiesen, Weissewarthe, Mahlpfuhl, Burg. R. bis Juni an Gräsern.

32. *Pamphila* (F.) Wats. (*Carterocephalus* Ld.)

106. **P. palaemon** Pall. Mai, Juni; häufig auf Waldwiesen und in lichten Waldungen. R. bis Mai an Gräsern.

33. *Adopaea* (Billb.) Wats. (*Hesperia* Stgr. pr. p.)

107. **A. lineola** O. Juni, Juli; nicht selten auf Grasplätzen. R. bis Juni an Gräsern.
108. **A. thaumas** Hufn. Juni, Juli; häufig an Grasplätzen. R. bis Juni an Gräsern. In Weissewarthe 1 Albino ♀ gefangen.
109. **A. actaeon** Rott. Juli, August: selten, im Harz, auch bei Weferlingen. R. bis Juni an Gräsern.

34. *Augiades* (Hb.) Wats. (*Hesperia* Stgr. pr. p.)

110. **A. comma** L. Juli, August; häufig auf Rainen und Wiesen. R. bis Juni an Gräsern.
111. **A. sylvanus** Esp. Juni bis August; häufig auf Wiesen. R. bis Juni an Gräsern.

35. *Carcharodus* (Hb.) Wats.

112. **C. alceae** Esp. April, Mai und August; nicht selten. R. bis April und Juni, Juli an Malvenarten.

36. *Hesperia* (F.) Wats. (*Syrichthus* B.)

113. **H. sao** Hb. Juni, Juli; selten, im Harz bei Hasserode und zwischen Suderode und Neinstedt. R. bis April in zusammengesponnenen Blättern von Himbeeren.
114. **H. serratulae** Rbr. Mai; ziemlich selten, bei Gernrode im Harz an trockenen Stellen.
115. **H. alveus** Hb. Juli, August; nicht selten auf Wiesen. R. an Kreuzblume.
116. **H. malvae** L. in zwei Generationen April, Mai und Juli, August: häufig auf Wiesen und Grasplätzen. R. bis April und Juli an Brombeeren und Erdbeeren.

a) *ab.* ♂ *taras* Bergstr. selten unter der Stammform.

37. *Thanaos* B.

117. **Th. tages** L. Mai und August; häufig auf Wiesen und Rainen. R. bis April und Juli an niederen Pflanzen.

VII. Sphingidae.

38. Acherontia.

118. **A. atropos L.** im Frühjahr sehr selten, im Spätherbst vereinzelt, in manchen Jahren häufiger z. B. 1908. R. Juli bis September an Kartoffeln, Tomaten, Teufelszwirn.

39. Smerinthus Latr.

119. **S. populi L.** Mai bis Juli; überall häufig. R. Juli bis Oktober an Pappel und Weide. In heißen Sommern 2 Generationen.
120. **S. ocellata L.** Mai, Juni; überall häufig. R. Juli bis September an Weide und Apfel.

40. Dilina Dalm.

121. **D. tiliae L.** Mai bis Juli; überall häufig. R. Juni bis September an Linde, Ulme, Erle, Birke usw.
- | | | |
|---|---|---|
| <p>a) <i>ab. brunnescens</i> Stgr.
 b) <i>ab. maculata</i> Wlgr.
 c) <i>ab. ulmi</i> Stgr.
 d) <i>ab. exstincta</i> Stgr.</p> | } | mehr oder weniger selten unter der Stammform. |
|---|---|---|

41. Daphnis Hb.

122. **D. nerii L.** Juli. Nur als Irrgast. R. Juli bis September. Vor ca. 30 Jahren wurden die Raupen an Oleanderbäumen auf der Grosse'schen Badeanstalt, ferner in Buckau-Magdeburg und in Rogätz zahlreich gefunden. Seitdem nicht wieder beobachtet.

42. Sphinx O.

123. **S. ligustri L.** Mai bis Juli; überall häufig. R. Juli bis September an Flieder, Liguster, Schneeball, Spiräen usw.
- a) *ab. spiraeae* Esp. selten unter der Stammform.

43. Protoparce Burm.

124. **P. convolvuli L.** Juni bis Oktober; in manchen Jahren häufig. R. August, September an Ackerwinde, am Tage versteckt.

44. Hyloicus Hb.

125. **H. pinastri L.** Mai bis Juli; häufig, in Kiefernwäldern an den Stämmen sitzend; geht auch an Köder. R. bis Oktober an Kiefern, seltener an Fichten.

45. *Deilephila* O.

126. **D. galii Rott.** Mai, Juni; selten, in manchen Jahren, zuletzt 1888, häufig.
R. Juli bis September an Labkraut und Weidenröschen.
127. **D. euphorbiae L.** Mai bis Juli, auch zuweilen noch im Herbst gefunden:
überall, wo Wolfsmilch wächst, gemein. R. Juni bis September an
Wolfsmilch.
- a) *ab. paralias Nick.* zuweilen unter der Stammform.

46. *Chaerocampa* Dup.

128. **C. celerio L.** In den 80er Jahren in Burg 1 Exemplar gefangen, 1888 in
Aschersleben 1 Stück am Hause sitzend.
129. **C. elpenor L.** Mai, Juni; häufig, auch am Köder. R. Juli bis September
an Labkraut, Weidenröschen, Fuchsien und Wein

47. *Metopsilus* Dunc.

130. **M. porcellus L.** Mai, Juni; nicht selten, geht gern an Köder. R. Juli bis
September an Labkraut.

48. *Pterogon* B.

131. **P. proserpina Pall.** Mai, Juni; selten, in manchen Jahren häufiger. R. Juli,
August an Weidenröschen; an Nachtkerzen hier nicht beobachtet.

49. *Macroglossa* Sc.

132. **M. stellatarum L.** Juli bis Mai; häufig. R. Juni bis September an Labkraut.

50. *Hemaris* Dalm.

133. **H. fuciformis L.** (*bombyliformis* O.) Mai, Juni; nicht häufig. R. Juli, August
an Geisblatt und Labkraut.
134. **H. scabiosae Z.** (*fuciformis* O.) Mai, Juni; selten, bei Tochheim und Vaethen,
auch im Harz. R. Juni, Juli an Knautie und Skabiose.

VIII. Notodontidae.

51. *Cerura* Schnk. (*Harpyia* O.)

135. **C. bicuspis Bkh.** Mai bis Juli; sehr selten, im Harzgebirge. R. Juli bis
September an Birke und Erle.
136. **C. furcula Cl.** Mai bis August; überall, doch ziemlich selten. R. Juli bis
September an Weide, Buche und Zitterpappel.

137. **C. bifida** Hb. Mai bis Juli; überall nicht selten, Rote Horn, Herrenkrug.
R. August, September an Pappeln und Weiden.

52. *Dicranura* B.

138. **D. erminea** Esp. Mai, Juni; sehr selten, Anfang der 90er Jahre im Juni
1 ♀ gefangen in Glindenberg. R. August, September an Pappel und
Weide.
139. **D. vinula** L. Mai bis Juli; überall häufig. R. Juli bis September an Pappel
und Weide.

53. *Stauropus* Germ.

140. **S. fagi** L. Mai bis Juli; verbreitet, aber selten. R. Juli bis September an
Laubbäumen, hauptsächlich an Buche.

54. *Hoplitis* Hb.

141. **H. milhauseri** F. Mai, Juni; verbreitet, aber selten, in Eichenwaldungen.
Biederitz, Klus, Ramstedt, Wolmirstedt, Weferlingen, Möckern usw.
R. Juli bis September an Eiche.

55. *Drymonia* Hb.

142. **D. querna** F. April, Mai; selten, bei Möckern und im Harz. R. Juni, Juli
an Eiche.
143. **D. trimacula** Esp. Mai, Juni; selten, Biederitzer Busch, Ramstedt. R. Juni
bis August an Eiche.
- a) *ab. dodonaea* Hb. häufiger als die Stammform.
144. **D. chaonia** Hb. April, Mai; nicht häufig. Biederitzer Busch, Klus, Wolmirstedt,
Ramstedt. R. Juni, Juli an Eiche.

56. *Pheosia* Hb.

145. **P. tremula** Cl. in zwei Generationen Mai, Juni und Juli, August; überall
nicht selten. R. August, September und Juni, Juli an Weide und
Pappel, zuweilen an Eiche und Birke.
146. **P. dictaeoides** Esp. 2 Generationen, Mai und Juli, August; nicht selten.
R. August, September und Juni, Juli an Birke und Eiche.

57. *Notodonta* O.

147. **N. ziczac** L. 2 Generationen, April, Mai und Juli, August; häufig. R. September,
Oktober und Juni, Juli an Pappel- und Weidenbüschen.
148. **N. dromedarius** L. 2 Generationen, Mai und Juli, August; ziemlich häufig.
R. September, Oktober und Juni an Erle und Birke.

149. **N. phoebe Siebert** (tritophus F.) 2 Generationen, Mai, Juni und August; selten, Klus, Ramstedt. R. August, September und Juni, Juli an Pappel.
150. **N. tritophus Esp.** (torva Hb.) 2 Generationen, April, Mai und Juli, August; nicht häufig, Ramstedt, Neuholdensleben. R. August, September und Juni an Espe.
151. **N. trepida Esp.** Mai, Juni; nicht selten, Klus, Ramstedt, Neuholdensleben. R. Ende Juni, Juli an Eiche.

58. *Leucodonta* Stgr.

152. **L. bicoloria Schiff.** Mai bis Anfang Juli; ziemlich selten, Klus, Ramstedt, Colbitz. R. Juli, August an Birke.

59. *Ochrostigma* Hb. (*Drynobia* Dup.)

153. **O. velitaris Rott.** Mai, Juni; nicht häufig. R. Juli bis September an Buscheichen.
154. **O. melagona Bkh.** Juni, Juli; selten, einmal bei Quedlinburg gefunden. R. Juli bis September an Buche.

60. *Odontesia*, Hb.

155. **O. carmelita Esp.** April, Mai; selten, Klus, Marienborn. R. Juni, Juli an Birke.

61. *Lophopteryx* Stph.

156. **L. camelina L.** April bis Juli; häufig. R. Juni bis Oktober an Laubbäumen.
a) *ab. giraffina Hb.* nicht häufig unter der Stammform.
157. **L. cuculla Esp.** Juni; sehr selten, in der Klus bei Wahlitz einmal gefunden, im Harz auch sehr selten beobachtet. R. August bis Oktober an Ahorn.

62. *Pterostoma* Germ.

158. **P. palpina L.** 2 Generationen, Mai, Juni und Juli, August; überall nicht selten. R. Juni, Juli und August bis Oktober an Weide und Pappel.

63. *Ptilophora* Stph.

159. **P. plumigera Esp.** Oktober, November; nicht selten, Weferlingen, Aschersleben, am Harzrande. R. Juni, Juli an Ahornarten.

64. *Phalera* Hb.

160. **P. bucephala L.** Mai bis Juli; gemein. R. Juli bis Oktober an Laubbäumen, gesellschaftlich.

65. *Pygaera* O.

161. *P. anastomosis* L. 2 Generationen, Mai, Juni und August; in manchen Jahren häufig. R. vom Herbst bis Mai und im Juli an Weide und Pappel, namentlich Zitterpappel.
162. *P. curtula* L. 2 Generationen, Mai und Juli: häufig. R. im Frühjahr und Sommer an Weide und Pappel.
163. *P. anachoreta* F. 2 Generationen, Mai und Juli; ziemlich häufig. R. wie vorige Art.
164. *P. pigra* Hufn. 2 Generationen, Mai und Juli, August; häufig. R. wie *curtula*.

IX. *Thaumetopoeidae*.

66. *Thaumetopoea* Hb. (*Cnethocampa* Stph.)

165. *Th. processionea* L. August, September; zu Zeiten häufig. R. Mai, Juni an Eiche, leben am Tage in einem gemeinschaftlichen Gespinst, ziehen des Abends zum Frass in das Laubwerk und kehren des Morgens in das Gespinst zurück.
166. *Th. pinivora* Tr. Mai, Juni; ziemlich selten, Möser, Tochheim, Klus. R. Juli, August an Kiefern.
- a) *ab. nigromaculata* Petersen. Selten unter der Stammform.

X. *Lymantriidae*.

67. *Orgyia* O.

167. *O. gonostigma* F. 2 Generationen, Mai, Juni und August, September; selten, Harz. R. vom Herbst bis Mai und im Juli an Laubholz, auch gern an Rose und Salweide.
168. *O. antiqua* L. 2 bis 3 Generationen vom Juni bis Oktober; gemein. R. vom Mai bis September an Laub- und Nadelholz.

68. *Dasychira* Stph.

169. *D. fascelina* L. Juni bis August; nicht häufig, Möser, Colbitz, Flechtingen. R. Herbst bis Juni an Heide, Besenpfriem.
170. *D. abietis* Schiff. Juni, Juli; selten, bei Möckern die Raupen geklopft. R. bis Mai an Fichte und Kiefer.
171. *D. pudibunda* L. Mai bis Juli; häufig. R. Juli bis Oktober an Laubholz.
- a) *ab. concolor* Stgr. selten unter der Stammform.

69. Euproctis Hb.

172. **E. chrysorrhoea L.** Juni, Juli; gemein. R. überwintert klein in Gespinsten auf Obstbäumen und Weissdorn.

70. Porthesia Stph.

173. **P. similis Fuessl.** Juni bis August; gemein. R. bis Mai auf Laubholz.

71. Arctornis Germ.

174. **A. l nigrum Mueller.** Juni, Juli; selten, Biederitzer Busch, Elbenau, Kreuzhorst, Ramstedt, Alvensleben. R. Herbst bis Juni an Laubbäumen, besonders an Espe und Rüter.

72. Stilpnotia Wetw & Humphr.

175. **S. salicis L.** Juni, Juli; gemein. R. bis Anfang Juli an Pappel und Weide.

73. Lymantria Hb.

176. **L. dispar L.** Juli, August; gemein. R. bis Juli an Laubholz.
 177. **L. monacha L.** Juli, August; gemein. R. bis Juli an Kiefer, Eiche usw.
 a) *ab. nigra Frr.* nicht selten unter der Stammform.
 b) *ab. eremita O.* selten unter der Stammform.

XI. Lasiocampidae.**74. Malacosoma Auriv.**

178. **M. neustria L.** Juni, Juli; gemein. R. bis Mitte Juni an Obst- und Laubbäumen.
 179. **M. castrensis L.** Juli, August; häufig. R. bis Ende Juni an Wolfsmilch.

75. Trichiura Stph.

180. **T. crataegi L.** August bis Oktober; nicht häufig. R. sehr variierend, Mai, Juni an Schlehen, Weissdorn.

76. Poecilocampa Stph.

181. **P. populi L.** Oktober, November; nicht selten, Burg, Neuhaldensleben. R. Mai, Juni an Laubholz.

77. Eriogaster Germ.

182. **E. rimicola Hb.** Oktober; selten, Colbitz. R. Juni an Eiche.
 183. **E. catax L.** September, Oktober; selten. R. bis Juli an Weissdorn, Schlehe und anderem Laubholz.

184. **E. lanestris** L. Oktober oder März, April; nicht häufig, im Harzgebiet nicht selten. R. Mai bis Juli an Laubholz.

78. *Lasiocampa* Schrk.

185. **L. quercus** L. Juli, August; häufig. R. Herbst bis Ende Juni an Weide, Pappel und anderem Laubholz.
 a) *ab. callunae* Palmer. selten, im Harzgebirge unter der Stammform. Die Raupen wachsen im Gebirge langsamer und die Puppe überwintert.
186. **L. trifolii** Esp. Juli, August; häufig. R. Herbst bis Juni an Heide, Wolfsmilch und anderen niederen Pflanzen.
 a) *ab. medicaginis* Bkh. selten unter der Stammform.

79. *Macrothylacia* Rbr.

187. **M. rubi** L. Mai, Juni; häufig. R. Herbst bis Mai an niederen Pflanzen.

80. *Cosmotriche* Hb.

188. **C. potatoria** L. Juli, August; häufig. R. Herbst bis Juni an Quecken und anderen harten Grasarten.

81. *Epicnaptera* Rbr.

189. **E. ilicifolia** L. Mai, Juni; sehr selten, bei Wolmirstedt und im Harzgebiet. R. Juli, August an Weide, Ginster und Heidelbeere.
190. **E. tremulifolia** Hb. Mai, Juni; nicht häufig, bei Alvensleben, Barby und im Harz. R. Juni, Juli an Eiche, Birke und anderem Laubholz.

82. *Gastropacha* O.

191. **G. quercifolia** L. Juli, August; häufig. R. Herbst bis Juni an Obstbäumen, Weide, Pappel usw.
 a) *ab. alnifolia* O. selten unter der Stammform.
192. **G. populifolia** Esp. Juni, Juli; vereinzelt selten. R. Herbst bis Juni an Pappel.
 a) *gen. aest. obscura* Heuücker. unter der Stammform.

83. *Odonestis* Germ.

193. **O. pruni** L. Juli; ziemlich selten. R. Herbst bis Juni an Birke, Erle, Schlehe usw.

84. *Dendrolimus* Germ.

194. **D. pini** L. Juli, August; häufig, in manchen Jahren gemein. R. Herbst bis Juni an Nadelholz, besonders an Kiefer.

XII. Endromididae.

85. Endromis O.

195. **E. versicolora L.** Ende März, April; verbreitet, doch nicht häufig. R. Mai bis Juli an Birke und Erle.

XIII. Lemoniidae.

86. Lemonia Hb. (Crateronyx Dup.)

196. **L. dumi L.** September, Oktober; in manchen Jahren nicht selten, Biederitzer Busch, Umflutkanal, Kreuzhorst, Möser. R. Mai bis Juli an Löwenzahn und Habichtskraut.

XIV. Saturniidae.

87. Saturnia Schrk.

197. **S. pavonia L.** April, Mai; nicht selten, Möser, Ramstedt, Neuwaldensleben, Flechtingen. R. Juni, Juli an Heidekraut, frisst auch Weide, Schlehe usw. 1896 wurde aus einer Raupe von Möser ein Zwitter gezogen, linksseitig ♂, rechtsseitig ♀.

88. Aglia O.

198. **A. tau L.** April, Mai; nicht selten, besonders in Buchenwäldungen, Ramstedt, Helmstedt, im Harz. R. Juni, Juli an Buche, Eiche, Hasel und anderen Waldbäumen.

XV. Drepanidae.

89. Drepana Schrk.

199. **D. falcata L.** April bis Juni und Juli, August in 2 Generationen; häufig. R. August bis Oktober und Mai bis Juli an Birke und Erle.
200. **D. curvatula Bkh.** 2 Generationen, wie vorige; nicht häufig, Möckern, Klus, Drömling. R. an Erle.
201. **D. harpagula Esp.** 2 Generationen, wie vorige; selten, Möckern, Klus, Drömling. R. an Linde, Buche und Eiche.
202. **D. lacertinaria L.** 2 Generationen; nicht selten. R. an Birke, Erle.
- a) *ab. scincula Hb.* unter der Stammform.

203. **D. binaria** Hufn. Mai und Juli, August; nicht häufig, Biederitzer Busch, Wolmirstedt, Ramstedt usw. R. an Eiche.
204. **D. cultraria** F. April, Mai und Juli, August; hier selten, im Harz häufig. R. an Buche.
- a) *gen. aest. aestiva* Spr. die zweite Generation.

90. *Cilix* Leach.

205. **C. glaucata** Sc. Mai und Juli, August; überall, nicht selten. R. August, September und Mai, Juni an Schlehe und Weissdorn.

XVI. Noctuidae.

A. *Acronyctinae*.

91. *Panthea* Hb.

206. **P. coenobita** Esp. Juli; vereinzelt im Harz. R. August, September an Fichten.

92. *Diphtera* Hb.

207. **D. alpium** Osbeck (*orion* Esp.). Mai, Juni; nicht selten, Klus, Schönebeck, Ramstedt. R. Juli bis September an Eiche.

93. *Demas* Stph.

208. **D. coryli** L. Mai, Juni; häufig, Klus, Hohenwarthe, Möckern. R. Juli bis Oktober an Laubbäumen.

94. *Acronicta* O.

209. **A. leporina** L. Mai bis August; verbreitet, aber nicht häufig. R. Juli bis Oktober an Waldbüschen und Waldbäumen, 1898 schon im Mai geklopft.
210. **A. aceris** L. Mai bis Juli; gemein. R. Juli bis Oktober an Ahorn und Rosskastanie.
- a) *ab. candelisequa* Esp. selten unter der Stammform.
211. **A. megacephala** F. Mai bis Juli; häufig. R. August, September an Weide und Pappel.
212. **A.alni** L. Mai; überall, aber selten, Biederitzer Busch, Klus, Helmstedt, im Harz. R. Juli bis September an Laubbäumen.
213. **A. strigosa** F. Juni, Juli; sehr selten, Stendal. R. August, September an Schlehe, Weissdorn.

214. **A. tridens Schiff.** Mai bis Juli; nicht selten. R. August bis Oktober an Obst- und Laubbäumen.
215. **A. psi L.** Mai bis Juli; häufig. R. August bis Oktober an Bäumen und Sträuchern.
216. **A. cuspis Hb.** Juni, Juli; sehr selten, bei Weissewarthe, im Harz beim Sternhaus. R. Juli bis September an Erle.
217. **A. menyanthidis View.** Mai bis Juli; selten, Oberharz. R. Juli, August in Torfmooren an Sumpfbeeren.
218. **A. auricoma F.** 2 Generationen April, Mai und Juli, August; nicht häufig. R. Juni, Juli und August bis Oktober an Schlehe, Heide und anderen niederen Pflanzen.
219. **A. euphorbiae F.** 2 Generationen Mai bis August; nicht selten, Hohenwarthe, Möser, Gommern. R. Juni bis September an Wolfsmilch, Wegerich, Heide.
220. **A. abscondita Tr.** Mai bis August; sehr selten, bei Wernigerode im Harz. R. Juni bis Oktober an niederen Pflanzen.
221. **A. rumicis L.** 2 Generationen Mai bis September; überall häufig. R. Juni bis Oktober an niederen Pflanzen.
- a) *ab. salicis Curt.* selten unter der Stammform.

95. *Craniophora* Snell.

222. **C. ligustri F.** 2 Generationen Mai bis August; selten, Klus, Burg, im Harz. R. Juni bis September an Flieder, Liguster und Esche.

96. *Simyra* O.

223. **S. nervosa F.** August; sehr vereinzelt, selten, bei Tochheim, im Herrenkrug. R. an Wolfsmilch und Pfeilampfer.

97. *Arsilonche* Ld.

224. **A. albovenosa Göze.** Mai, Juni und Juli, August; selten, Berliner Chaussee, Gerwisch. R. August bis Oktober und Juni, Juli an Sumpfpflanzen.

B. *Trifinae*.

98. *Agrotis* O.

225. **A. strigula Thnb.** Juni, Juli; nicht selten, Möser, Ramstedt. R. August bis April an Heide.
226. **A. polygona F.** Juli; sehr selten, Ramstedt. R. bis Mai an niederen Pflanzen.

227. **A. signum F.** Juni, Juli; nicht häufig, im Harz häufiger. R. bis April an Gräsern und niederen Pflanzen.
228. **A. janthina Esp.** Juli, August; nicht selten, Biederitzer Busch, Klus, Möser, Wolmirstedt, Ramstedt. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen an sumpfigen Stellen.
229. **A. linogrisea Schiff.** Juli, August; selten, bei Möser. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
230. **A. fimbria L.** Juli, August; überall, nicht selten, Biederitzer Busch, Möser, Klus, Wolmirstedt, Ramstedt. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen, besonders an Primeln.
231. **A. augur F.** Juni bis August; häufig, Biederitzer Busch, Elbufer usw. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen
232. **A. obscura Brahm.** Juli, August; sehr selten, bei Möser, Tangermünde. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
233. **A. pronuba L.** Juni bis August; gemein. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
a) *ab. innuba Tr.* unter der Stammform.
234. **A. orbona Hufn.** Juli, August; nicht selten, aber vereinzelt, Möser, Ramstedt, an den Elbufern. R. bis Frühjahr an Gräsern, Primeln usw.
a) *ab. subsequa Hb.* unter der Stammform.
235. **A. comes Hb.** Juli, August; vereinzelt bei Ramstedt usw., im Harz nicht selten. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
a) *ab. adsequa Tr.* }
b) *ab. prosequa Tr.* } zuweilen unter der Stammform.
236. **A. triangulum Hufn.** Juli, August; überall häufig. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
237. **A. baja F.** Juli, August; selten, Biederitzer Busch, Ramstedt, im Harz häufig. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
238. **A. speciosa Hb.** Juli, August; nicht häufig, im Oberharz bei Oderbrück und Sonneberger Weghaus. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
239. **A. c nigrum L.** 2 Generationen Juni und August, September; überall häufig. R. im Juli und im Herbst bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
240. **A. ditrapezium Bkh.** Juli, August; selten, Klus, an der Elbe. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
241. **A. stigmatica Hb.** Juli, August; nicht selten, Biederitzer Busch, Ramstedt. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.

- 242 **A. xantographa** F. August; überall, häufig. R. bis Frühjahr an Gras und niederen Pflanzen.
a) *ab. cohaesa* H. S. unter der Stammform.
243. **A. umbrosa** Hb. August; selten, bei Ramstedt und Möser einige Exemplare geködert. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
244. **A. rubi** View. Juni und August; überall, nicht selten. R. bis Mai und im Sommer an niederen Pflanzen.
245. **A. dahlia** Hb. Ende Juli, August; nicht häufig, bei Ramstedt. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
246. **A. brunnea** F. Ende Juni bis August; überall häufig. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
247. **A. primulae** Esp. (*festiva* Hb.) Juli, August; überall häufig. R. bis Frühjahr an Primeln usw.
248. **A. depuncta** L. Juli, August; selten, im Harz bei Ballenstedt und Mägdesprung. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
249. **A. glareosa** Esp. September; selten, bei Ramstedt geködert. R. bis Juni an Habichtskraut.
250. **A. plecta** L. 2 Generationen, Mai, Juni und August, September; häufig. R. bis April und im Juni, Juli an niederen Pflanzen.
251. **A. simulans** Hufn. Juli; selten und nur vereinzelt, im Friedrich-Wilhelms-Garten und bei Möser gefunden, auch im Harzgebirge beobachtet. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
252. **A. lucipeta** F. Juli; sehr selten, bei Aschersleben und im Harz bei Ballenstedt je 1 Falter gefunden. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
253. **A. latens** Hb. Juni, Juli; sehr selten, Harz bei Ballenstedt. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
254. **A. forcipula** Hb. Juni, Juli; sehr selten, bei Burg 1 Stück erbeutet. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
255. **A. putris** L. Mai, Juni und Juli, August in 2 Generationen; überall, nicht selten. R. bis April und im Juni an niederen Pflanzen.
256. **A. cinerea** Hb. Mai, Juni; vereinzelt und selten, im Harz bei Gernrode gefangen. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
257. **A. exclamationis** L. Juni bis August; überall gemein. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
258. **A. nigricans** L. Juli, August; nicht häufig, bei Buckau und Neustadt an den Elbufern. Raupe bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
a) *ab. rubricans* Esp. unter der Stammform.

259. **A. lidia** Cr. im August 1880 2 Stück in der Nordfront gefangen.
260. **A. tritici** L. Juli, August; überall häufig. Falter sehr verschieden in Zeichnung und Färbung. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
a) *ab. aquilina* Hb. unter der Stammform.
261. **A. obelisca** Hb. Juli, August; überall, nicht häufig. R. bis Frühjahr an Grasarten und niederen Pflanzen.
a) *ab. ruris* Hb. selten unter der Stammform.
262. **A. corticea** Hb. Juni, Juli; nicht häufig, Biederitzer Busch, an den Elb-
ufern, Ramstedt. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
263. **A. ypsilon** Rott. März bis Oktober; häufig. R. bis Juli an Graswurzeln.
264. **A. segetum** Schiff. Juni bis Oktober; gemein. R. bis Mai an Graswurzeln,
Getreide usw.
265. **A. vestigialis** Rott. August; nicht selten, Klus, Möser, Ramstedt. R. bis
Frühjahr an Gras usw.
266. **A. praecox** L. Juli, August; ziemlich selten, an der Elbe, Möser. R. bis
Juni an niederen Pflanzen.
267. **A. prasina** F. Juni, Juli; überall, nicht selten. R. bis Frühjahr an Primeln
und anderen niederen Pflanzen.
268. **A. occulta** L. Juli, August; selten, Biederitzer Busch, Möser, an den Elb-
ufern. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.

99. *Pachnobia* Gn.

269. **P. rubricosa** F. April; selten, im Harz nicht selten. R. Juni, Juli an
niederen Pflanzen.
270. **P. leucographa** Hb. April, Mai; im Harz überall, doch selten. R. Juni,
Juli an Wegerich.

100. *Charaeas* Stph.

271. **C. graminis** L. Juli, August; überall häufig. R. bis Frühjahr an Gras-
wurzeln.
a) *ab. tricuspis* Esp. unter der Stammform.

101. *Epineuronía* Rbl.

272. **E. popularis** F. August, September; überall häufig. R. bis Juni an Gräsern.
273. **E. cespitis** F. August, September; überall, nicht häufig. R. bis Frühjahr
an Gräsern.

102. *Mamestra* Hb.

274. **M. leucophaea** View. Mai, Juni; verbreitet, nicht selten. R. bis Frühjahr
an niederen Pflanzen.

275. **M. advena F.** Juni, Juli; selten, bei Mahlpfuhl, im Harz nicht selten.
R. im Herbst an Birken, im Frühjahr an niederen Pflanzen.
276. **M. tincta Brahm.** Juni, Juli; nicht häufig, Stadtpark, an den Elbufern, Rogätz.
R. wie vorige Art.
277. **M. nebulosa Hufn.** Juni; überall, nicht selten. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
278. **M. brassicae L.** Mai bis August; gemein. R. bis Juni an Kohl, Salat und anderen niederen Pflanzen.
279. **M. persicariae L.** Juni, Juli; überall, häufig. R. im Herbst auf Sträuchern und an niederen Pflanzen.
a) *ab. unicolor Stgr.* unter der Stammform
280. **M. albicolon Hb.** Juni, Juli; sehr selten, Pilm, Kreuzhorst, im Harz bei Wernigerode. R. im Herbst an niederen Pflanzen.
281. **M. oleracea L.** 2 Generationen Mai, Juni und August, September; gemein.
R. Juli und im Herbst an niederen Pflanzen.
282. **M. genistae Bkh.** Mai, Juni; überall, nicht selten. R. im Herbst an Ginster und Besenpfriem.
283. **M. dissimilis Knoch.** Mai und Juli, August; überall häufig. R. Juni und im Herbst an niederen Pflanzen.
a) *ab. confluens Ev.* selten unter der Stammform.
284. **M. thalassina Rott.** Mai, Juni; überall häufig. R. im Herbst an niederen Pflanzen.
285. **M. contigua Vill.** Juni, Juli; nicht häufig, Möser, Ramstedt, im Harz ziemlich häufig. R. im Herbst an Besenreis, Ginster, Brombeere, Heidelbeere usw.
286. **M. pisi L.** Mai, Juni; häufig, R. im Herbst an niederen Pflanzen.
287. **M. trifolii Rott.** Mai und August; häufig R. im Juli und im Herbst an niederen Pflanzen.
288. **M. glauca Hb.** Mai, Juni; selten, Harz. R. September an Heidelbeeren.
289. **M. dentina Esp.** 2 Generationen Mai, Juni und August; gemein. R. im Juni und im Herbst an niederen Pflanzen.
a) *ab. latenai Pier.* unter der Stammform.
290. **M. reticulata Vill.** Juni, Juli; überall, nicht selten. R. im Herbst an den Kapseln der Lichtnelke und des Seifenkrauts.
291. **M. chrysozona Bkh.** Juni; ziemlich selten. R. im August an den Samen von Salat und Latticharten.
292. **M. serena F.** Mai und Juli, August; vereinzelt, selten, im Harz häufiger.
R. Juni und im Herbst an niederen Pflanzen.

103. *Dianthoecia* B.

293. *D. proxima* Hb. Juli; im Harz bei Wernigerode, selten.
294. *D. filigramma* Esp.
var: xanthocyanea Hb. Juni; sehr selten, Rote Horn an der Südspitze.
 R. im Sommer an den Kapseln des Leinkrauts.
295. *D. nana* Rott. Mai, Juni; ziemlich häufig. R. Juli an den Samenkapseln der Kuckucksnelke.
296. *D. compta* F. Juni, Juli; nicht selten. R. August, September an der Karthäusernelke.
297. *D. capsicola* Hb. Mai, Juni; häufig. R. August, September an den Kapseln der Lichtnelke.
298. *D. cucubali* Fuessl. Mai und Juli, August; überall häufig. R. im Juni und August, September an *Silene*-Arten.
299. *D. carpophaga* Bkh. Mai, Juni; ziemlich selten. R. Juli, August an *Silene*-Arten.
300. *D. irregularis* Hufn. Mai, Juni; sehr selten, bei Stendal gefangen.

104. *Bombycia* Stph.

301. *B. viminalis* F. Juli, August; ziemlich selten. Harz. 20. Juli 1905 1 Stück bei Sachsa gefangen. R. bis Mai, Juni zwischen zusammengesponnenen Blättern der Salweide.

105. *Miana* Stph.

302. *M. ophiogramma* Esp. Juni, Juli; selten, an der Elbe, im Biederitzer Busch.
 R. bis Mai in den Stengeln von Sumpfgräsern und der Schwertlilie.
 a) *ab. maerens* Stgr. unter der Stammform.
303. *M. strigilis* Cl. Juni, Juli; überall häufig. R. bis Frühjahr an Gras.
 a) *ab. latruncula* Hb. } häufig unter der Stammform.
 b) *ab. aethiops* Hw. }
304. *M. bicoloria* Vill. Juni, Juli; nicht selten. R. bis Frühjahr an Gras.
 a) *ab. furuncula* Hb. unter der Stammform.

106. *Bryophila* Tr.

305. *B. algae* F. Juli, August; vereinzelt, selten. R. Mai, Juni an Flechten der Obstbäume usw.
306. *B. muralis* Forst. Juli, August; selten, im Harz bei Wernigerode. R. bis Mai an Flechten der Mauer- und Felswände.
307. *B. perla* F. Juli, August; vereinzelt, selten. R. bis Mai an Wandflechten.

107. Diloba B.

308. **D. caeruleocephala L.** August, September; überall gemein. R. Mai, Juni an Obstbäumen, Schlehen und Weissdorn.

108. Valeria Stph.

309. **V. oleagina F.** März, April; selten, bei Wernigerode im Harz mehrere Stücke gefangen. R. Mai, Juni an Schlehen.

109. Apamea O.-Tr.

310. **A. testacea Hb.** August, September; überall, nicht selten. R. bis Juni an Gras, bei Tage unter der Erde.

110. Celaena Stph.

311. **C. haworthii Curt.** August; selten, im Oberharz. R. bis Mai an Wollgras.
 312. **C. matura Hufn.** Juli, August; überall, ziemlich häufig. R. bis Frühjahr an Gras.

111. Hadenia Schrk.

313. **H. porphyrea Esp.** August, September; nicht häufig. R. bis Juni an niederen Pflanzen.
 314. **H. adusta Esp.** Juni; selten. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
 315. **H. ochroleuca Esp.** Juli, August; sehr selten, im Nordfront-Gelände 1 Stück gefangen.
 316. **H. furva Hb.** Juli, August; überall, aber vereinzelt. R. bis Juni an Gras.
 317. **H. sordida Bkh.** Juni; überall, häufig. R. bis Frühjahr an Gras.
 318. **H. gemmea Tr.** August; nicht häufig, ausser im Harz auch in der Umgebung von Magdeburg gefangen, bei Ramstedt und bei Möser. R. bis Juni an einigen Grasarten.
 319. **H. rubrivena Tr.**
var. herzyniae Stgr. Juli, August; sehr selten, im Harz.
 320. **H. monoglypha Hufn.** Juli, August; überall, sehr häufig. R. bis Mai an Gras, bei Tage im Sande versteckt.
 a) *ab. infusata Buch.-White.* einzeln unter der Stammform.
 321. **H. abjecta Hb.** Juli, August; selten, am Elbufer, auch im Harz. R. bis Mai an Grasarten.
 322. **H. lateritia Hufn.** Juli, August; überall, nicht selten. Bei Ramstedt, Möser und an den Elbufern häufig. R. bis Mai an Gras.
 323. **H. lithoxylea F.** Juni bis August; überall häufig. R. bis Frühjahr an Gras.

324. **H. sublustris** Esp. Juni bis August; nicht selten. R. bis Frühjahr an Grasarten.
325. **H. rurea** F. Juni, Juli; überall, nicht selten. R. bis Mai an Gräsern.
a) *ab. alopecurus* Esp. nicht selten unter der Stammform.
326. **H. hepatica** Hb. Juni, Juli; nicht selten, Biederitzer Busch, Rote Horn, Ramstedt. R. bis Frühjahr an Gras.
327. **H. scolopacina** Esp. Juni, Juli; verbreitet, doch ziemlich selten. R. bis Frühjahr an Gras.
328. **H. basilinea** F. Mai, Juni; ziemlich selten, in der Klus, im Biederitzer Busch, bei Königsborn, Möser. R. bis Frühjahr an Gras.
329. **H. gemina** Hb. Mai bis Juli; verbreitet, doch ziemlich selten, Herrenkrug, an der Elbe, in der Klus. R. bis Mai an Grasarten.
a) *ab. remissa* Tr. unter der Stammform.
330. **H. unanimis** Tr. Mai bis Juli; selten R. bis Frühjahr an Sumpfgräsern.
331. **H. secalis** Bjerk. (*didyma* Esp.) Juni, Juli; überall, häufig. R. bis Frühjahr an Schilfgras, in den Stengeln und an den Wurzeln.
a) *ab. nictitans* Esp. }
b) *ab. leucostigma* Esp. } unter der Stammform.
332. **H. pabulatricula** Brahm. Juli; ziemlich selten, bei Ramstedt, Möser. R. bis Frühjahr an Gras.

112. *Ammoconia* Ld.

333. **A. caecimacula** F. August, September; ziemlich selten, bei Ramstedt, Möser. R. Mai, Juni an niederen Pflanzen.

113. *Polia* Tr.

334. **P. polymita** L. Juli; selten, 1873 in der Südfront 1 Stück gefangen, im Harz bei Quedlinburg und Suderode gefunden. R. bis Frühjahr an Primeln.
335. **P. flavicincta** F. August, September; selten, 8. 9. 1868 bei Tochheim, im Harz bei Ballenstedt und Gernrode. R. bis Juli an Beifuss und Ampfer.
336. **P. chi** L. Juni und August, September; überall, aber vereinzelt, im Harzgebirge ziemlich häufig. R. im April und Juli an niederen Pflanzen.

114. *Brachionycha* Hb.

337. **B. nubeculosa** Esp. März, April; sehr selten, in der Klus, bei Ramstedt, Neuholdensleben. R. Juni, Juli auf Laubbäumen.

338. **B. sphinx** Hufn. Oktober, November; überall, ziemlich häufig. R. Mai, Juni an Laubholz.

115. *Miselia* O.

339. **M. bimaculosa** L. August; selten, Magdeburg im Glacis 1 Stück gefunden, ferner in Aschersleben und im Harz beobachtet. R. Mai, Juni an Ulme.
340. **M. oxyacanthæ** L. September, Oktober; häufig. R. im Mai, Juni an Schlehe und Weissdorn.

116. *Dichonia* Hb.

341. **D. aprilina** L. September; nicht selten. R. im Mai an Eiche.
342. **D. convergens** F. August, September; selten, bei Königsborn und im Harz. R. Mai, Juni an Eiche.

117. *Dryobota* Ld.

343. **D. protea** Bkh. September; überall, nicht selten. R. Mai, Juni an Eiche.

118. *Dipterygia* Stph.

344. **D. scabriuscula** L. Juni und August; überall häufig. R. bis September an niederen Pflanzen.

119. *Hyppa* Dup.

345. **H. rectilinea** Esp. Juni, Juli; nicht häufig, im Harz selten. R. bis Frühjahr an Heidelbeere, Brombeere usw.

120. *Cloantha* Gn.

346. **C. polyodon** Cl. in 2 Generationen Mai bis September; überall, doch ziemlich selten, Biederitzer Busch, Klus, Kreuzhorst, Elbufer, bei Burg, Neuhaldensleben usw. R. Juni bis September an Johanniskraut.
347. **C. hyperici** F. Mai bis August; sehr selten, im Harz 1 Stück gefangen. R. wie vorige Art.

121. *Callopistria* Hb.

348. **C. purpureofasciata** Piller. Juni, Juli; selten. R. August bis Oktober an Adlerfarn.

122. *Trachea* Hb.

349. **T. atriplicis** L. in 2 Generationen Mai bis September; überall, ziemlich häufig. R. bis Oktober an niederen Pflanzen.

123. Euplexia Stph.

350. **E. lucipara L.** Mai, Juni und August, 2 Generationen; ziemlich häufig.
R. bis Oktober an niederen Pflanzen.

124. Phlogophora Tr.

351. **P. scita Hb.** Juli; selten, im Els. R. bis Frühjahr an Adlerfarn.

125. Brotolomia Ld.

352. **B. meticulosa L.** Mai und August bis Oktober; nicht selten. R. Juli und Herbst bis Frühjahr an niederen Pflanzen.

126. Mania Tr.

353. **M. maura L.** Juli, August; vereinzelt, selten. R. bis Frühjahr an Erle, Weide und an niederen Pflanzen.

127. Naenia Stph.

354. **N. typica L.** Juni, Juli; häufig. R. bis Mai an niederen Pflanzen, versteckt sich gern in hohlen Stengeln.

128. Jaspidea B.

355. **J. celsia L.** September, Oktober; selten, nur bei Dornburg gefangen. R. Juni bis August an verschiedenen Gräsern.

129. Helotropha Ld.

356. **H. leucostigma Hb.** August; ziemlich selten, bei Möser, Ramstedt, an den Elbufern. R. bis Frühjahr an und in Sumpfpflanzen.

a) *ab. fibrosa Hb.* unter der Stammform.

130. Hydroecia Gn.

357. **H. nictitans Bkh.** Juli, August; überall häufig. R. bis Frühjahr an Sumpfgräsern.

a) *ab. erythrostigma Hw.*
b) *ab. lucens Err.* } unter der Stammform.

358. **H. micacea Esp.** August, September; ziemlich selten, Rote Horn, Elbufer, Rogätz. R. bis Frühjahr an Sumpfgräsern.

131. Gortyna Hb.

359. **G. ochracea Hb.** August, September; überall häufig. R. Juni, Juli in den Stengeln der Klette.

132. *Nonagria* O.

360. *N. nexa* Hb. August; selten, Fort bei Neustadt-M., Ramstedt. R. bis Juni in den Halmen verschiedener Sumpfgräser.
361. *N. cannae* O. August, September; nicht selten. R. bis Juli im Stengel des Rohrkolbens.
362. *N. sparganii* Esp. August, September; vereinzelt, ziemlich selten. R. Juni, Juli im Stengel des Rohrkolbens.
363. *N. typhae* Thnbg. August, September; nicht selten. R. Juli im Stengel des Rohrkolbens.
- a) *ab. fraterna* Tr. unter der Stammform.
364. *N. geminipuncta* Hatchett. August; ziemlich selten. R. bis Juli im Stengel des Schilfrohrs.
- a) *ab. nigricans* Stgr. unter der Stammform.

133. *Senta* Stph.

365. *S. maritima* Tausch. Juni, Juli; selten, am Biederitzer Busch. R. am 9. Mai im Stengel des Schilfrohrs gefunden und am 3. Juni geschlüpft.

134. *Tapinostola* Ld.

366. *T. musculosa* Hb. August, September; sehr selten, am 25. September 1908 bei Wernigerode 1 Stück gefangen.
367. *T. hellmanni* Ev. August; selten, Rote Horn, Möser, Rogätz. R. bis Juni im Schilfgras.
- a) *ab. saturata* Stgr. unter der Stammform.
368. *T. fulva* Hb. *ab. fluxa* Tr. Juli, August; selten. 1 Stück bei Weferlingen erbeutet. R. bis Juni in Seggearten.

135. *Luceria* Hein.

369. *L. virens* L. Juli, August; überall, nicht selten. R. bis Frühjahr an Gras.
- a) *ab. immaculata* Stgr. unter der Stammform.

136. *Calamia* Hb.

370. *C. lutosa* Hb. September, Oktober; nicht selten. R. bis Juli im Schilfrohr.
371. *C. phragmitidis* Hb. Juli; sehr selten, am 14. Juli 1907 bei Weisseswarthe 1 Stück gefangen. R. bis Juni im Schilfrohr.

137. *Leucania* Hb.

372. *L. impudens* Hb. Juli, August; nicht häufig. R. bis Frühjahr an Sumpfgräsern.

373. **L. impura** Hb. August; vereinzelt, an den Elbufern, bei Müser. R. bis Frühjahr an Gräsern.
374. **L. pallens** L. Juni und August, September; überall, häufig. R. Juli und September bis Frühjahr an Gras.
a) *ab. ectypa* Hb. unter der Stammform.
375. **L. obsoleta** Hb. Juni; überall, aber nicht häufig. R. bis Frühjahr an Schilfrohr.
376. **L. straminea** Tr. Juni, Juli; selten. R. vom Herbst bis Frühjahr an Schilfrohr.
377. **L. comma** L. Juni, Juli; nicht selten. R. vom Herbst bis Frühjahr an Gras.
378. **L. l-album** L. Juni und August, September; häufig. R. im Juli und bis Frühjahr an Gras.
379. **L. conigera** F. Juli; überall, häufig. R. bis Frühjahr an Gras.
380. **L. albipuncta** F. Juli, August; häufig. R. bis Mai an Gras.
381. **L. lythargyria** Esp. Juni, Juli; häufig. R. bis Frühjahr an Gras.
382. **L. turca** L. Juni, Juli; verbreitet und nicht selten. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.

138. *Grammesia* Stph.

383. **G. trigrammica** Hufn. Mai bis Juli; nicht selten, im Harzgebiete häufig. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.

139. *Caradrina* O.

384. **C. quadripunctata** F. Mai bis Anfang September in 2 Generationen, nicht selten. R. vom September bis Frühjahr und im Juni, Juli an niederen Pflanzen.
385. **C. selini** B. Juni, Juli; selten, Müser, Ramstedt, Elbufer. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
386. **C. respersa** Hb. Juli; selten, im Harz auch sehr selten beobachtet. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
387. **C. morpheus** Hufn. Juni, Juli; ziemlich selten, Botanischer Garten, Biederitzer Busch, am Elbgelände. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
388. **C. alsines** Brahm. Juni, Juli; häufig. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
389. **C. taraxaci** Hb. Juni, Juli; selten, im Harz gewöhnlich nicht selten. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
390. **C. ambigua** F. Juni bis September in 2 Generationen; nicht selten. R. September bis Juli an niederen Pflanzen.

140. Hydrilla B.

391. **H. pallustris Hb.** Juni; selten, im Harz bei Ballenstedt gefangen. R. bis Mai an niederen Pflanzen.

141. Petilampa Auriv.

392. **P. arcuosa Hw.** Juli, August; selten, Rote Horn, jetziger Stadtpark. R. bis Mai an Rasenschmiele.

142. Rusina Stph.

393. **R. umbratica Goeze (tenebrosa Hb.).** Juni; nicht selten. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.

143. Amphipyra O.

394. **A. tragopoginis L.** Juli, August; gemein. R. Mai, Juni an niederen Pflanzen.
 395. **A. livida F.** Juli, August; sehr selten im Harzgebiet. R. Mai, Juni an niederen Pflanzen.
 396. **A. perflua F.** Juli, August; sehr selten, im Harz an der Heinrichsburg gefunden. R. Mai, Juni an Rüstern.
 397. **A. pyramidea L.** Juli bis Anfang September; überall häufig. R. Mai, Juni an Laubhölzern.

144. Taeniocampa Gn.

398. **T. gothica L.** März, April; häufig. R. Mai bis Juli an niederen Pflanzen.
 399. **T. miniosa F.** März, April; ziemlich selten. R. Juni, Juli an Eiche.
 400. **T. pulverulenta Esp.** März, April; häufig. R. Juni, Juli an Eiche.
 401. **T. populeti Tr.** März, April; selten, bisher nur im Harzgebiet gefangen. R. Mai, Juni an Pappel.
 402. **T. stabilis View.** März, April; häufig. R. Mai, Juni an Eiche, Buche usw.
 403. **T. incerta Hufn.** März, April; nicht selten. R. Juni, Juli an Laubholz.
 a) *ab. fuscata Hw.* unter der Stammform.
 404. **T. opima Hb.** März, April; ziemlich selten im Harzgebirge. R. Juni, Juli an Laubholz.
 405. **T. gracilis F.** März bis Mai; selten, in Wolmirstedt, Ramstedt, Elbgelände. R. Juni, Juli an Sträuchern und Pflanzen zwischen den Blättern eingesponnen.
 406. **T. munda Esp.** März, April; nicht selten. R. Juni, Juli an Laubholz.
 a) *ab. immaculata Stgr.* selten unter der Stammform.

145. Panolis Hb.

407. **P. griseovariegata Goeze (piniperda Panz.).** April, Mai; häufig. R. Juni, Juli an Kiefer.

146. Mesogona B.

408. **M. oxalina Hb.** August, September; sehr vereinzelt, im Elbgebiet, Fermersleben, Rote Horn, Rotensee gefangen, im Harz bei Quedlinburg einmal gefunden. R. Mai, Juni an Pappel, Erle.
409. **M. acetosellae F.** August, September; selten. R. Mai, Juni an Eiche.

147. Dicycla Gn.

410. **D. oo. L.** Juli, August; selten. R. Mai, Juni an Eiche.
a) *ab. renago Hw.* selten unter der Stammform.

148. Calymnia Hb.

411. **C. pyralina View.** Juli, August; nicht häufig. R. Mai an Eiche, Ulme usw.
412. **C. affinis L.** Juli, August; häufig. R. Mai, Juni an Ulme und Eiche.
413. **C. diffinis L.** Juli, August; vereinzelt. R. Mai an Ulme.
414. **C. trapezina L.** Juli, August; gemein. R. Mai, Juni an Laubholz.
a) *ab. badiofasciata Teich.* selten unter der Stammform.

149. Cosmia O.

415. **C. paleacea Esp.** August; nicht selten. R. Mai, Juni an Birke und Erle.

150. Dyschorista Ld.

416. **D. suspecta Hb.** Juli, August; selten, Ramstedt, Elbgebiete. R. Mai, Juni an niederen Pflanzen.
417. **D. fissipuncta Hw.** Juli; vereinzelt und nicht häufig. R. Mai, Juni an Pappel und Weide.

151. Platenis B.

418. **P. retusa L.** Juli, August; überall, nicht selten. R. Mai, Juni an Weide.
419. **P. subtusa F.** Juli; selten, Müser, Klus, Ramstedt. R. Mai, Juni an Pappel.

152. Cirrhoedia Gn.

420. **C. ambusta F.** August; selten, Planken, Rogätz, Tangermünde, im Harz bei Suderode, aber immer nur vereinzelt. R. Mai an Schlehe und an Obstbäumen.

153. *Orthosia* O.

421. **O. lota** Cl. August, September; häufig. R. Mai, Juni in Weiden und Pappelkätzchen, später an niederen Pflanzen.
422. **O. macilenta** Hb. August, September; selten, Biederitzer Busch, Wolmirstedt, Ramstedt, im Harzgebirge nicht selten. R. Mai, Juni an Eiche und Buche.
423. **O. circellaris** Hufn. September, Oktober; häufig. R. März in Weidenkätzchen, später an niederen Pflanzen.
424. **O. helvola** L. September, Oktober; ziemlich selten. R. Mai, Juni an Eiche und Heide.
425. **O. pistacina** F. August bis Oktober; nicht selten. R. Mai, Juni an Schlehe und an niederen Pflanzen.
- a) *ab. canaria* Esp. }
 b) *ab. serina* Esp. } unter der Stammform.
 c) *ab. rubetra* Esp. }
426. **O. nitida** F. August, September; selten, im Harzgebiet nicht selten. R. Mai, Juni an niederen Pflanzen.
427. **O. laevis** Hb. September, Oktober; ziemlich selten. R. Mai, Juni an niederen Pflanzen.
428. **O. litura** L. September, Oktober; häufig. R. Mai, Juni an niederen Pflanzen.

154. *Xanthia* O.

429. **X. citrargo** L. August, September; verbreitet, nicht häufig. R. Mai an Linde.
430. **X. aurago** F. August, September; selten. R. Mai an Buche.
- a) *ab. fucata* Esp. selten unter der Stammform.
431. **X. lutea** Stroem. (**flavago** F.) August, September; nicht selten. R. April, Mai in Weidenkätzchen, später an niederen Pflanzen.
432. **X. fulvago** L. August, September; häufig. R. März in Weidenkätzchen, später an niederen Pflanzen.
- a) *ab. flavescens* Esp. selten unter der Stammform.
433. **X. gilvago** Esp. August, September; nicht selten. R. April, Mai, jung in Pappelkätzchen, später an niederen Pflanzen.
434. **X. ocellaris** Bkh. August, September; nicht selten. R. April bis Anfang Juni, jung an Pappelkätzchen, später an niederen Pflanzen.
- a) *ab. lineago* Gn. }
 b) *ab. intermedia* Habich. } selten unter der Stammform.

155. Hoporina Blanch.

435. **H. croceago F.** September, Oktober; ziemlich selten. Ramstedt, Harzgebirge.
R. Mai bis Juli an Eichbüschen.

156. Orrhodia Hb.

436. **O. erythrocephala F.** September bis April; ziemlich selten, Rogätz, Wolmirstedt, im Harz ziemlich häufig. R. Mai, Juni an niederen Pflanzen.
a) *ab. glabra Hb.* selten unter der Stammform.
437. **O. vau punctatum Esp.** September bis April; ziemlich selten, Rote Horn, Wolmirstedt, Elbufer, im Harz nicht selten. R. wie vorige Art.
438. **O. vaccinii L.** September bis April; überall gemein. R. Mai, Juni an niederen Pflanzen.
a) *ab. spadicea Hb.* }
b) *ab. mixta Stgr.* } nicht selten unter der Stammform.
439. **O. ligula Esp.** September bis April; selten, Gübs, Wolmirstedt, auch im Harzgebiete. R. Mai, Juni an niederen Pflanzen.
a) *ab. subspadicea Stgr.* }
b) *ab. polita Hb.* } selten unter der Stammform.
440. **O. rubiginea F.** September bis April; selten. R. Mai an Weiden, später bis Anfang Juli an niederen Pflanzen.

157. Scopelosoma Curt.

441. **S. satellitia L.** September bis April; überall, sehr häufig. R. Mai, Juni an Laubholz.
a) *ab. brunnea Lampa.* unter der Stammform.

158. Xylina Tr.

442. **X. semibrunnea Hw.** September bis April; sehr selten, Möser, Klus, an den Elbufern, auch im Harzgebirge. R. Mai, Juni an Esche und anderem Laubholz.
443. **X. socia Rott.** September bis Anfang Mai; nicht selten. Möser, im Elb-
gelände, Wolmirstedt, im Harz. R. Mai, Juni an Laubholz.
444. **X. furcifera Hufn.** September bis April; überall, nicht selten. R. Juni, Juli an Erle und Birke.
445. **X. ornitopus Rott.** September bis Anfang Mai; verbreitet, nicht selten. R. Mai bis Juli an Eiche. Mordraupe.

159. *Calocampa* Stph.

446. **C. vetusta** Hb. September bis April; überall, nicht selten. R. Juni, Juli an Laubbüschchen und niederen Pflanzen.
447. **C. exoleta** L. August bis April; seltener als vorige Art. R. Juni, Juli an niederen Pflanzen.
448. **C. solidaginis** Hb. August, September; selten, bei Möser und Tangermünde gefangen, im Harz namentlich im Oberharz häufiger. R. Juni an Heidelbeere und Heide.
- a) *ab. cinerascens* Stgr. unter der Stammform.

160. *Xylomyges* Gn.

449. **X. conspicillaris** L. April, Mai; selten, Kreuzhorst, Ramstedt, im Elbgebiet. R. bis Juli an niederen Pflanzen.
- a) *ab. melaleuca* View. ebenso selten wie die Stammform.

161. *Lithocampa* Gn.

450. **L. ramosa** Esp. Mai, Juni; selten, im Oberharz beobachtet. R. Juli, August an Geisblatt.

162. *Calophasia* Stph.

451. **C. lunula** Hufn. Mai bis Juli in 2 Generationen; hier selten, Umflutkanal, Weferlingen, im Harz nicht selten. R. Juni und August an Leinkraut.

163. *Cucullia* Schrk.

452. **C. verbasci** L. Mai; vereinzelt, im nördlichen Vorland des Harzes manchmal nicht selten. R. Juni, Juli an Wollkraut.
453. **C. scrophulariae** Capioux. Mai, Juni; selten, im nördlichen Vorland des Harzes nicht selten. R. Juli, August an Braunwurz und Wollkraut.
454. **C. lychnitis** Rbr. Mai; selten, Ramstedt. R. Juni, Juli an Wollkraut.
455. **C. thapsiphaga** Tr. Mai bis Juli; selten, Möser, Ramstedt. R. Juli, August an den Blüten des Wollkrautes.
456. **C. asteris** Schiff. Juni, Juli; vereinzelt. R. August, September an Aster und Goldrute.
457. **C. tanacetii** Schiff. Juni; nicht häufig, im Harz nicht selten. R. Juli, August an Beifuss, Schafgarbe.
458. **C. umbratica** L. Juni, Juli; sehr häufig. R. August, September an Saudistel, Cichorie usw.
459. **C. lucifuga** Hb. Juni, Juli; im Harz bei Gernrode und Wernigerode sehr selten. R. Juli, August an Saudistel, Möhren usw.

460. **C. lactucae** Esp. Juni; selten. R. Juli, August an den Blüten von Latticharten und Saudistel.
461. **C. chamomillae** Schiff. Mai bis Juni; selten. 1904 an der Berliner Chaussee 1 Stück gefangen. R. Juli, August an den Blüten der Kamille.
a) *ab. chrysanthemi* Hb. bei Ballenstedt im Harz häufiger.
462. **C. artemisiae** Hufn. Mai, Juni; nicht häufig. R. August, September an den Blüten des Beifuss.
463. **C. absinthii** L. Mai, Juni; nicht häufig. R. August, September an Wermut und Beifuss.
464. **C. argentea** Hufn. Juni, Juli; selten, bei Quedlinburg und Wernigerode. R. August bis Oktober an Beifuss.

164. **Anarta** Hb.

465. **A. myrtilli** L. Mai bis August in 2 Generationen; häufig. R. Juni bis Oktober an Heide.
466. **A. cordigera** Thnbg. Juni, Juli; sehr selten im Oberharz gefunden, im Moorgebiet.

165. **Heliaca** H. S.

467. **A. tenebrata** Sc. April, Mai; nicht selten, Biederitzer Busch, Ramstedt, Klus, Helmstedt, auch im Harz. R. Juli an Hornkraut.

166. **Heliothis** O.

468. **H. ononis** F. Mai, Juni; selten, nur im Harz beobachtet. R. August an Hauhechel.
469. **H. dipsacea** L. Mai bis September; überall, nicht häufig. R. Juli bis Oktober an niederen Pflanzen.
470. **H. scutosa** Schiff. Juli, August; sehr selten, im Harz bei Wernigerode. R. bis Oktober an Beifuss.

167. **Chariclea** Curt.

471. **C. delphinii** L. Mai, Juni; selten. R. Juli, August an Rittersporn.

168. **Pyrrhia** Hb.

472. **P. umbra** Hufn. Juni, Juli; selten, Biederitzer Busch, Möser. R. August, September an Hauhechel.

169. **Acontia** Ld.

473. **A. lucida** Hufn. Mai und Juli, August; selten. 8. Juli 1868 bei Hummelsberge. R. Juni und September an Malve.

474. **A. luctuosa** Esp. Mai bis August in 2 Generationen; häufig. R. Juni bis September an Malve und Ackerwinde.

170. *Thalpochares* Ld.

475. **T. paula** Hb. Juli, August; selten, Gerwisch, Farsleben, Möckern. R. Juni an Strohblume.

171. *Erastria* O.

476. **E. argentula** Hb. Juni, Juli; selten, bei Schönebeck, Reesen. R. August, September an Sumpfgas.
 477. **E. uncula** Cl. Mai bis Juli; selten, auf feuchten Wiesen, Menz, Vaethen, bei Burg. R. Juli, August an Gras.
 478. **E. venustula** Hb. Juni; selten, bei Möser. R. bis August an Brombeere usw.
 479. **E. deceptor** Sc. Mai bis Juli; häufig. R. Juli bis September an Gras.
 480. **E. fasciana** L. Mai bis Juli; überall, in manchen Jahren häufig. R. Juli, August an Gras.

172. *Rivula* Gn.

481. **R. sericealis** Sc. Mai bis September; vereinzelt, nicht selten, Biederitzer Busch, Weissewarthe, Tangermünde. R. vom Juli bis Mai an Gras.

173. *Prothymnia* Hb.

482. **P. viridaria** Cl. Mai bis August in 2 Generationen; nicht selten. R. Herbst bis Juli an niederen Pflanzen.

174. *Emmelia* Hb.

483. **E. trabealis** Sc. Juni und Juli, August; überall, nicht häufig. R. Herbst bis Juli an Ackerwinde.

C. *Gonopterinae*.

175. *Scoliopteryx* Germ.

484. **S. libatrix** L. August bis Mai; überall häufig in 2 Generationen. R. Mai, Juni und August, September an Pappel und Weide.

D. *Quadrifinae*.

176. *Calpe* Tr.

485. **C. capucina** Esp. August; sehr selten, am 1. September 1885 im Elbgelände beim Herrenkrug gefangen. R. vom Herbst bis Frühjahr an Wiesenraute.

177. Telesilla H. S.

486. **T. amethystina** Hb. Juni, Juli; bei Oschersleben nicht selten geködert.
R. soll an den Blütenständen der Möhre und des Haarstrangs leben.

178. Abrostola O.

487. **A. triplasia** L. Mai bis August; nicht selten. R. Juni bis September an Nessel.
488. **A. asclepiadis** Schiff. Mai bis Juli; selten. R. Juli bis September an Schwalbenwurz.
489. **A. tripartita** Hufn. Mai bis Juli; nicht selten. R. Juni bis September an Nessel.

179. Plusia O.

490. **P. c-aureum** Knoch. Juni, Juli; selten, bei Stecklenberg im Harz gefangen.
R. Mai, Juni an Wiesenraute.
491. **P. moneta** F. Juni bis August; ziemlich häufig in Gärten und auf Friedhöfen. R. Mai bis Juli an Eisenhut.
492. **P. consona** F. Juli bis September in 2 Generationen; nicht häufig, im Harz oft nicht selten. R. Mai, Juni und im August an Nonnea pulla.
493. **P. chrysitis** L. Mai bis August in zwei Generationen; häufig. R. April, Mai und Juli, August an Nesselarten, Salbei und Klette.
a) *ab. juncta* Tutt. unter der Stammform.
494. **P. festucae** L. Juli bis September; ziemlich selten. R. Mai, Juni und August an Seggen und Grasarten.
495. **P. pulchrina** Hw. Juni, Juli; selten im Harz. R. April, Mai an Nesseln, auch an Heidelbeere.
496. **P. jota** L. Juni, Juli; selten, im Eschengehege bei Vaethen, Mahlpfuhl. R. Herbst bis Mai an Nesseln und anderen niederen Pflanzen.
497. **P. gamma** L. Mai bis Oktober in mehreren Generationen; gemein. R. April bis Oktober an niederen Pflanzen.
498. **P. interrogationis** L. Juli, August; selten, bei Neuhaldensleben, im Oberharz bei Oderbrück mehrfach. R. bis Mai an Sumpfheidelbeere.

180. Euclidia O.

499. **E. mi** Cl. Mai, Juni und August; häufig. R. August, September und Juni, Juli an Gras und Klee.
a) *ab. litterata* Cyr. unter der Stammform.
500. **E. glyphica** L. Mai und August; häufig. R. wie vorige Art.

181. *Pseudophia* Gn.

501. **P. lunaris Schiff.** Mai, Juni; ziemlich häufig, Biederitzer Busch, Wolmirstedt, Ramstedt. R. Juli, August an Eiche, vorzugsweise an Eichbüschen.

182. *Aedia* Hb.

502. **A. funesta Esp.** Juni, Juli; verbreitet, aber selten, Herrenkrug-Wiesen, Burg, Alvensleben, auch im Harz. R. Juli, August an Winde.

183. *Catephia* O.

503. **C. alchymista Schiff.** Mai, Juni; selten, Herrenkrug, Biederitzer Busch, Ramstedt, Harz. R. Juli an Eiche.

184. *Catocala* Schrk.

504. **C. fraxini L.** August, September; nicht selten. R. Mai bis Juli an Pappel
a) *ab. moerens Fuchs*, selten unter der Stammform.
505. **C. elocata Esp.** August, September; verbreitet, aber selten, Zitadelle, Biederitzer Busch, Wolmirstedt, Möser, Ramstedt, Kreuzhorst. R. Mai, Juni an Pappel und Weide.
506. **C. nupta L.** August bis Oktober; überall häufig. R. Mai, Juni an Pappel und Weide.
507. **C. sponsa L.** Juli bis September; nicht selten, Wolmirstedt, Ramstedt, Colbitz, Neuahaldensleben. R. Mai, Juni an Eiche.
508. **C. promissa Esp.** Juli, August; seltener wie vorige Art. R. Mai, Juni an Eiche.
509. **C. fulminea Scop.** (paranympha L.) Juli, August; nicht selten, Biederitzer Busch, Kreuzhorst, Pechauer Busch usw. R. Mai, Juni an Schlehe.
a) *ab. xarippe Butl.* selten unter der Stammform.

85. *Toxocampa* Gn.

510. **T. pastinum Tr.** Juli, August; selten, Möser, Rogätz, Stendal. R. Herbst bis Mai an Wicke.
511. **T. viciae Hb.** Juli; sehr selten, im Harz bei Ballenstedt und Wernigerode. R. bis Mai an Wicke.
512. **T. cracae F.** Mai, Juni; selten, im Harz bei Ballenstedt und Wernigerode. R. August, September an Wicke.

E. Hypeninae.**186. Laspeyria Germ.**

513. **L. flexula Schiff.** Juli; nicht häufig, Möser, Klus. R. bis Mai an Baumflechten, hauptsächlich von Nadelholz.

187. Parascotia Hb.

514. **P. fuliginaria L.** Juli, August; selten, Biederitzer Busch, Werder, Möser, Ramstedt. R. bis Juni in faulem Holz und Holzschwamm.

188. Epizeuxis Hb.

515. **E. calvaria F.** Juli, August; selten, bei Barby gefunden. R. bis Mai an trockenem Laub.

189. Zanclognatha Ld.

516. **Z. tarsiplumalis Hb.** Juli; selten. R. bis Mai an trockenen Blättern an der Erde.
517. **Z. tarsipennalis Tr.** Juli, August; häufig. Ramstedt, Neuwaldensleben. R. wie vorige Art.
518. **Z. grisealis Hb.** Juni, Juli; nicht selten, bei Ramstedt, Möser, im Harz nicht häufig. R. Herbst bis Mai an Milzkraut.
519. **Z. emortualis Schiff.** Mai; selten, Ramstedt, Weferlingen. R. September an Eichenbüschen.

190. Madopa Stph.

520. **M. salicalis Schiff.** Mai, Juni; selten, bei Burg gefangen. R. Juli, August an Salweide und Zitterpappel.

191. Herminia Latr.

521. **H. derivalis Hb.** Juli, August; nicht selten, Ramstedt, Neuwaldensleben. R. Herbst bis Frühjahr an dünnen Eichenblättern.
522. **H. tentacularia L.** Juni, Juli; häufig. R. Herbst bis Mai an niederen Pflanzen.

192. Pechipogon Hb.

523. **P. barbalis Cl.** Mai, Juni; sehr häufig, überall. R. im Herbst an Laubholz und nach der Überwinterung bis Mai an niederen Pflanzen.

193. Bomolocha Hb.

524. **B. fontis Thnbg.** Juni, Juli; ziemlich selten. R. August, September an Heidelbeere.

a) *ab. ♂ terrecularis Hb.* unter der Stammform.

194. *Hypena* Schrk.

525. *H. proboscidalis* L. Juni, Juli und September in 2 Generationen; häufig.
R. Mai bis August an niederen Pflanzen.
526. *H. obesalis* Tr. Juli, August; selten, Biederitzer Busch. R. Juni an Nesseln.
527. *H. rostralis* L. August bis Oktober und nach der Überwinterung bis Mai
in 2 Generationen; überall häufig. R. Mai bis September an Brenn-
nessel und Hopfen.

XVII. Cymatophoridae.

195. *Habrosyne* Hb.

528. *H. derasa* L. Mai bis Juli; überall nicht selten. R. im Herbst an Him-
beere und Brombeere.

196. *Thyatira* Hb.

- 529 *T. batis* L. Mai bis August; nicht selten. R. Juli bis September an Him-
beere und Brombeere.

197. *Cymatophora* Tr.

530. *C. or F.* Mai bis August in 2 Generationen; häufig. R. Juni bis Sep-
tember an Pappel.
531. *C. octogesima* Hb. April, Mai; selten R. Juli, August an Pappel.
- 532 *C. fluctuosa* Hb. Juni, Juli; Ramstedt, sehr selten. R. August, September
an Birke.
533. *C. duplaris* L. Mai bis August; ziemlich selten. R. Juli bis September an
Birke und Erle.

198. *Polyploea* Hb.

534. *P. diluta* F. September; selten, im Harz bei Gernrode. R. Mai, Juni
an Eiche.
535. *P. flavicornis* L. März, April; häufig. R. Mai bis August an Birke und
Pappel.
536. *P. ridens* F. April, Mai; nicht selten. R. Mai, Juni an Eiche.

XVIII. Brephidae.

199. *Brephos* O.

537. *B. parthenias* L. März, April; nicht selten. R. Mai, Juni an Birke.
538. *B. nothum* Hb. März, April; selten, bei Tochheim und im Harz. R. Mai,
Juni an Pappel.

XIX. Geometridae.

A. Geometrinae.

200. Pseudoterpna Hb.

539. **P. pruinata** Hufn. Juni bis August; vereinzelt, wo Besenpfriem und Ginster wächst. R. Mai, Juni an Besenpfriem und Ginster.

201. Geometra L.

540. **G. papilionaria** L. Juni bis August; überall, nicht häufig. R. Mai, Juni an Birke, Buche, Erle.
541. **G. vernaria** Hb. Juni bis August; selten, am Südfriedhof, auch im Harz ziemlich selten. R. Herbst bis Mai an Walldrebe.

202. Euchloris Hb.

542. **E. pustulata** Hufn. Juni, Juli; selten, Biederitzer Busch, Klus, Ramstedt, Colbitz usw. R. Mai, Juni an Eiche.
543. **E. smaragdaria** F. Juli, August; sehr selten, in den siebziger Jahren im Selau bei Ramstedt gefangen. R. soll an den Blüten der Schafgarbe leben.

203. Nemoria Hb.

544. **N. viridata** L. Mai bis Juli; selten, bei Möser. R. Herbst bis Mai an Heidekraut und an Weissdorn.
545. **N. porrinata** Z. Juni, Juli; selten, Harz. R. von September bis Juni an Weissdorn, Kreuzdorn, Hasel usw.

204. Thalera Hb.

546. **T. fimbrialis** Sc. Juli, August; verbreitet, doch ziemlich selten, Prester, Pilm, Kreuzhorst, Möser. R. Herbst bis Juni an Schafgarbe, wildem Thymian und anderen niederen Pflanzen.
547. **T. putata** L. Mai, Juni; im Harzgebirge häufig. R. Juli, August an Heidelbeere.
548. **T. lactearia** L. Juni; überall häufig, Biederitzer Busch, Ramstedt usw. R. August an Birke, Erle, Hasel usw.

205. Hemithea Dup.

549. **H. strigata** Müll. Juli, August; häufig. R. Herbst bis Juni an Eiche, Schlehe, Hasel usw.

B. Acidaliinae.**206. Acidalia Tr.**

550. **A. trilineata Sc.** Juni und August; selten, Güssen, Planken. R. Herbst bis Mai und im Juli an Ampfer, Kronwicke und anderen niederen Pflanzen.
551. **A. similata Thnbg.** (perochraria F. R.). Juli, August; überall häufig. R. Herbst bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
552. **A. ochrata Sc.** Juli, August; selten, am Gübser Damm, Biederitzer Busch, Weissewarthe. R. bis Mai an Vogelmiere.
553. **A. rufaria Hb.** Juli, August; sehr vereinzelt. R. bis Mai an Salat, Miere.
554. **A. muricata Hufn.** Juli, August; selten, Möser, Weissewarthe. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
555. **A. dimidiata Hufn.** Juni bis August; vereinzelt, selten, Nordfriedhof, Rote Horn, Biederitzer Busch, Weissewarthe. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
556. **A. virgularia Hb.** Juni bis September in 2 Generationen; überall häufig. R. bis Mai und wieder im Sommer an welken Blättern und Küchenabfällen.
557. **A. pallidata Bkh.** Mai, Juni; nicht häufig, Ramstedt, im Harz ziemlich häufig. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
558. **A. straminata Tr.** Juni, Juli; selten, Möser. R. bis Mai an Gänsefuss und Quendel.
559. **A. herbariata F.** Juni bis August; nicht selten in Heuschobern. R. bis Mai und im Juli an trockenen Pflanzen.
560. **A. bisetata Hufn.** Juli, August; überall, nicht selten. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
561. **A. dilutaria Hb.** Juni, Juli; vereinzelt, Herrenkrug, Möser. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
562. **A. humiliata Hufn.** Mai, Juni und August; überall häufig auf Wiesen. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
563. **A. degeneraria Hb.** Mai und August; selten, bisher nur bei Wernigerode im Harz beobachtet.
564. **A. inornata Hw.** Juni, Juli; selten, Ramstedt, im Harz ziemlich häufig. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
565. **A. deversaria H. S.** Juni, Juli; selten, im Wolfsholz bei Wernigerode gefangen.
566. **A. aversata L.** Mai, Juni und August; überall häufig. R. bis April und Juni an welken Blättern.

a) *ab. spoliata Stgr.* häufiger als die Stammform.

567. **A. emarginata** L. Juli, August; nicht selten. R. bis Juni an niederen Pflanzen.
568. **A. immorata** L. Juni bis August; nicht selten, auf Wiesen. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
569. **A. rubiginata** Hufn. Mai und Juli, August; selten, Müser, Farsleben. R. bis April und Juni an niederen Pflanzen.
570. **A. marginepunctata** Göze. Mai, Juni und August, September; nicht häufig, im Harz ziemlich häufig. R. bis Mai und im Juli an niederen Pflanzen.
571. **A. incanata** L. Juni bis August; selten, Werder-M. 29./8., Weissewarthe 4./7., im Harz bei Suderode 12./6. gefangen.
572. **A. fumata** Stph. Juni, Juli; im Harz ziemlich selten. R. bis Mai an Heidelbeere.
573. **A. remutaria** Hb. Mai, Juni; nicht selten. R. bis April an niederen Pflanzen.
574. **A. nemoraria** Hb. Mai, Juni; selten, noch am 20./7. Selau bei Ramstedt.
575. **A. caricaria** Reutti. Juli; selten, 23. Juli 1910 1 Stück im Herrenholz gefangen.
576. **A. immutata** L. Juni, Juli; überall, nicht selten. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
577. **A. strigaria** Hb. Juni, Juli; selten, Weissewarthe. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
578. **A. umbelaria** Hb. Juni, Juli; im Harz bei Gernrode, ziemlich selten. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
579. **A. strigilaria** Hb. Juni bis August; selten, Biederitzer Busch, Ramstedt. R. bis Juni an niederen Pflanzen.
580. **A. ornata** Sc. Mai bis September in 2 Generationen; überall nicht selten. R. bis Mai und Juli, August an niederen Pflanzen.
581. **A. violata** Thnbg. v. *decorata* Bkh. Juni bis August; selten.

207. *Ephyra* Dup.

582. **E. pendularia** Cl. Mai bis August in 2 Generationen; ziemlich häufig, Klus, Rote Horn. R. Juni und August bis Oktober an Birke, Eiche, Erle.
583. **E. annulata** Schulze. Mai und Juli, August; häufig im Biederitzer Busch. R. Juni und August, September an Laubbäumen.
584. **E. porata** F. Mai bis August in 2 Generationen; selten, Biederitzer Busch, Kreuzhorst, Ramstedt. R. Juni und August, September an Eiche und Birke.

585. **E. punctaria L.** Mai und Juli, August; häufig, Biederitzer Busch, Ramstedt.
R. Juni und August bis Oktober an Eiche, Birke usw.
586. **E. linearia Hb.** Mai, Juni; nicht selten, Marienborn, Weferlingen, im Harz häufig. R. August, September an Buche.
- a) *gen. aest. strabonaria Z.* Juli, August. R. Juni, Juli.

208. *Rhodostrophia* Hb.

587. **R. vibicaria Cl.** Juni, Juli; im Harz nicht selten. R. bis Mai am Besenpfriem.

209. *Timandra* Dup.

588. **T. amata L.** Mai bis September in 2 Generationen; überall gemein. R. bis April und Juni bis August an niederen Pflanzen.

C. *Larentiinae*.

210. *Lythria* Hb.

589. **L. purpuraria L.** Mai bis September in 2 Generationen; häufig. R. Juni bis Oktober an Ampfer und anderen niederen Pflanzen.
- a) *gen. vern. rotaria F.* häufig unter der Stammform.
- b) *ab. lutearia Stgr.* selten unter der Stammform.

211. *Ortholitha* Hb.

590. **O. plumbaria F.** Juni, Juli; häufig. R. bis April an Ginster, Heidekraut, Klee.
591. **O. limitata Sc.** Juli, August; gemein. R. bis Mai an Gras und niederen Pflanzen.
592. **O. moeniata Sc.** Juli, August; vereinzelt, bei Flechtingen. R. bis Juni an Besenpfriem.
593. **O. bipunctaria Schiff.** Juli, August; nicht selten, im Harz ziemlich häufig. R. bis Juni an niederen Pflanzen.

212. *Mesotype* H. S.

594. **M. virgata Rott.** April bis September in 2 Generationen; häufig. R. Juni und September an Labkraut.

213. *Minoa* Tr.

595. **M. murinata Sc.** Mai, Juni und August, September; häufig. R. Juni bis Oktober an Wolfsmilch.
- a) *ab. cinerearia Stgr.* unter der Stammform.

214. Odezia B.

596. **O. atrata L.** Juni, Juli; selten, Planken. R. Mai, Juni an Kälberkropf.
 597. **O. tibiale Esp.** Juni, Juli; selten, im Harz bei Stolberg.

215. Lithostege Hb.

598. **L. farinata Hufn.** Mai bis Juli; nicht häufig, Ramstedt, Pilm, Planken und nördliches Vorland des Harzes.
 599. **L. griseata Schiff.** Mai; selten, nördliches Vorland des Harzes.

216. Anaitis Dup.

600. **A. praeformata Hb.** Juni, Juli; im Harz in manchen Jahren nicht selten. R. nach der Überwinterung bis Mai an Johanniskraut.
 601. **A. plagiata L.** Mai, Juni und August, September; überall sehr häufig. R. Herbst bis Mai und Juli an Johanniskraut.
 602. **A. paludata Thnbg. var. imbutata Hb.** Juli; sehr selten, 1 Stück an der Stieglitzecke im Oberharz gefangen. R. Juni an der Blüte der Moosheidelsbeere.

217. Chesias Tr.

603. **C. spartiata Fuessl.** September, Oktober; nicht selten, wo die Futterpflanze der Raupe wächst, bei Weferlingen usw., auch im Harz beim Hexentanzplatz nicht selten. R. Mai bis Juli an Besenpfriem.
 604. **C. rufata F.** April, Mai; sehr selten im Harz. R. Juni bis August an Ginsterarten.

218. Lobophora Curt.

605. **L. carpinata Bkh.** April, Mai; nicht selten, Möser, Ramstedt, Klus. R. Juli, August an Pappel, Weide, Birke.
 606. **L. halterata Hufn.** April, Mai; nicht häufig, Herrenkrug, Möser, Ramstedt. R. August, September an Weide und Zitterpappel.
 607. **L. sexalisata Hb.** Mai, Juni; überall häufig. R. August, September an Weide.
 608. **L. viretata Hb.** April, Mai; vereinzelt, selten, Elbenau, Weferlingen. R. Juni, Juli an Liguster, Kreuzdorn, Faulbaum und Hartriegel.

219. Cheimatobia Stph.

609. **C. boreata Hb.** Oktober, November; nicht selten. R. Mai, Juni an Laubbäumen.
 610. **C. brumata L.** Oktober bis Dezember; gemein. R. April bis Juni an Laubbäumen; grosser Schädling in den Obstgärten.

220. Triphosa Stph.

611. **T. dubitata L.** Juli bis Oktober, überwintert; selten, Möser, Biederitzer Busch, Pilm, Burg, Weferlingen; im Harz nicht selten. R. Mai, Juni an Weissdorn, Schlehe, Faulbaum.

221. Eucosmia Stph.

612. **E. certata Hb.** Mai; ziemlich selten, im Harz bei Wernigerode. R. Juni, Juli an Berberitze.
613. **E. undulata L.** Mai, Juni; nicht selten. R. Juli bis September an Weiden.

222. Scotosia Stph.

614. **S. vetulata Schiff.** Juni, Juli; häufig, im Harz nicht selten. R. April bis Juni an Faulbaum und Kreuzdorn.
615. **S. rhamnata Schiff.** Juni, Juli; nicht häufig, Herrenkrug, Biederitzer Busch, Pilm. R. Mai an Schlehe und Faulbaum.

223. Lygris Hb.

616. **L. reticulata Thnbg.** Juni, Juli; sehr selten, Harz bei Mägdesprung und Sachsa. R. August, September an Balsamine.
617. **L. prunata L.** Juli, August; nicht häufig, meist in Gärten. R. Mai, Juni an Stachel- und Johannisbeere.
618. **L. testata L.** Juli bis September; selten, Herrenkrug, bei Wolmirstedt. R. Mai, Juni an Weide und Espe.
619. **L. populata L.** Juli bis September; nicht selten, im Harz häufig. R. Mai bis Juli an Heidelbeere.
620. **L. associata Bkh.** Juni, Juli; nicht selten. R. April, Mai an Johannisbeere.

224. Larentia Tr.

621. **L. dotata L.** Juni, Juli; nicht häufig, Kreuzhorst, Forsthaus Süpling. R. Mai an Labkraut, Waldmeister.
622. **L. fulvata Forst.** Juli, August; selten, meist in Gärten; im Harzgebirge in manchen Jahren nicht selten. R. Mai an Rose.
623. **L. ocellata L.** Mai, Juni und August, September; nicht selten. R. Juli bis Oktober an Labkraut.
624. **L. bicolorata Hufn.** Juli, August; nicht häufig, Herrenkrug, Klus, Flechtingen, Forsthaus Süpling. R. Mai, Juni an Erle und Steinobstarten.

625. **L. variata Schiff.** Mai bis September in 2 Generationen; häufig. R. vom Herbst bis April und Juni, Juli an Nadelholz.
 a) *ab. stragulata Hb.* selten unter der Stammform.
 b) *v. obeliscata Hb.* häufiger als die Stammform.
626. **L. juniperata L.** Juli und September, Oktober; sehr selten, seitdem die Futterpflanze im hiesigen Gebiet fast ausgerottet ist, früher häufiger. R. Juni bis September an Wachholder.
627. **L. siterata Hufn.** September bis Mai; nicht häufig, Buckau-M., Klus, Kreuzhorst. R. Mai bis August an Laubbäumen.
628. **L. truncata Hufn.** Mai, Juni und August; nicht häufig, Herrenkrug, Biederitzer Busch, Pilm; im Harz ziemlich häufig. R. bis April, Mai und Juli an Brombeere, Heidelbeere, Geisblatt und an niederen Pflanzen.
 a) *ab. perfuscata Hw.* selten unter der Stammform.
629. **L. firmata Hb.** Mai und August, September; selten im Harz. R. April und Juni, Juli an Kiefer.
630. **L. olivata Bkh.** Juli, August; sehr selten, auch einmal im Harz bei Gernrode gefangen. R. vom September bis Mai an Labkraut.
631. **L. viridaria F.** Juni, Juli; häufig. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
632. **L. fluctuata L.** Mai bis August in 2 Generationen; sehr häufig. R. Herbst bis Mai und im Juli an Kreuzblütlern.
633. **L. didymata L.** Juni bis August; häufig. R. bis Juni an niederen Pflanzen.
634. **L. cambrica Curt.** Juni, Juli; selten, im Harz bei Rübeland gefangen.
635. **L. vespertaria Bkh.** August, September; ziemlich selten, im Harzgebirge und am Gebirgsrande.
636. **L. incursata Hb.** im Juni bei Elend im Harz gefangen.
637. **L. montanata Schiff.** Mai bis Juli; häufig. R. Herbst bis April an niederen Pflanzen.
638. **L. suffumata Hb.** Mai, Juni; selten, im Harz bei Elend, Wendefurt. R. Juli, August an Labkraut.
639. **L. quadrifasciaria Cl.** Mai, Juni und August; selten, Weissewarthe, Biederitzer Busch, Klus, Ramstedt. R. Herbst bis April und im Juli an niederen Pflanzen.
640. **L. ferrugata Cl.** Mai bis September in 2 Generationen; häufig. R. Juni, Juli und wieder im September an niederen Pflanzen.
 a) *ab. spadicearia Bkh.* häufig unter der Stammform.
641. **L. unidentaria Hw.** Ebenso wie vorige Art, ist wohl auch dazu gehörig.

642. **L. pomoeriaria** Ev. April, Mai und Juli in 2 Generationen; nicht selten bis häufig, Biederitzer Busch, Eschengehege bei Vaethen. R. Juni, Juli und September an der wilden Balsamine.
643. **L. designata** Rott. Mai bis August in 2 Generationen; nicht selten. R. bis April und Juli, August an Kohlarten.
644. **L. vittata** Bkh. Mai, Juni und August; selten, am Gübser Damm. R. bis Mai und Juli, August an Sumpfpflanzen.
645. **L. dilutata** Bkh. September, Oktober; häufig. R. Mai, Juni an Laubholz.
a) *ab. obscurata* Stgr. selten unter der Stammform.
646. **L. autumnata** Bkh. Ebenso wie vorige Art, ist früher auch mit *dilutata* vereinigt gewesen.
647. **L. caesiata** Lang. Juli, August; nicht häufig, Klus, Planken, im Oberharz häufig. R. Mai, Juni an Heidelbeere.
a) *ab. annosata* Zett. unter der Stammform.
648. **L. verberata** Sc. Juli, August; selten, im Oberharz. R. Mai, Juni an Fichten.
649. **L. cuculata** Hufn. Mai, Juni und August; nicht häufig, Möser, Tangermünde, im Harz ziemlich selten. R. Juni bis September an Labkraut.
650. **L. galiata** Hb. Mai, Juni und August; selten, Klus, im Harz häufiger. R. Juni bis September an Labkraut.
651. **L. rivata** Hb. Juni, Juli; selten, Pilm, Planken, Ramstedt, Weissewarthe. R. Juli bis September an Labkraut.
652. **L. sociata** Bkh. Mai, Juni und Juli, August; häufig. R. Juni bis September an Labkraut.
653. **L. unangulata** Hw. Juni, Juli; ziemlich häufig. R. Juli, August an Vogelmiere.
654. **L. picata** Hb. Juni, Juli; selten, Ramstedt, Marienborn. R. bis April, Mai an niederen Pflanzen.
655. **L. albicillata** L. Mai, Juni; nicht selten. R. Juli bis September an Brombeere und Himbeere.
656. **L. procellata** F. Mai bis Juli; selten, im Harz bei Hasserode. R. August, September an Waldrebe.
657. **L. lugubrata** Stgr. Mai, Juni und August; im Harz ziemlich selten. R. Juni und September, Oktober an Weidenröschen.
658. **L. hastata** L. Mai, Juni; selten, Ramstedt, Neuwaldensleben, Weferlingen. R. Juli bis September an Birke.
a) *ab. subhastata* Nolck. im Harz unter der Stammform.

659. **L. tristata** L. Mai bis August in 2 Generationen; häufig. R. Juli bis September an Labkraut.
660. **L. luctuata** Hb. Mai, Juni; selten, bei Weferlingen und im Harz beobachtet. R. Juli bis September an Labkraut.
661. **L. molluginata** Hb. Mai, Juni und August; selten, bei Heinrichshorst gefangen, auch im Harz bei Mägdesprung. R. Juli und September an Labkraut.
662. **L. alchemillata** L. Juni, Juli; selten, im Pechauer Busch, bei Weissewarthe und Weferlingen. R. August, September an Blüten und Samenkapseln von Hohlzahn, Taubnessel.
663. **L. hydrata** Tr. Mai, Juni; im Harz bei Wernigerode nicht selten. R. Juli in den Samenkapseln des nickenden Leinkrautes.
664. **L. unifasciata** Hw. Juli, August; selten, Biederitzer Busch, Klus. R. August, September an den Samen des Augentrostes.
665. **L. adaequata** Bkh. Mai, Juni und Juli, August; nicht selten, bei Ramstedt, Dolle, auch im Harz bei Sachsa.
666. **L. albulata** Schiff. Mai bis Juli; häufig, Vaethen, Süpling, Güsen. R. Juli, August in den Kapseln des Klappertopfs.
667. **L. testacea** Don. Mai, Juni; selten bei Ramstedt. R. Juli, August an Eiche.
668. **L. obliterated** Hufn. Mai bis August; häufig, Biederitzer Busch, Vaethen, Süpling. R. Juni bis September an Erle.
669. **L. luteata** Schiff. Mai, Juni; nicht selten, Ramstedt, Vaethen. R. an den Kätzchen der Erle.
670. **L. flavofasciata** Thnbg. (decolorata Hb.). Mai bis August; selten. R. Juli bis September in den Samenkapseln der Lichtnelke.
671. **L. bilineata** L. Mai bis August in 2 Generationen; sehr häufig. R. bis Mai und Juli an niederen Pflanzen.
- a) *ab. testaceolata* Stgr. unter der Stammform.
672. **L. sordidata** F. Juni, Juli; nicht selten im Harz. R. Mai, Juni an den Kätzchen der Erle, Weide, auch an Heidelbeere.
673. **L. autumnalis** Ström. (trifasciata Bkh.). Mai bis August; nicht selten. R. Juni bis Oktober an Erle.
674. **L. capitata** H. S. Mai bis August; selten, im Biederitzer Busch gefangen. R. Juni bis September an Balsamine.
675. **L. silacea** Hb. Mai bis August; nicht häufig, Biederitzer Busch, Kreuzhorst, Güsen. R. Juni bis September an Weidenröschen und Balsamine.

676. **L. corylata Thnbg.** Juni; überall häufig in Wäldern. R. August bis Oktober an Schlehe, Birke, Linde.
677. **L. badiata Hb.** März, April; selten, Werder und im Stadtpark. R. Mai, Juni an Rose.
678. **L. berberata Schiff.** Mai, Juni und August; selten, Grünewalde, Weferlingen. R. Juli bis Oktober an Berberitze.
679. **L. nigrofasciaria Goeze.** April, Mai; selten. R. Juni an Rose.
680. **L. rubidata F.** Juni, Juli; sehr selten, im Harz bei Wernigerode. R. August, September an Labkraut.
681. **L. comitata L.** Juni bis August; häufig. R. August bis Oktober an Melde und Gänsefuss.
682. **L. sagittata F.** Juni, Juli; ziemlich selten, im Harz. R. August, September an Wiesenraute.

225. *Asthena* Hb.

683. **A. candidata Schiff.** Mai, Juni; nicht häufig, Ramstedt, Güsen. R. August, September an Buche.

226. *Tephroclystia* Hb. (*Eupithecia* Curt).

684. **T. oblongata Thnbg.** Juni und August, September; nicht selten. R. Juli und September an Doldenpflanzen.
685. **T. linariata F.** Juni, Juli; nicht selten. R. August, September an Leinkraut.
686. **T. pusillata F.** Mai, Juni; nicht häufig, im Harz in Fichtenwäldern überall häufig. R. Juli bis September an Nadelhölzern.
687. **T. indigata Hb.** Mai, Juni; nicht selten, Möser, Ramstedt, Klus. R. Juli, August an Kiefern.
688. **T. abietaria Goeze.** Mai, Juni; ziemlich häufig. R. Juli, August an Fichte.
689. **T. togata Hb.** Juni; selten. R. Juli, August in den unreifen Zapfen der Fichte und Kiefer.
690. **T. venosata F.** Juni, Juli; nicht selten. R. Juli, August in den Samenkapseln des Leinkrauts und der Lichtnelke.
691. **T. pimpinellata Hb.** Juni, Juli; nicht häufig. R. August bis Oktober an Bibernell, Schafgarbe, Kreuzkraut usw.
692. **T. absinthiata Cl.** Juni, Juli; überall, ziemlich häufig. R. September, Oktober an Beifuss, Schafgarbe, Kreuzkraut.

693. **T. albipunctata** Hw. Mai, Juni; nicht häufig, am Köder bei Möser, im Biederitzer Busch. R. August an den Blüten und Samen verschiedener Doldenpflanzen.
694. **T. vulgata** Hw. Mai, Juni; nicht selten. R. August, September an niederen Pflanzen.
695. **T. trisignaria** H. S. Mai, Juni; sehr selten. R. August, September an Doldenpflanzen.
696. **T. castigata** Hb. Mai, Juni; nicht selten, in der Klus. R. Juli, August, September an den Blüten von Schafgarbe, Kreuzkraut, Johanniskraut usw.
697. **T. subnotata** Hb. Juni, Juli; ziemlich selten, im Harz. R. August, September an Blüten und Samen von Gänsefuss.
698. **T. satyrata** Hb. Mai, Juni; ziemlich häufig. R. Juli, August an Labkraut, Skabiosen und anderen niederen Pflanzen.
699. **T. succenturiata** L. Mai bis Juni; nicht selten. R. August, September an Beifuss.
a) *v. subfulvata* Hw. wie die Stammform. R. an Schafgarbe.
700. **T. scabiosata** Bkh. Mai, Juni; selten, im Selau bei Rogätz. R. August an Skabiosen, Biebernell usw.
701. **T. plumbeolata** Hw. Juni, Juli; ziemlich selten im Selau bei Rogätz. R. August an Wachtelweizen.
702. **T. isogrammaria** H. S. Mai, Juni; nicht selten. R. Juli, August in den Knospen der Walldrebe.
703. **T. pygmaea** Hb. Mai, Juni; selten. R. August an Hornkraut.
704. **T. nanata** Hb. Mai, Juni; nicht selten. R. Juli bis September an den Blüten der Heide.
705. **T. innotata** Hufn. Mai, Juni; häufig. R. August bis Oktober an Beifuss.
a) *v. tamarisciata* Frr. unter der Stammform.
b) *v. fraxinata* Creve. Juli, August ist die Sommerform.
706. **T. dodoneata** Gn. Mai, Juni; selten, bei Suderode im Harz.
707. **T. exigua** Hb. Mai, Juni; selten beobachtet, in der Klus. R. August, September an Weissdorn, Schlehe, Johannisbeere usw.
708. **T. lanceata** Hb. April, Mai; in Fichtenwäldern des Harzes nicht selten. R. Juni an den frischen Trieben der Rottanne.
709. **T. sobrinata** Hb. August, September; im Harz ziemlich häufig. R. Mai, Juni an Wachholder.

227. Chloroclystis Hb.

710. **C. coronata** Hb. Mai, Juni; selten, Klus.
711. **C. rectangulata** L. Juni, Juli; nicht selten. R. bis Mai in Apfelblüten.
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| a) <i>ab. subaerata</i> Hb. | } unter der Stammform. |
| b) <i>ab. cydoniata</i> Bkh. | |
| c) <i>ab. nigrosericeata</i> Hw. | |
712. **C. debiliata** Hb. Juni; selten, im Harz bei Wernigerode. R. Mai zwischen Heidelbeerblättern eingesponnen.

228. Phibalapteryx Stph.

713. **P. vitalbata** Hb. Mai, Juni; nicht häufig. R. Juli bis September an Waldrebe.
714. **P. tersata** Hb. Juni, Juli; sehr selten, bei Suderode im Harz einmal gefangen. R. August, September an Waldrebe.

D. Boarmiinae.**229. Arichanna Moore.**

715. **A. melanaria** L. Juli; selten, Möckern, Ramstedt. R. bis Mai an Sumpforst, Sumpfheidelbeere.

230. Abraxas Leach.

716. **A. grossulariata** L. Juli, August; häufig in Gärten. R. bis Juni an Stachel- und Johannisbeere und anderen Sträuchern.
717. **A. sylvata** Sc. Juni, Juli; meist selten, im Herrenkrug, bei Ramstedt. R. August, September an Traubenkirsche.
718. **A. marginata** L. Mai und Juli, August; häufig. R. Juni bis September an Pappel und Weide.
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a) <i>ab. pollutaria</i> Hb. | nicht selten unter der Stammform. |
| b) <i>ab. nigrofasciata</i> Schöyen | selten unter der Stammform. |
719. **A. adustata** Schiff. Mai bis Juli; überall, nicht selten. R. August, September an Spindelbaum.

231. Bapta Stph.

720. **B. pictaria** Curt. März, April; ziemlich selten, im Harz. R. Mai, Juni an Schlehe und Eiche.
721. **B. bimaculata** F. Mai, Juni; selten, Herrenkrug, Biederitzer Busch, Mahlpfuhl. R. Juli an Birke, Süßkirsche und Traubenkirsche.

722. **B. temerata** Hb. Mai, Juni; nicht häufig, Biederitzer Busch, Planken.
R. Juli, August an Eiche.

232. *Deilinia* Hmps. (Cavera Tr.)

723. **D. pusaria** L. Mai bis August; sehr häufig. R. Juli bis September an Erle und Birke.
724. **D. exanthemata** Sc. Mai bis August; häufig. R. Juli bis September an Weide und Pappel.

233. *Numeria* Dup.

725. **N. pulveraria** L. Mai, Juni; selten, bei Ramstedt. R. Juli, August

234. *Ellopi*a Tr.

726. **E. prosapiaria** L. Mai, Juni und Juli bis Oktober; überall häufig in Nadelwäldungen. R. Juni bis September an Nadelholz.
a) *v. prasinaria* Hb. selten unter der Stammform.

235. *Metrocampa* Latr.

727. **M. margaritata** L. Juni, Juli; nicht selten. R. vom September bis Mai an Eiche und Buche.
728. **M. honoraria** Schiff. Mai, Juni; im Harz bei Suderode, meist selten. R. Juli, August an Eiche.

236. *Ennomos* Tr. (*Eugonia* Hb.)

729. **E. autumnaria** Wernb. September, Oktober; überall, nicht selten. R. Mai bis Juli an Laubholz.
730. **E. quercinaria** Hufn. Juli bis September; nicht selten. R. Mai bis Juli an Laubholz
a) *ab. infusata* Stgr. }
b) *ab. equestraria* F. } nicht häufig unter der Stammform.
731. **E. alniaria** L. August, September; selten, im Elbgebirge, Klus, Burg. R. Mai, Juni an Birke, Linde und Weide.
732. **E. fuscantaria** Hw. August bis Oktober; selten, im Jahre 1900 häufig. R. Juni bis August an Esche.
733. **E. erosaria** Hb. Juli bis September; meist nicht selten. R. Juni bis August an Laubholz.
a) *ab. tiliaria* Hb. unter der Stammform.
b) *ab. unicoloria* Esp. unter der Stammform.

237. Selenia Hb.

734. **S. bilunaria Esp.** Mai und Juli, August; nicht häufig. R. Juni und August, September an Laubholz und Sträuchern.
 a) *gen. aest. juliaria Hw.* die Sommerform.
735. **S. lunaria Schiff.** Mai und Juli, August; selten. R. wie vorige Art.
 a) *gen. aest. delunaria Hb.* die Sommerform.
736. **S. tetralunaria Hufn.** April, Mai und Juli, August; nicht selten. R. wie vorige beide Arten.
 a) *gen. aest. aestiva Stgr.* die Sommerform.

238. Hygrochroa Hb. (Pericallia Stph.)

737. **H. syringaria L.** Mai, Juni und Juli, August; nicht selten, Neuwaldensleben, Mahlpfuhl, Süpling R. Juni und August, September an Geisblatt, Flieder und Liguster.

239. Therapis Hb.

738. **T. evonymaria Schiff.** August; selten im Harz bei Suderode. R. Mai, Juni an Spindelbaum.

240. Gonodontis Hb. (Odontoptera Stph.)

739. **G. bidentata Cl.** Mai, Juni; selten, im Harzgebirge nicht selten. R. August bis Oktober an Laubholz.

241. Himera Dup.

740. **H. pennaria L.** September, Oktober; häufig. R. Mai bis Juli an Laubholz.

242. Crocallis Tr.

741. **C. tusciaria Bkh.** Juli; selten, Biederitzer Busch, Grünewalde, Neuwaldensleben R. Mai, Juni an Schlehe.
742. **C. elinguarua L.** Juli, August; nicht selten, Biederitzer Busch, Grünewalde. R. vom Herbst bis Mai an Eiche, Pappel, Weide und Schlehe.

243. Angerona Dup.

743. **A. prunaria L.** Juni, Juli; nicht selten, im Harz häufig. R. vom Herbst bis Mai an Schlehe, Weissdorn, Hasel und andere.
 a) *ab. sordidata Fuessl.* selten unter der Stammform.

244. Ourapteryx Leach.

744. **O. sambucaria L.** Juni, Juli; nicht selten. R. vom Herbst bis Mai an Schlehe, Hollunder, Geisblatt, Epheu und anderen.

245. Eurymene Dup.

745. **E. dolabraria L.** Mai, Juni und August; nicht selten, Biederitzer Busch, Klus, Möckern, Ramstedt, Neuwaldensleben. R. Juni bis September an Eiche, Linde, Buche.

246. Opisthograptis Hb. (Rumia Dup.)

746. **O. luteolata L.** Mai, Juni; verbreitet, nicht häufig, Biederitzer Busch, Ramstedt. R. Juli bis September an Schlehe, Weissdorn und an Obstbäumen.

247. Epione Dup.

747. **E. apiciaria Schiff.** Juli bis September; nicht selten, im Elbgelände, Umflutkanal. R. Mai, Juni an Weide, Pappel, Erle.
748. **E. paralellaria Schiff.** Juli, August; selten, Klus, Vaethen, auch im Harz sehr selten. R. Mai, Juni an Birke und Zitterpappel.
749. **E. advenaria Hb.** Mai, Juni; häufig, Ramstedt, Güsen. R. Juli, August an Heidelbeere, Wachtelweizen und anderen Pflanzen.

248. Hypoplectis Hb.

750. **H. adpersaria Hb.** Juni, Juli; im Harzgebirge selten, bei Suderode, Wendefurt. R. August bis Oktober an Ginster und Besenpfriem.

249. Venilia Dup.

751. **V. macularia L.** Mai, Juni; stellenweise häufig, bei Ramstedt, Weissewarthe, Güsen. R. August, September an Taubnessel.

250. Semiothisa Hb. (Macaria Curt.)

752. **S. notata L.** Mai und Juli, August; überall nicht selten. R. Juni und August, September an Weide, Birke, Eiche.
753. **S. alternaria Hb.** Mai und Juli; überall nicht selten, Herrenkrug, Möser. R. Juni und August an Weide, Eiche, Schlehe.
754. **S. signaria Hb.** Mai bis Juli; verbreitet, selten, Ramstedt, Klus, Planken, Weissewarthe, im Harz nicht selten. R. August, September an Nadelholz.

755. **S. liturata Cl.** Mai bis Juli; meist häufig, Kreuzhorst, Klus, Möser, Ramstedt. R. Juni bis September an Nadelholz.

251. *Hybernia* Latr.

756. **H. rupicaprararia Hb.** Februar bis April; im Harz überall, doch nicht häufig. R. Juni an Schlehe und Weissdorn.
757. **H. bajaria Schiff.** Oktober, November; ziemlich selten, bei Grünewalde, auch im Harz. R. Juni an Schlehe und Weissdorn.
758. **H. leucophaearia Schiff.** Februar bis April; häufig. R. Mai, Juni an Eiche.
 a) *ab. marmorinaria Esp.* häufig unter der Stammform.
 b) *ab. merularia Weymer.* selten unter der Stammform.
759. **H. aurantiaria Esp.** Oktober; häufig. R. Juni an Laubholz.
760. **H. marginaria Bkh.** März bis Mai; häufig. R. Mai, Juni an Laubholz.
761. **H. defoliaria Cl.** Oktober, November; häufig. R. Mai, Juni an Laubholz.
 a) *ab. obscurata Styr.* nicht selten unter der Stammform.

252. *Anisopteryx* Stph.

762. **A. aceraria Schiff.** November; selten, bei Königsborn, im Harz nicht häufig. R. Mai bis Juli an Ahorn.
763. **A. aescularia Schiff.** März, April; häufig. R. Juni, Juli an Eiche.

253. *Phigalia* Dup.

764. **P. pedaria F.** Februar bis April; häufig. R. Mai bis Juli an Laubholz.

254. *Biston* Leach.

765. **B. hispidaria F.** März, April; nicht häufig, Herrenkrug, Biederitzer Busch. R. Juni, Juli an Eiche.
766. **B. pomonaria Hb.** März bis Mai; in manchen Jahren nicht selten, Biederitzer Busch. R. Mai bis Juli an Laubholz.
 a) *hybr. pilzii Standf.* 1902 2 ♀ und 21. März 1903 1 ♀ im Biederitzer Busch gefunden.
767. **B. zonaria Schiff.** April; in manchen Jahren zahlreich und dann wieder fast verschwunden, Herrenkrug, Rote Horn, Vaethen und Elbdämme. R. Mai, Juni an Schafgarbe und anderen niederen Pflanzen.
768. **B. hirtaria Cl.** März bis Mai; nicht selten. R. Juni bis August an Laubholz, besonders an Eiche und Ulme.

769. **B. strataria** Hufn. März bis Mai; nicht selten. R. Juni bis September an Laubholz.

a) *ab. terrarius* Weymer. selten unter der Stammform.

255. *Amphidasis* Tr.

770. **A. betularia** L. Mai bis Juli; häufig. R. Juli bis September an Laubholz.

a) *ab. doubledayaria* Mill. selten unter der Stammform.

256. *Boarmia* Tr.

771. **B. cinctaria** Schiff. April, Mai; ziemlich häufig. R. Juni, Juli an niederen Pflanzen und Sträuchern.

772. **B. gemmaria** Brahm. Juli; selten, bei Weferlingen und im Harz bei Suderode. R. vom Herbst bis Mai an Schlehe und Obstbäumen.

773. **B. secundaria** Esp. Juli, August; selten, in der Kreuzhorst, bei Ramstedt, im Harzgebirge nicht häufig. R. bis Mai an Fichte und Wachholder.

774. **B. ribeata** Cl. (*abietaria* Hb.). Juni, Juli; selten, im Harz bei Ballenstedt einmal gefangen und auch am Knollen bei Lauterberg. R. bis Mai an Tanne, Fichte, auch an Eiche, Weide.

775. **B. repandata** L. Juni, Juli; häufig. R. bis Mai an niederen Pflanzen und Laubhölzern.

a) *ab. destrigaria* Hw. }
b) *ab. conversaria* Hb. } selten unter der Stammform.

776. **B. roboraria** Schiff. Juni, Juli; ziemlich häufig. R. bis Mai an Eiche und Buche.

a) *ab. infusata* Stgr. nicht selten unter der Stammform.

777. **B. consortaria** F. Mai und August; überall häufig. R. bis April und Juli an Laubholz.

a) *ab. humperti* Humpert, selten unter der Stammform.

778. **B. angularia** Thnbg. Juni, Juli; selten, in der Klus, bei Möckern und im Harz. R. August, September an Baumflechten.

779. **B. lichenaria** Hufn. Juli, August; nicht häufig, bei Weissewarthe, Weferlingen und im Harzgebirge. R. bis Mai an Baum- und Zaunflechten.

780. **B. jubata** Thnbg. (*glabraria* Hb.). Juni, Juli; sehr selten im Harz. R. bis Mai an Flechten.

781. **B. crepuscularia** Hb. April, Mai und Juli, August; sehr häufig. R. Juni und September an Bäumen und Sträuchern.

a) *ab. defessaria* Frr. nicht selten unter der Stammform.

782. **B. histortata** Göze. (biundularia Bkh.). Juni; nicht selten. R. Mai an Lärche und Birke.
783. **B. consonaria** Hb. April bis Anfang Juni; selten. R. Juli bis September an Birke und Linde.
784. **B. luridata** Bkh. Mai, Juni; häufig. R. Juli bis September an Eiche, Erle, Hasel.
785. **B. punctularia** Hb. April bis Juli; häufig. R. Juni bis August an Erle und Birke.

257. *Tephronia* Hb.

786. **T. sepiaria** Hufn. Juli, August; selten, bei Wernigerode im Harz zweimal gefangen. R. Juni an Flechten.

258. *Pachyenemia* Stph.

787. **P. hippocastanaria** Hb. Mai und August; sehr selten, bei Möser und im Harz. R. bis April und Juni, Juli an Heide.

259. *Gnophos* Tr.

788. **G. obscuraria** Hb. Juni, Juli; selten, im Harz. R. bis Mai an niederen Pflanzen. v. (*et. ab.*) *argillacearia* Stgr. selten unter der Stammform.
789. **G. dilucidaria** Hb. Juli, August; im Harz verbreitet, aber nicht häufig. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
790. **G. operaria** Hb. Juli; im Oberharz bei Stöberhai ein Exemplar gefangen. R. bis Mai an niederen Pflanzen.

260. *Fidonia* Tr.

791. **F. roraria** F. Mai, Juni; im Harz bei Suderode und Thale nicht selten. R. August, September an Besenpfriem.

261. *Ematurga* Ld.

792. **E. atomaria** L. April, Mai und Juli bis September; überall gemein. R. Mai bis September an Heide, Ampfer und anderen niederen Pflanzen.
- a) *ab.* ♂ *unicoloraria* Stgr. selten unter der Stammform.

262. *Bupalus* Leach.

793. **B. piniarius** L. Mai, Juni; überall in Nadelwäldern, sehr häufig und oft schädlich. In den Jahren 1901 und 1902 trat dieser Schädling in der Letzlinger Heide so häufig auf, dass 100 000 Festmeter Kiefern geschlagen werden mussten. R. Juli bis Oktober an Kiefern.

263. Thamnonoma Ld.

794. **T. wauaria L.** Juni, Juli; nicht selten. R. August, September an Stachel- und Johannisbeere.
795. **T. brunneata Thnbg.** Mai, Juni; häufig bei Planken, Neuwaldensleben. R. Juni, Juli an Heidelbeere usw.

264. Diastictis Hb.

796. **D. artesiaria F.** Juni bis August; selten, im Harz häufiger. R. Mai, Juni an Weide.

265. Phasiane H. S.

797. **P. petraria Hb.** Mai, Juni; selten, bei Ramstedt. R. Juli, August an Adlerfarn.
798. **P. chlathrata L.** Mai und Juli, August; häufig. R. Juni und August, September an Kleearten.

266. Scoria Stph.

799. **S. lineata Sc.** Juni, Juli; häufig, bei Planken, Marienborn, Neuwaldensleben. R. bis Mai an Besenpfriem, Johanniskraut usw.

267. Aspilates Tr.

800. **A. gilvaria F.** Juli, August; im Harzgebirge selten. R. bis Mai, Juni an Besenpfriem, Schafgarbe und anderen niederen Pflanzen.

268. Perconia Hb.

801. **P. strigillaria Hb.** Mai, Juni; selten. R. bis Mai an Besenpfriem, Ginster und Heide.

XX. Nolidae.**269. Nola Leach.**

802. **N. cucullatella L.** Juni, Juli; nicht selten. R. Mai, Juni an Schlehe, Weissdorn und Apfelbäumen.
803. **N. strigula Schiff.** Juni, Juli; selten, in der Klus, bei Weissewarthe, Ramstedt. R. Mai an Eiche.
804. **N. confusalis H. S.** April, Mai; nicht häufig, bei Ramstedt, im Harz Anfang Juni. R. Juni bis August an Eiche.
805. **N. albula Schiff.** Juli; sehr selten, bei Aken a. Elbe 1 Stück gefangen. R. Mai, Juni an Wasserrminze auf feuchten Stellen.

XXI. Cymbidae.

270. Sarrothripus Curt.

806. **S. revayana** Sc. (undulana Hb.). Juli bis September; ziemlich häufig. R.

Mai, Juni an Laubholz, besonders an Eichbüschen.

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) <i>ab. dilutana</i> Hb. | } selten unter der Stammform. |
| b) <i>v. (et. ab.) degenerana</i> Hb. | |
| c) <i>ab. ilicana</i> F. (<i>punctana</i> Hb.) | |
| d) <i>ab. ramosana</i> Hb. | |

271. Earias Hb.

807. **E. vernana** Hb. Juni; selten, Rote Horn. R. August, September an der Silberpappel.

808. **E. clorana** L. April, Mai und Juli, August; häufig. R. Juni und August, September zwischen zusammengerollten Blättern der Weide.

272. Hylophila Hb.

809. **H. prasinana** L. Mai, Juni; überall häufig. R. Juli bis Oktober an Eiche und Buche.

810. **H. bicolorana** Fuessl. Juni, Juli; nicht häufig, in der Klus, bei Neuwaldenleben, Ramstedt. R. Herbst bis Mai an Eiche.

XXII. Syntomidae.

273. Syntomis O.

811. **S. phegea** L. Juni, Juli; häufig, bei Ramstedt, im Harz bei Thale an der Rosstrappe nicht selten. R. Herbst bis Mai gesellschaftlich an niederen Pflanzen.

274. Dysauxes Hb. (Naclia B.)

812. **D. ancilla** L. Juni, Juli; ziemlich selten, bei Ramstedt, in den Vorbergen des Harzes bei Suderode nicht selten. R. Herbst bis Mai an Flechten.

XXIII. Arctiidae.

A. Arctiinae.

275. Spilosoma Sph.

813. **S. mendica** Cl. Mai, Juni; nicht selten. R. Juni bis August an niederen Pflanzen.

814. **S. lubricipeda** L. Mai, Juni; überall häufig. R. Juli bis September an Nesseln, Labkraut und anderen niederen Pflanzen.

815. **S. menthastri** Esp. Mai bis Juli; häufig. R. Juli, August an niederen Pflanzen.
 816. **S. urticae** Esp. Mai, Juni; verbreitet, nicht häufig. R. Juli bis September an niederen Pflanzen.

276. *Phragmatobia* Stph.

817. **P. fuliginosa** L. 2 Generationen Mai, Juni und August; häufig. R. September bis April und Juni, Juli an niederen Pflanzen.

277. *Parasemia* Hb. (Nemeophila Stph.)

818. **P. plantaginis** L. Juni, Juli; ziemlich selten, Neuwaldensleben, Marienborn, im Harz nicht selten. R. vom Herbst bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
 a) *v. et. ab. ♂ hospita Schiff.* selten unter der Stammform.
 b) *ab. matronalis Frr.* sehr selten unter der Stammform.

278. *Rhyparia* Hb.

819. **R. purpurata** L. Juni, Juli; verbreitet, aber selten, bei Ramstedt, Alvensleben, Neuwaldensleben, Hohenwarthe, Möser. R. im Herbst und nach der Überwinterung bis Juni an Heide, Wegerich und anderen niederen Pflanzen.

279. *Diacrisia* Hb.

820. **D. sanio** L. (*russula* L.). Mai, Juni und August, September; überall häufig. R. vom Herbst bis Mai und Juli, August an niederen Pflanzen.

280. *Arctinia* Eichwald.

821. **A. caesarea** Göze (*luctifera* Esp.). Mai, Juni; selten, bei Burg, Ramstedt, Stendal. R. Juli, August an niederen Pflanzen an trockenen Stellen.

281. *Arctia* Schrk.

822. **A. caja** L. Juli, August; überall häufig. R. vom Herbst bis Frühjahr an Sträuchern und niederen Pflanzen.
 823. **A. villica** L. Juni, Juli; vereinzelt, bei Möckern, Burg, Klus, Neuwaldensleben. R. vom Herbst bis Frühjahr an niederen Pflanzen.
 824. **A. aulica** L. Mai, Juni; früher häufig, jetzt seltener. R. Herbst bis Mai an niederen Pflanzen.
 825. **A. hebe** L. Mai, Juni; stellenweise häufig, bei Burg, Möser, Ramstedt, Möckern. R. vom Herbst bis Mai an niederen Pflanzen.

282. Callimorpha Latr.

826. **C. dominula L.** Juni, Juli; stellenweise häufig. R. vom Herbst bis Mai an Brennessel, Taubnessel, Himbeere, Brombeere usw.
 a) *v. (et. ab.) rossica Kol.* sehr selten unter der Stammform.
827. **C. quadripunctaria Poda** (hera L.). Juli; im Harz an sonnigen Stellen, ziemlich selten. R. bis Frühjahr an niederen Pflanzen und Sträuchern.

283. Coscinia Hb. (Emydia B.)

828. **C. striata L.** Juni, Juli; häufig. R. vom Herbst bis Mai an Gräsern und niederen Pflanzen.
 a) *ab. (et. v.) melanoptera Brahm.* selten unter der Stammform.
829. **C. cribrum L.** Juni, Juli; selten, bei Möser, Rogätz. R. bis Mai an Gräsern und Heide
 a) *v. (et. ab.) punetigera Frr.* s. selten unter der Stammform.

284. Hypocrita H. (Euchelia B.)

830. **H. jacobaeae L.** Mai, Juni; verbreitet, nicht häufig, bei Wahlitz, in der Klus, bei Weissewarthe, Neuholdensleben, am Cracauer Damm, im Harz häufig. R. Juni bis August an Jakobskraut.

285. Deiopeia Stph.

831. **D. pulchella L.** Juli, August; sehr selten, Rote Horn, Neustadt-M., Biederitzer Busch. Kommt in heißen Sommern zuweilen als Gast.

B. Lithosiinae.**286. Nudaria Hw.**

832. **N. mundana L.** Juni, Juli; im Harz, nicht selten. R. bis Juni an Wand- und Baumflechten.

287. Miltochrista Hb.

833. **M. miniata Forst.** Juni, Juli; nicht selten. R. bis Mai an Baumflechten.

288. Endrosa Hb.

834. **E. irrorella Cl.** Juni bis August; verbreitet, Möser, Marienborn, Stendal. R. bis Mai, Juni an Wand- und Steinflechten.

289. Cybosia Hb.

835. **C. mesomella L.** Juni, Juli; überall häufig in lichten Wäldern. R. bis Juni an Flechten.

290. Gnophria Stph.

836. **G. rubricollis L.** Mai, Juni; nicht selten in lichten Waldungen, bei Ramstedt, Neuholdensleben. R. im September an Baumflechten.

291. Oeonistis Hb.

837. **O. quadra L.** Juni bis August; nicht selten, in manchen Jahren häufig, Ramstedt, Möser, Klus usw. R. bis Juni an Flechten alter Bäume.

292. Lithosia F.

838. **L. deplana Esp.** Juni bis August; ziemlich selten, in Nadelwaldungen, Ramstedt, Möser, Klus. R. bis Juni an Baumflechten.
839. **L. griseola Hb.** Juni bis August; nicht häufig, bei Ramstedt, Weissewarthe im Laubwald. R. bis Juni an Baumflechten.
840. **L. lurideola Zinck.** Juli, August; verbreitet, aber selten. R. bis Juni an Flechten.
841. **L. complana L.** Juni bis August; überall, häufig. R. bis Juni an Flechten.
842. **L. unita Hb.** August; sehr selten, bei Wernigerode im Harz 1887 öfter gefunden. R. an Lindenflechten.
843. **L. lutarella L.** Juli, August; häufig. R. bis Juni an Flechten.
844. **L. sororcula Hufn.** Mai, Juni; häufig. R. an Baumflechten.

293. Pelosia Hb.

845. **P. muscerda Hufn.** Juli, August; selten, Klus, Weissewarthe, Tangermünde. R. bis Juni an Flechten.

XXIV. Zygaenidae.**294. Zygaena F.**

846. **Z. purpuralis Brünnich.** Juli, August; überall häufig. R. bis Juni an Quendel, Klee und anderen niederen Pflanzen.
- a) *ab. polygalae Esp.* selten unter der Stammform.
847. **Z. scabiosae Scheven.** Juni, Juli; nicht häufig, bei Ramstedt. R. bis Mai an Klee.
848. **Z. achilleae Esp.** Juni, Juli; nicht häufig, bei Ramstedt. R. bis Juni an Kronwicke, Tragant, Esparsette.

849. **Z. meliloti Esp.** Juni, Juli; häufig, bei Ramstedt, Weissewarthe. R. bis Juni an Klee.
- a) *v. (et. ab.) stentzii Frr.* (mit rotem Hinterleibsgürtel). 1 Stück im Harz bei Heinrichsburg gefangen.
850. **Z. trifoli Esp.** Juni, Juli; sehr häufig. R. bis Mai an Klee und anderen niederen Pflanzen.
- a) *ab. minoides Selys* (confluens Stgr.) nicht selten unter der Stammform.
- b) *ab. orobi Hb.* nicht selten unter der Stammform.
851. **Z. loniceræ Scheven.** Juli; häufig. R. bis Juni an Klee und Wicke.
852. **Z. filipendulae L.** Juli, August; häufig. R. bis Juni an Klee und anderen niederen Pflanzen.
- a) *ab. cytisi Hb.* selten unter der Stammform.
853. **Z. epialtes L.** Juli, August; die Stammform sehr selten bei Ramstedt und im Fort bei Neustadt-Magdeburg. R. bis Juni an Kronwicke.
- a) *ab. medusa Pall.* sehr selten.
- b) *v. peucedani Esp.* häufig, auch bei Gr.-Salze.
- c) *ab. athamanthae Esp.* selten. 1910 hier ein Zwitter gezogen: rechts *athamanthae*, links *peucedani*.
854. **Z. carniolica Sc.** Juli, August; im Harz bei Gernrode. R. Mai, Juni an Esparsette, Tragant und Hauhechel.
- a) *ab. hedysari Hb.* unter der Stammform.

295. Ino Leach.

855. **I. pruni Schiff.** Juni, Juli; häufig bei Möser. R. bis Mai an Heidekraut.
856. **I. globulariae Hb.** Juli; selten.
857. **I. statices L.** Juni, Juli; überall häufig. R. bis Juni an Sauerampfer.

XXV. Cochlididae. (*Limacodidae*.)

296. Cochlidion Hb.

858. **C. limacodes Hufn.** Mai bis Juli, häufig in Laubwäldern. R. September, Oktober an Eiche und Buche.

297. Heterogenea Knoch.

859. **H. asella Schiff.** Juni, Juli; selten. R. September, Oktober hauptsächlich an Buchen.

XXVI. Psychidae.

298. Pachytelia Vestw.

860. **P. unicolor** Hufn. Juni, Juli; überall häufig. R. bis Juni an Gräsern.

299. Psyche Schrk.

861. **P. viciella** Schiff. Juli; sehr selten, im Harz. R. bis Juni an niederen Pflanzen.

300. Epichnopteria Hb.

862. **E. pulla** Esp. April bis Juni; nicht selten. R. bis April an Gräsern.

301. Fumea Hw.

863. **F. casta** Pall. Juni, Juli; nicht selten. R. bis Juni an niederen Pflanzen.
864. **F. betulina** Z. Juni, Juli; nicht selten. R. bis Juni an Flechten und niederen Pflanzen.

302. Bacotia Tutt.

865. **P. sepium** Spr. Juni, Juli; nicht selten an Birkenstämmen. R. bis Juni an Flechten.

XXVII. Sesiidae.

303. Trochilium Sc.

866. **T. apiformis** Cl. Juni, Juli; häufig. R. bis Frühjahr in den Wurzeln und dem unteren Teil der Pappelstämme.

304. F. Sciapteron Stgr.

867. **S. tabaniformis** Rott. Juni; selten, bei Möser, Ramstedt. R. bis Mai in Anschwellungen der Zweige von Pappelsträuchern.

305. Sesia F.

868. **S. spheciformis** Gerning. Mai, Juni; selten, Selau, in der Klus, bei Weferlingen, im Harz. R. bis Mai in Erle und Birke.
869. **S. tipuliformis** Cl. Juni; nicht selten. R. bis Mai in den jungen Zweigen der Johannisbeere.
870. **S. vespiformis** L. (asiliformis Rott.). Juni, Juli; verbreitet, aber selten, im Biederitzer Busch, Klus, Ramstedt. R. bis Mai unter der Rinde von Eichenstrunken.
871. **S. myopaeformis** Bkh. Juni, Juli; nicht häufig, besonders in Obstgärten. R. Herbst bis April unter der Rinde von Apfelbäumen.

872. **S. culiciformis L.** Mai, Juni; überall häufig. R. bis April in Birkenstümpfen.
 873. **S. formicaeformis Esp.** Mai, Juni; nicht häufig. R. bis April in Weidenstümpfen.
 874. **S. ichneumoniformis F.** Juni, Juli; selten, am Gübser Damm gefunden. R. bis Mai in den Wurzeln von Hauhechel.
 875. **S. empiformis Esp.** Juni, Juli; überall häufig, wo Wolfsmilch wächst. R. bis Anfang Mai in den Wurzeln der Wolfsmilch.
 876. **S. muscaeformis View.** Juni, Juli; nicht häufig, am Gübser Damm. R. bis Mai in den Wurzeln der Grasnelke.

306. *Bembecia* Hb.

877. **B. hylaeformis Lasp.** Juli, August; ziemlich häufig, Burg, Möser. R. lebt erst in den Wurzeln der Himbeere, später im unteren Ende der Stengel.

XXVIII. Cossidae.

307. *Cossus* F.

878. **C. cossus L.** Juni, Juli; überall häufig. R. im Holze verschiedener Laubbäume, besonders der Weide, ist zwei- auch dreijährig.

308. *Zeuzera* Latr.

879. **Z. pyrina L.** Juni, Juli; nicht selten. R. zweijährig, im Holze verschiedener Laubbäume, besonders der Esche, auch gern in den Zweigen der Apfelbäume

XXIX. Hepialidae.

309. *Hepialus* F.

880. **H. humuli L.** Juni, Juli; nicht häufig, bei Alvensleben, Neuhaldensleben, im Harz ziemlich häufig. R. im Frühjahr an den Wurzeln des wilden Hopfens.
 881. **H. sylvina L.** August, September; häufig, Biederitzer Busch, Werder, das Weib sehr selten. R. bis Juli an den Wurzeln niederer Pflanzen.
 882. **H. fusconebulosa D. G.** (velleda Hb.). Juni, Juli; selten, im Harz bei Oderbrück und Schulenberg. R. soll an den Wurzeln des Adlerfarns leben.
 883. **H. lupulina L.** Mai, Juni; seltener als *sylvina*, bei Gommern, Ramstedt. R. bis Mai an niederen Pflanzen.
 884. **H. hecta L.** Juni, Juli; häufig. R. bis Mai in den Wurzeln des Heidekrautes und anderer niederer Pflanzen.

Alphabetisches Verzeichnis der Familien und Gattungen.

Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die laufenden Nummern.

Abraxas Leach. 230.
Abrostola O. 178.
Acherontia O. 38.
Acidalia Tr. 206.
Acidaliinae. XIX B.
Acontia Ld. 169.
Acronicta O. 94.
Acronyctinae XVI A.
Adopaea (Billb.) Wats. 33.
Aedia Hb. 182.
Aglia O. 88.
Agrotis O. 98.
Ammoconia Ld. 112.
Amphidasis Tr. 255.
Amphipyra O. 143.
Anaitis Dup. 216.
Anarta Hb. 164.
Angerona Dup. 243.
Anisopteryx Spth. 252.
Antocharis B. 5.
Apamea O. Tr. 109.
Apatura F. 9.
Aphantopus Wallgr. 21.
Aporia Hb. 2.
Araschnia Hb. 14.
Arctia Schrk. 281.
Arctiidae XXIII.
Arctiinae XXIII A.
Arctinia Eichwald. 280.

Arctornis Germ. 71.
Argynnis F. 16.
Arichanna Moore. 229.
Arsilonche Ld. 97.
Aspilates Tr. 267.
Asthena Hb. 225.
Augiades (Hb.) Wats. 34.

Bacotia Tutt. 302.
Bapta Spth. 231.
Bembecia Hb. 306.
Biston Leach. 254.
Boarmia Tr. 256.
Boarmiinae XIX D.
Bombycia Spth. 104.
Bomolocha Hb. 193.
Brachionycha Hb. 114.
Brephidae XVIII.
Brephos O. 199.
Brotolomia Ld. 125.
Bryophila Tr. 106.
Bupalus Leach. 262.

Cabera Tr. 232.
Calamia Hb. 136.
Callimorpha Latr. 282.
Callophrys Billb. 26.
Callopietria Hb. 121.
Calocampa Spth. 159.
Calophasia Spth. 162.

Calpe Tr. 176.
 Calymnia Hb. 148.
 Caradrina O. 139.
 Carcharodus (Hb.) Wats. 35.
 Carterocephalus Ld. 32.
 Catephia O. 183.
 Catocala Schrk. 184.
 Celaena Stph. 110.
 Cerura Schrnk. 51.
 Chaerocampa Dup. 46.
 Charaeas Stph. 100.
 Chariclea Curt. 167.
 Chesias Tr. 217.
 Cheimatobia Stph. 219.
 Chloantha Gn. 120.
 Chloroclystis Hb. 227.
 Chrysophanus Hb. 28.
 Cilix Leach. 90.
 Cirrhoedia Gn. 152.
 Cnethocampa Stph. 66.
Cochlididae. XXV.
 Cochlidion Hb. 296.
 Coenonympha Hb. 23.
 Colias (F.) Leach. 7.
 Coscinia Hb. 283.
 Cosmia O. 149.
 Cosmotriche Hb. 80.
Cossidae XXVIII.
 Cossus F. 307.
 Craniophora Snell. 95.
 Crateronyx Dup. 86.
 Crocallis Tr. 242.
 Cucullia Schrk. 163.
 Cyaniris Dalm. 30.
 Cybosia Hb. 289.
 Cymatophora Tr. 197.

Cymatophoridae XVII.
Cymbidae XXI.

Daphnis Hb. 41.
 Dasychira Stph. 68.
 Deilephila O. 45.
 Deilinia Hmps. 232.
 Deiopeia Stph. 285.
 Demas Stph. 93.
 Dendrolimus Germ. 84.
 Diacrisia Hb. 279.
 Dianthoecia B. 103.
 Diastiotis Hb. 264.
 Dichonia Hb. 116.
 Dicranura B. 52.
 Dicycla Gn. 147.
 Dilina Dalm. 40.
 Diloba B. 107.
 Diphtera Hb. 92.
 Dipterygia Stph. 118.
 Drepana Schrk. 89.
Drepanidae XV.
 Drymonia Hb. 55.
 Drynobia Dup. 59.
 Dryobota Ld. 117.
 Dysauxes Hb. 274.
 Dyschorista Ld. 150.
 Earias Hb. 271.
 Ellopiia Tr. 234.
 Ematurga Ld. 261.
 Emmelia Hb. 174.
 Emydia B. 283.
Endromididae XII.
 Endromis O. 85.
 Endrosa Hb. 288.
 Ennomos Tr. 236.
 Ephyra Dup. 207.

Epichnopteryx Hb. 300.

Epicnaptera Rbr. 81.

Epinephele Hb. 22.

Epineuronia Rbl. 101.

Epione Dup. 247.

Epizeuxis Hb. 188.

Erastria O. 171.

Erebia Dalm. 18.

Eriogaster Germ. 77.

Erycinidae IV.

Euchelia B. 284.

Euchloë Hb. 5.

Euchloris Hb. 202.

Euclidia O. 180

Eucosmia Stph. 221.

Eugonia Hb. 236.

Eupithecia Curt. 226.

Euplexia Stph. 123.

Euproctis Hb. 69.

Eurymene Dup. 245.

Fidonia Tr. 260.

Fumea Hw. 301.

Gastropacha O. 82.

Geometra L. 201.

Geometridae XIX

Geometrinae XIX A.

Gnophos Tr. 259.

Gnophria Stph. 290.

Gonodontis Hb. 240.

Gonopterinae XVI C.

Gonopteryx Leach. 8.

Gortyna Hb. 131.

Grammesia Stph. 138.

Habrosyne Hb. 195.

Hadena Schrk. 111.

Harpya O. 51.

Heliacea H. S. 165

Heliiothis O. 166.

Helotropha Ld. 129.

Hemaris Dalm. 50.

Hemithea Dup. 205.

Hepialidae XXIX.

Hepialus F. 309.

Herminia Latr. 191.

Hesperia Stgr. 33. 34.

Hesperia (F.) Wats. 36.

Hesperiidae VI

Heterogenea Knoch. 297.

Heteropterus Duméril. 31.

Himera Dup. 241.

Hipocrita H. 284.

Hoplitis Hb. 54.

Hoporina Blanch. 155.

Hybernia Latr. 251.

Hydrilla B. 140.

Hydroecia Gn. 130.

Hygrochroa Hb. 238.

Hyloicus Hb. 44.

Hilophila Hb. 272.

Hypena Schrk. 194.

Hypeninae XVI E.

Hypoplectis Hb. 248.

Hyppa Dup. 119.

Ino Leach. 295.

Jaspidea B. 128.

Larentia Tr. 224.

Larentiinae XIX C.

Lasiocampa Schrk. 78.

Lasiocampidae XI.

Laspeyria Germ. 186.

Lemonia Hb. 86.

Lemoniidae XIII

Leptidia Billb. 6.

Leucania Hb. 137.

Leucodonta Stgr. 58.

Leucophasia Stph. 6

Limacodidae XXV.

Liminitis F. 10.

Lithocampa Gn. 161.

Lithosia F. 292.

Lithosiinae XXIII B.

Lithostege Hb. 215.

Lobophora Curt. 218.

Lophopteryx Stph. 61.

Luceria Hein. 135.

Lycaena F. 29.

Lycaenidae V.

Lygris Hb. 223.

Lymantria Hb. 73.

Lymantriidae X.

Lythria Hb. 210.

Macaria Curt. 250

Macroglossa Sc. 49.

Macrothylacia Rbr. 79.

Madopa Stph. 190.

Malacosoma Auriv. 74.

Mamestra Hb. 102.

Mania Tr. 126.

Melanargia Meig. 17.

Melitaea F. 15.

Mesogona B. 146.

Mesotype H. S. 212.

Metopsilus Dunc. 47.

Metrocampa Latr. 235.

Miana Stph. 105.

Miltochrista Hb. 287.

Minoa Tr. 213.

Miselia O. 115.

Naclia B. 274.

Naenia Stph. 127.

Nemeobius Stph. 24.

Nemeophila Stph. 277.

Nemoria Hb. 203.

Noctuidae XVI.

Nola Leach. 269.

Nolidae XX.

Nonagria O. 132.

Notodonta O. 57.

Notodontidae VIII

Nudaria Hw. 286.

Numeria Dup. 233.

Nymphalidae III

Nymphalinae III A.

Ochrostigma Hb. 59.

Odezia B. 214.

Odonestis Germ. 83.

Odontoptera Stph. 240.

Odontosia Hb. 60.

Oeonistis Hb. 291.

Opisthograptis Hb. 246.

Orgyia O. 67.

Orrhodia Hb. 156.

Ortholitha Hb. 211.

Orthosia O. 153.

Ourapteryx Leach. 244.

Pachnobia Gn. 99.

Pachyenemia Stph. 258.

Pachytelia Westw. 298.

Pamphila (F.) Wats. 32.

Panolis Hb. 145.

Panthea Hb. 91.

Papilio (L.) Latr. 1.

Papilionidae I.

Pararge Hb. 20.

Parascotia Hb. 187.

Parasemia Hb. 277.

Parnassius Latr. 2.

Pechipogon Hb. 192.

Pelosia Hb. 293.

Perconia Hb. 268.

Pericallia Stph. 238.

Petilampa Auriv. 141.

Phalera Hb. 64.

Phasiane H. S. 265.

Pheosia Hb. 56.

Phibalapteryx Stph. 228.

Phigalia Dup. 253.

Phlogophora Tr. 124.

Phragmatobia Stph. 276.

Pieridae II.

Pieris Schrk. 4.

Plastenis B. 151.

Plusia O. 179.

Poecilocampa Stph. 76.

Polia Tr. 113.

Polygonia Hb. 13.

Polyommatus Latr. 28.

Polyploea Hb. 198.

Porthesia Stph. 70.

Prothymnia Hb. 173.

Protoparce Burm. 43.

Pseudophia Gn. 181.

Pseudoterpna Hb. 200.

Psyche Schrk. 299.

Psychidae XXVI.

Pterogon B. 48.

Pterostoma Germ. 62.

Ptilophora Stph. 63.

Pygaera O. 65.

Pyrameis Hb. 11.

Pyrrhia Hb. 168.

Quadrifinae XVI D.

Rhodostrophia Hb. 208.

Rhyparia Hb. 278.

Rivula Gn. 172.

Rumia Dup. 246.

Rusina Stph. 142.

Sarrothrips Curt. 270.

Saturnia Schrk. 87.

Saturniidae XIV.

Satyrinae III B.

Satyrus (Latr.) Westw. 19.

Sciapteron Stgr. 304.

Scoliopteryx Germ. 175.

Scopelosoma Curt. 157.

Scoria Stph. 266.

Scotosia Stph. 222.

Selenia Hb. 237.

Semiothisa Hb. 250.

Senta Stph. 133.

Sesia F. 305.

Sesiidae XXVII.

Simyra O. 96.

Smerinthus Latr. 39.

Sphingidae VII.

Sphinx O. 42.

Spilosoma Stph. 275.

Stauropus Germ. 53.

Steropes B. 31.

Stilpnotia Westw. u. Humphr. 72.

Syntomidae XXII.

Syntomis O. 273.

Syrictus B. 36.

Taeniocampa Gn. 144.

Tapinostola Ld. 134.

Telesilla H. S. 177.

Tephroclystia Hb. 226.

Tephronia Hb. 257.

Thalera Hb. 204.

Thalpochares Ld. 170.

Thamnonoma Ld. 263.

Thanaos B. 37.

Thaumetopoea Hb. 66.

Thaumetopoeidae IX.

Thecla F. 25.

Therapis Hb. 239.

Thyatira Hb. 196.

Timandra Dup. 209.

Toxocampa Gn. 185.

Trachea Hb. 122.

Trichiura Stph. 75.

Trifinae XVI B.

Triphosa Stph. 220.

Trochilium Sc. 303.

Valeria Stph. 108.

Vanessa F. 12.

Venilia Dup. 249.

Xanthia O. 154.

Xylina Tr. 158.

Xylomyges Gn. 160.

Zanclognatha Ld. 189.

Zephyrus Dalm. 27.

Zeuzera Latr. 308.

Zygaena F. 294.

Zygaenidae XXIV.

Alphabetisches Verzeichnis der Arten, Varietäten und Aberrationen.

Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die laufenden Nummern.

- | | |
|--|--|
| <p> <i>abietaria</i> Hb. 774 (Boarmia).
 <i>abietaria</i> Goeze. 688 (Tephroclystia).
 <i>abietis</i> Schiff. 170.
 <i>abjecta</i> Hb. 321.
 <i>abscondita</i> Tr. 220.
 <i>absinthiata</i> Cl. 692.
 <i>absinthii</i> L. 463.
 <i>aceraria</i> Schiff. 762.
 <i>aceris</i> L. 210.
 <i>acetosellae</i> F. 409.
 <i>achilleae</i> Esp. 848.
 <i>achine</i> Sc. 60.
 <i>actaeon</i> Rott. 109.
 <i>adaequata</i> Bkh. 665.
 <i>adippe</i> L. 45.
 <i>adsequa</i> Tr. ab. 235a.
 <i>adspersaria</i> Hb. 750.
 <i>adusta</i> Esp. 314.
 <i>adustata</i> Schiff. 719.
 <i>advena</i> F. 275.
 <i>advenaria</i> Hb. 749.
 <i>aegeria</i> L. 57.
 <i>aegon</i> Schiff. 86.
 <i>aescularia</i> Schiff. 763.
 <i>aestiva</i> Spr. gen. aest. 204a (Deprana).
 <i>aestiva</i> Stgr. gen. aest. 736a (Selenia).
 <i>aethiops</i> Esp. 50 (Erebia).
 <i>aethiops</i> Hw. ab. 303b (Miana).
 <i>affinis</i> L. 412.
 <i>aglaja</i> L. 43.
 <i>albicillata</i> L. 655.
 <i>albicolon</i> Hb. 280.
 <i>albipuncta</i> F. 380. </p> | <p> <i>albipunctata</i> Hw. 693.
 <i>albovenosa</i> Göze. 224.
 <i>albula</i> Schiff. 805.
 <i>albulata</i> Schiff. 666.
 <i>alceae</i> Esp. 112.
 <i>alchemillata</i> L. 662.
 <i>alchymista</i> Schiff. 503.
 <i>alciphron</i> Rott. 81.
 <i>alcon</i> F. 100.
 <i>alcyone</i> Schiff. 52.
 <i>algae</i> F. 305.
 <i>alni</i> L. 212.
 <i>alniaria</i> L. 731.
 <i>alnifolia</i> O. ab. 191a.
 <i>alopecurus</i> Esp. ab. 325a.
 <i>alpinum</i> Osbeck. 207.
 <i>alsines</i> Brahm. 388.
 <i>alternaria</i> Hb. 753.
 <i>alveus</i> Hb. 115.
 <i>amandus</i> Schn. 93.
 <i>amata</i> L. 588.
 <i>ambigua</i> F. 390.
 <i>ambusta</i> F. 420.
 <i>amethystina</i> Hb. 486.
 <i>amphidamas</i> Esp. 84.
 <i>anachoreta</i> F. 163.
 <i>anastomosis</i> L. 161.
 <i>ancilla</i> L. 812.
 <i>angularia</i> Thnbg. 778.
 <i>annosata</i> Zett. ab. 647a.
 <i>annulata</i> Schulze. 583.
 <i>antiopa</i> L. 25.
 <i>antiqua</i> L. 168. </p> |
|--|--|

aphirape Hb. 36.
 apiciaria Schiff. 747.
 apiformis Cl. 866.
 aprilina L. 341.
aquilina Hb. ab. 260a.
 arcania L. 67.
 arcas Rott. 103.
 arcuosa Hw. 392.
arete Müll. ab. 61a
 argentea Hufn. 464.
 argentula Hb. 476.
 argiades Pall. 85.
argillacearia Stgr. v. (et ab.) 788a
 argiolus L. 104.
 argus L. 86.
 argus Esp. 87.
 argyrognomon Bergst. 87.
 arion L. 102.
arsilache Esp. v. 39.
 artemisiae Hufn. 462.
 artesiaria F. 796.
 asclepiadis Schiff. 488.
 asella Schiff. 859.
 asiliformis Rott. 870.
 associata Bkh. 620.
 asteris Schiff. 456.
 astrarche Bergst. 91.
 atalanta L. 19.
 athalia Rott. 33.
athamanthae Esp. ab. 853c.
 atomaria L. 792.
 atrata L. 596.
 atriplicis L. 349.
 atropos L. 118.
 augur F. 231.
 aulica L. 824.
 aurago F. 430.
aurantiaca Spr. ab. gen. aest. 2a
 aurantiaria Esp. 759.
 aurelia Nick. 34.
 auricoma F. 218.
 aurinia Rott. 29.
 autumnalis Ström. 673.

autumnaria Wernb. 729.
 autumnata Bkh. 646.
 aversata L. 566.
 badiata Hb. 677.
badiofasciata Teich. ab. 414a.
 baja F. 237.
 bajaria Schiff. 757.
 barbalis Cl. 523.
 basilinea F. 328.
 batis L. 529.
 baton Bergst. 89.
 bellargus Rott. 94.
bellidice O. gen. vern. 8a.
bellus Gerh. ab. 76a.
 berberata Schiff. 678.
 betulae L. 77.
 betularia L. 770.
 betulina Z. 864.
 bicolorana Fuessl. 810.
 bicolorata Hufn. 624.
 bicoloria Schiff. 152 (Leucodonta).
 bicoloria Vill. 304 (Miana).
 bicuspis Bkh. 135.
 bidentata Cl. 739.
 bifida Hb. 137.
 bilineata L. 671.
 bilunaria Esp. 734.
 binaculata F. 721.
 binaculosa L. 339.
 binaria Hufn. 203.
 bipunctaria Schiff. 593.
 bisetata Hufn. 560.
 bistortata Göze. 782.
 biundularia Bkh. 782.
 bombylifformis O. 133.
 borcata Hb. 609.
 brassicae L. 278 (Mamestra).
 brassicae L. 5 (Pieris).
 briseis L. 53.
 brumata L. 610.
 brunnea F. 246 (Agrotis).
brunnea Lampa ab. 441a (Scopelosoma).

brunneata Thnbg. 795.
brunnescens Stgr. ab. 121a.
bucephala L. 160.

caecinacula F. 333.
caerulea Fuchs. ab. 92b.
caeruleocephala L. 308.
caesarea Göze. 821.
caesiata Lang. 647.
caja L. 822.
c album L. 26.
cullunae Palmer ab. 185a.
calvaria F. 515.
cambrica Curt. 634.
camelina L. 156.
canaria Esp. ab. 425a.
candelisequa Esp. ab. 210a.
candidata Schiff. 683.
cannae O. 361.
capitata H. S. 674.
capsincola Hb. 297.
capucina Esp. 485.
cardamines L. 9.
cardui L. 20.
caricaria Reutti. 575.
carmelita Esp. 155.
carniolica Sc. 854.
carpinata Bkh. 605.
carpophaga Bkh. 299.
casta Pall. 863.
castigata Hb. 696.
castrensis L. 179.
catax L. 183.
c-aureum Knoch. 490.
celerio L. 128.
celsia L. 355.
ceronus Esp. ab. 94a.
certata Hb. 612.
cespitis F. 273.
chamomillae Schiff. 461.
chaonia Hb. 144.
chi L. 336.
chrysanthemi Hb. ab. 461a.

chrysitis L. 493.
chrysorrhoea L. 172.
chrysozona Bkh. 291.
cinctaria Schiff. 771.
cinerascens Stgr. ab. 448a.
cinerea Hb. 256.
cinerearia Stgr. ab. 595a.
cinnides Stgr. ab. 94a.
cinnus Hb. ab. 95a.
cinxia L. 30.
circellaris Hufn. 423.
citrargo L. 429.
clathrata L. 798.
cleodoxa O. ab. et v. 45a.
clorana L. 808.
clytie Schiff. ab. (et v.) 16a.
c nigrum L. 239.
coenobita Esp. 206.
cohaesa H. S. ab. 242a.
comes Hb. 235.
comitata L. 681.
comma L. 110 (Augiades).
comina L. 377 (Leucania).
complana L. 841.
compta F. 296.
concolor Stgr. ab. 171a.
confluens Gerh. ab. 80a (Chrysophanus).
confluens Ev. ab. 283a (Mamestra).
confluens Stgr. ab. 850a (Zygaena).
confusalis H. S. 804.
conigera F. 379.
consona F. 492.
consonaria Hb. 783.
consortaria F. 777.
conspicillaris L. 449.
contigua Vill. 285.
convergens F. 342.
conversaria Hb. ab. 775b.
convolvuli L. 124.
cordigera Thnbg. 466.
coridon Poda. 95.
coronata Hb. 710.
corticea Hb. 262.

corylata Thnbg. 676.
coryli L. 208.
cossus L. 878.
cracae F. 512.
crataegi L. 4 (Aporia).
crataegi L. 180 (Trichiura).
crepuscularia Hb. 781.
cribum L. 829.
croceago F. 435.
cucubali Fuessl. 298.
cuculata Hufn. 649.
cuculla Esp. 157.
cucullatella L. 802.
culiciformis L. 872.
cultraria F. 204.
curtula L. 162.
curvatula Bkh. 200.
cuspis Hb. 216.
cydoniata Bkh. ab. 711b.
cyllarus Rott. 99.
cytisi Hb. ab. 852a.

dahlia Hb. 245.
damon Schiff. 96.
daplidice L. 8.
debiliata Hb. 712.
deceptoria Sc. 479.
decolorata Hb. 670.
decorata Bkh. v. 581.
defessaria Frr. ab. 781a.
defoliaria Cl. 761.
degenerana Hb. v. (et ab.) 806b.
degeneraria Hb. 563.
delphinii L. 471.
delunaria Hb. gen. aest. 735a.
dentina Esp. 289.
deplana Esp. 838.
depuncta L. 248.
derasa L. 528.
derivalis Hb. 521.
designata Rott. 643.
destrigaria Hw. ab. 775a.
deversaria H. S. 565.

dia L. 40.
dictaeoides Esp. 146.
dictynna Esp. 35.
didyma O. 32 (Melitaea).
didyma Esp. 331 (Hadena).
didymata L. 633.
diffinis L. 413.
dilucidaria Hb. 789.
diluta F. 534.
dilutana Hb. ab. 806a.
dilutaria Hb. 561.
dilutata Bkh. 645.
dimidiata Hufn. 555.
diniensis B. gen. aest. 10b.
dipsacea L. 469.
dispar Hw. 79 (Chrysophanus).
dispar L. 176 (Lymantria).
dissimilis Knoch. 283.
ditrapezium Bkh. 240.
dodonaea Hb. ab. 143a.
dodoneata Gn. 706.
dolabraria L. 745.
dominula L. 826.
dorilis Hufn. 83.
dotata L. 621.
doubledayaria Mill. ab. 770a.
dromedarius L. 148.
dryas Sc. 56.
dubitata L. 611.
dumi L. 196.
duplaris L. 533.

ectypa Hb. ab. 374a.
edusa F. 12.
egerides Stgr. v. 57.
eleus F. gen. aest. 82b.
elinguaria L. 742.
elocata Esp. 505.
elpenor L. 129.
emarginata L. 567.
emortualis Schiff. 519.
empiformis Esp. 875.
ephialtes L. 853.

epiphron Kn. 48.
equestraria F. ab. 730b.
eremita O. ab. 177b.
eris Meig. ab. 44b.
erminea Esp. 138.
erosaria Hb. 733.
erythrocephala F. 436.
erythro stigma Hw. ab. 357a.
euphemus Hb. 101.
euphorbiae F. 219 (Aconicta).
euphorbiae L. 127 (Deilephila).
euphrosyne L. 38.
evonymaria Schiff. 738.
exanthemata Sc. 724.
exclamationis L. 257.
exiguata Hb. 707.
exoleta L. 447.
extincta Stgr. ab. 121d.

fagi L. 140.
f album Esp. ab. 26a.
falcataria L. 199.
farinata Hufn. 598.
fascelina L. 169.
fasciana L. 480.
ferrugata Cl. 640.
festiva Hb. 247.
festucae L. 494.
fibrosa Hb. ab. 356a.
filigramma Esp. 294.
filipendulae L. 852.
fimbria L. 230.
fimbrialis Sc. 546.
firnata Hb. 629.
fissipuncta Hw. 417.
flavago F. 431.
flavescens Esp. ab. 432a.
flavicincta F. 335.
flavicornis L. 535.
flavofasciata Thnbg. 670.
flexula Schiff. 513.
fluctuata L. 632.
fluctuosa Hb. 532.

fluxa Tr. ab. 368.
fontis Thnbg. 524.
foreipula Hb. 254.
formicaeformis Esp. 873.
fraterna Tr. ab. 363a.
fraxini L. 504.
fucata Esp. ab. 430a.
fuciformis L. 133.
fuciformis O. 134.
fuliginaria L. 514.
fuliginosa L. 817.
fulminea Scop. 509.
fulva Hb. 368.
fulvago L. 432.
fulvata Forst. 622.
fumata Stph. 572.
funesta Esp. 502.
furcifera Hufn. 444.
furecula Cl. 136.
furuncula Hb. ab. 304a.
furva Hb. 316.
fuscantaria Hw. 732.
fuscata Hw. ab. 403a.
fusconebulosa D. G. 882.

galathea L. 47.
galene O. ab. 47c.
galiata Hb. 650.
galii Rott. 126.
gamma L. 497.
gemina Hb. 329.
geminipuncta Hatchett. 364.
gemmaria Brahm. 772.
gemmea Tr. 318.
genistae Bkh. 282.
gilvago Esp. 433.
gilvaria F. 800.
giraffina Hb. ab. 156a.
glabra Hb. ab. 436a.
glabraria Hb. 780.
glareosa Esp. 249.
glauca Hb. 288.
glaucata Sc. 205.

globulariae Hb. 856.
 glyphica L. 500.
 gonostigma F. 167.
 gothica L. 398.
 gracilis F. 405.
 graminis L. 271.
 grisealis Hb. 518.
 griseata Schiff. 599.
 griseola Hb. 839.
 griseovariegata Goeze. 407.
 grossulariata L. 716.
 halterata Hufn. 606.
 harpagula Esp. 201.
 hastata L. 658.
 haworthii Curt. 311.
 hebe L. 825.
 hecta L. 884.
 hedydari Hb. ab. 854a.
 helle Hb. 84.
 hellmanni Ev. 367.
 helvola L. 424.
 hepatica Hb. 326.
 hera L. 827.
 herbariata F. 559.
 hero L. 65.
 herzyniae Stgr. var. 319.
 hippocastanaria Hb. 787.
 hippothoë L. 80.
 hirtaria Cl. 768.
 hispidaria F. 765.
 honoraria Schiff. 728.
 hospita Schiff. v. (et ab.) 818a.
 humiliata Hufn. 562.
 humperti Humpert ab. 777a.
 humuli L. 880.
 hyale L. 11.
 hydrata Tr. 663.
 hygiaea Hdrch. ab. 25a.
 hylaeiformis Lasp. 877.
 hyperanthus L. 61.
 hyperici F. 347.

icarinus Scriba ab. 92a.
 icarus Rott. 92.
 ichneumoniformis F. 874.
 ilia Schiff. 16.
 ilicana F. ab. 806c.
 ilicifolia L. 189.
 ilicis Esp. 73.
 imbutata Hb. var. 602.
 immaculata Stgr. ab. 369a (Luceria).
 immaculata Stgr. ab. 406a (Taenio-
 camp).
 immorata L. 568.
 immutata L. 576.
 impudens Hb. 372.
 impura Hb. 373.
 incanata L. 571.
 incerta Hufn. 403.
 incurcata Hb. 636.
 indigata Hb. 687.
 infuscata Stgr. ab. 776a (Boarmia).
 infuscata Stgr. ab. 730a (Ennomos).
 infuscata Buch-White. ab. 320a (Hadena).
 innotata Hufn. 705.
 innuba Tr. ab. 233a.
 ino Rott. 41.
 inornata Hw. 564.
 intermedia Habich ab. 434b.
 interrogationis L. 498.
 iphis Schiff. 66.
 iris L. 15.
 irregularis Hufn. 300.
 irrorella Cl. 834.
 isogrammaria H. S. 702.
 jacobaeae L. 830.
 janira L. 62.
 janthina Esp. 228.
 jo L. 21.
 jole Schiff. ab. 15a.
 jota L. 496.
 jubata Thnbg. 780.
 juliaria Hw. gen. aest. 734a.
 juncta Tutt. ab. 493a.

- juniperata L. 626.
 jurtina L. 62.

 lacertinaria L. 202.
 lactearia L. 548.
 lactucae Esp. 460.
 laevis Hb. 427.
 l album L. 378.
 lanceata Hb. 708.
 lanestris L. 184.
latenai Pier. ab. 289a.
 latens Hb. 253.
 lateritia Hufn. 322.
 lathonia L. 42.
lathyri Hb. gen. vern. 10a.
latruncula Hb. ab. 303a.
 leporina L. 209.
 leucographa Hb. 270.
leucomelas Esp. ab. 47a.
 leucophaea View. 274.
 leucophaearia Schiff. 758.
 leucostigma Hb. 356 (Helotropha).
leucostigma Esp. ab. 331b (Hadena).
leucotera Stdf. v. 6a.
 levana L. 27.
 libatrix L. 484.
 lichenaria Hufn. 779.
 lidia Cr. 259.
 ligea L. 51.
 ligustri F. 222 (Craniophora).
 ligustri L. 123 (Sphinx).
 limacodes Hufn. 858.
 limitata Sc. 591.
 linariata F. 685.
lincago Gn. ab. 434a.
 linearia Hb. 586.
 lineata Sc. 799.
 lineola O. 107.
 ligula Esp. 439.
 linogrisea Schiff. 229.
 lithoxylea F. 323.
litterata Cyr. ab. 499a.
 litura L. 428.

 liturata Cl. 755.
 livida F. 395.
 l nigrum Müller. 174.
 lonicerac Scheven. 851.
 lota Cl. 421.
 lubricipeda L. 814.
lucens Frr. ab. 357b.
 lucida Hufn. 473.
 lucifuga Hb. 459.
 lucina L. 70.
 lucipara L. 350.
 lucipeta F. 252.
 luctifera Esp. 821.
 luctuata Hb. 660.
 luctuosa Esp. 474.
 lugubrata Stgr. 657.
 lunaria Schiff. 735.
 lunaris Schiff. 501.
 lunula Hufn. 451.
 lupulina L. 883.
 luridata Bkh. 784.
 lurideola Zinck. 840.
 lutarella L. 843.
 lutca Stroem. 431.
lutcaria Stgr. ab. 589b.
 luteata Schiff. 669.
 lutcolata L. 746.
 lutosa Hb. 370.
 lycaon Rott. 63.
 lychnitis Rbr. 454.
lynceus Hb. ab. 71a.
 lythargyria Esp. 381.

 machaon L. 2.
 macilenta Hb. 422.
 macularia L. 751.
maculata Wlgr. ab. 121b.
 maera L. 59.
maerens Stgr. ab. 302a.
 malvae L. 116.
 margaritata L. 727.
 marginaria Bkh. 760.
 marginata L. 718.

marginepunctata Göze. 570.
maritima Tausch. 365.
marmorinaria Esp. ab. 758a.
matronalis Frr. ab. 818b.
matura Hufn. 312.
maturna L. 28.
maura L. 353.
medicaginis Bkh. ab. 186a.
medusa F. 49 (Erebia).
medusa Pall. ab. 853a (Zygæna).
megacephala F. 211.
megaera L. 58.
melagona Bkh. 154.
melaleuca View. ab. 449a.
melanaria L. 715.
melanoptera Brahm. ab. (et v.) 828a
meliloti Esp. 849.
mendica Cl. 813.
menthastri Esp. 815.
menyanthidis View. 217.
merularia Weymer. ab. 758b.
mesomella L. 835.
meticulosa L. 352.
mi Cl. 499.
micacea Esp. 358.
milhauseri F. 141.
miniata Forst. 833.
minimus Fuessl. 97.
miniosa F. 399.
minoides Selys. ab. 850a.
mixta Stgr. ab. 438b.
mnemosyne L. 3.
moeniata Sc. 592.
moerens Fuchs ab. 504a.
molluginata Hb. 661.
monacha L. 177.
moneta F. 491.
monoglypha Hufn. 320.
montanata Schiff. 637.
morpheus Hufn. 387 (Caradrina).
morpheus Pall. 105 (Heteropterus).
munda Esp. 406.
mundana L. 832.

muralis Forst. 306.
muricata Hufn. 554.
murinata Sc. 595.
muscaeformis View. 876.
muscerda Hufn. 845.
musculosa Hb. 366.
myopaeformis Bkh. 871.
myrmidone Esp. 13.
myrtilli L. 465.

nana Rott. 295.
nanata Hb. 704.
napaeae Esp. gen. aest. 7a.
napi L. 7.
nebulosa Hufn. 277.
nemoraria Hb. 574.
nerii L. 122.
nervosa F. 223.
neustria L. 178.
nexa Hb. 360.
nictitans Bkh. 357 (Hydroecia).
nictitans Esp. ab. 331a (Hadena).
nigra Frr. ab. 177a.
nigricans L. 258 (Agrotis).
nigricans Stgr. ab. 364a (Nonagria).
nigrofasciaria Goeze. 679.
nigrofasciata Schöyen ab. 718b.
nigromaculata Petersen ab. 166a.
nigrosericeata Hw. ab. 711c.
niobe L. 44.
nitida F. 426.
notata L. 752.
nothum Hb. 538.
nubeculosa Esp. 337.
nupta L. 506.

obelisca Hb. 261.
obeliscata Hb. v. 625b.
obesalis Tr. 526.
obliterata Hufn. 668.
oblongata Thnbg. 684.
obscura Heuäcker gen. aest. 192a
 (Gastropacha).

- obscura Brahm. 232 (Agrotis).
 obscuraria Hb. 788.
obscurata Stgr. ab. 761a (Hybernia).
obscurata Stgr. ab. 645a (Larentia).
 obsoleta Hb. 375.
 occulta L. 268.
 ocellaris Bkh. 434.
 ocellata L. 120 (Smerinthus).
 ocellata L. 623 (Larentia).
 ochracea Hb. 359.
 ochrata Sc. 552.
 ochroleuca Esp. 315.
 octogesina Hb. 531.
 oleagina F. 309.
 oleracea L. 281.
 olivata Bkh. 630.
 ononis F. 468.
 oo L. 410.
 operaria Hb. 790.
 ophiogramma Esp. 302.
 opima Hb. 404.
 optilete Knoch. 88.
 or F. 530.
 orbona Hufn. 234.
 orion Pall. 90 (Lycaena).
 orion Esp. 207 (Diptera).
 ornata Sc. 580.
 ornitopus Rott. 445.
orobi Hb. ab. 850b.
 oxalina Hb. 408.
 oxyacanthae L. 340.

 pabulatricula Brahm. 332.
 palaemon Pall. 106.
 paleacea Esp. 415.
 pales Schiff. 39.
 pallens L. 374.
 pallidata Bkh. 557.
 pallustris Hb. 391.
 palpina L. 158.
 paludata Thnbg. 602.
 panphilus L. 68.
 paphia L. 46.

 papilionaria L. 540.
 paralellaria Schiff. 748.
paralias Nick. ab. 127a.
 paranympa L. 509.
 parthenias L. 537.
parvipuncta Fuchs. gen. aest. 104a.
 pastinum Tr. 510.
 paula Hb. 475.
 pavonia L. 197.
 pedaria F. 764.
pelopia Bkh. ab. 44a.
 pendularia Cl. 582.
 pennaria L. 740.
 perflua F. 396.
perfuscata Hw. ab. 628a.
 perla F. 307.
 perochraria F. R. 551.
 persicariae L. 279.
 petraria Hb. 797.
peucedani Esp. ab. 853b.
 phegea L. 811.
 phlaeas L. 82.
 phoebe Knoch. 31 (Melitaea).
 phoebe Siebert. 149 (Notodonta).
 phragmitidis Hb. 371.
 picata Hb. 654.
 pictaria Curt. 720.
 pigra Hufn. 164.
pilzii Stndf. hybr. 766a.
 pimplinellata Hb. 691.
 pinastri L. 125.
 pini L. 194.
 piniarius L. 793.
 piniperda Panz. 407.
 pinivora Tr. 166.
 pisi L. 286.
 pistacina F. 425.
 plagiata L. 601.
 plantaginis L. 818.
 plecta L. 250.
 plumbaria F. 590.
 plumbeolata Hw. 701.
 pluviigera Esp. 159.

- podalirius* L. 1.
polita Hb. ab. 439b.
pollutaria Hb. ab. 718a.
polychloros L. 24.
polygalae Esp. ab. 846a.
polygona F. 226.
polymita L. 334.
polyodon Cl. 346.
polysperchon Berg. gen. vernal. 85a.
pomoeriararia Ev. 642.
pomonaria Hb. 766.
popularis F. 272.
populata L. 619.
populeti Tr. 401.
populi L. 17 (Linnenitis).
populi L. 119 (Smerinthus).
populi L. 181 (Poecilocampa).
populifolia Esp. 192.
porata F. 584.
porcellus L. 130.
porima O. ab. 27b.
porphyrea Esp. 313.
porrinata Z. 545.
potatoria L. 188.
praecox L. 266.
praeformata Hb. 600.
prasina F. 267.
prasinana L. 809.
prasinaria Hb. v. 726a.
primulae Esp. 247.
proboscidalis L. 525.
procellata F. 656.
processionea L. 165.
procida Hbst. v. 47b.
promissa Esp. 508.
pronuba L. 233.
prorsa L. gen. aest. 27a.
prosapiaria L. 726.
prosequa Tr. ab. 235b.
proserpina Pall. 131.
protea Bkh. 343.
proxima Hb. 293.
pruinata Hufn. 539.
prunaria L. 743.
prunata L. 617.
pruni L. 74 (Thecla).
pruni L. 193 (Odonestis).
pruni Schiff. 855 (Ino).
psi L. 215.
pudibunda L. 171.
pulchella L. 831.
pulehrina Hw. 495.
pulla Esp. 862.
pulveraria L. 725.
pulverulenta Esp. 400.
punctana Hb. ab. 806c.
punctaria L. 585.
punctigera Frr. v. (et ab.) 829a.
punctularia Hb. 785.
purpuralis Brünnich. 846.
pupuraria L. 589.
purpurata L. 819.
purpureofasciata Piller. 348.
pusaria L. 723.
pusillata F. 686.
pustulata Hufn. 542.
putata L. 547.
putris L. 255.
pygmaeata Hb. 703.
pyralina View. 411.
pyramidea L. 397.
pyrina L. 879.
quadra L. 837.
quadrifasciaria Cl. 639.
quadripunctaria Podw. 827.
quadripunctata F. 384.
quercifolia L. 191.
quercinaria Hufn. 730.
quereus L. 76 (Zephyrus).
quereus L. 185 (Lasiocampa).
querna F. 142.
ramosa Esp. 450.
ramosana Hb. ab. 806d.
rapae L. 6.

- rectangulata L. 711.
 rectilinea Esp. 345.
 remissa Tr. ab. 329a.
 renutaria Hb. 573.
 renago Hw. ab. 410a.
 repandata L. 775.
 respersa Hb. 386.
 reticulata Vill. 290 (Manestra).
 reticulata Thnbg. 616 (Lygris).
 retusa L. 418.
 revayana Sc. 806.
 rhamnata Schiff. 615.
 rhamni L. 14.
 ribeata Cl. 774.
 ridens F. 536.
 rimicola Hb. 182.
 rivata Hb. 651.
 roboraria Schiff. 776.
 roraria F. 791.
 rossica Kol. v. (et ab.) 826a.
 rostralis L. 527.
 rotaria F. gen. vern. 589a.
 rubetra Esp. ab. 425c.
 rubi L. 75 (Callophrys).
 rubi L. 187 (Macrothylacia).
 rubi View. 244 (Agrotis).
 rubidata F. 680.
 rubiginata Hufn. 569.
 rubiginea F. 440.
 rubricans Esp. ab. 258a.
 rubricollis L. 836.
 rubricosa F. 269.
 rubrirena Tr. 319.
 rufaria Hb. 553.
 rufata F. 604.
 runcis L. 221.
 rupicaprararia Hb. 756.
 rurea F. 325.
 ruris Hb. ab. 261a.
 russula L. 820.
 rutilus Wernb. v. 79.
 sagittata F. 682.
 salicalis Schiff. 520.
 salicis Curt. ab. 221a (Acronicta).
 salicis L. 175 (Stilpnotia).
 sambucaria L. 744.
 sanio L. 820.
 sao Hb. 113.
 satellitia L. 441.
 saturata Stgr. ab. 367a.
 satyrata Hb. 698.
 scabiosae Z. 134 (Hemaris).
 scabiosae Scheven. 847 (Zygaena).
 scabiosata Bkh. 700.
 scabriuscula L. 344.
 schmidtii Gerh. ab. 82a.
 scincula Hb. ab. 202a.
 scita Hb. 351.
 scolopacina Esp. 327.
 serophulariae Capioux. 453.
 seutosa Schiff. 470.
 secalis Bjerk. 331.
 secundaria Esp. 773.
 segetum Schiff. 264.
 selene Schiff. 37.
 selini B. 385.
 semele L. 54.
 semiargus Rott. 98.
 semibrunnea Hw. 442.
 sepiaria Hufn. 786.
 sepium Spr. 865.
 serena F. 292.
 sericcalis Sc. 481.
 serina Esp. ab. 425b.
 serratulæ Rbr. 114.
 sexalisata Hb. 607.
 sibylla L. 18.
 signaria Hb. 754.
 signum F. 227.
 silaceata Hb. 675.
 similata Thnbg. 551.
 similis Fuessl. 173.
 simulans Hufn. 251.
 sinapis L. 10.

- siterata* Hufn. 627.
sinaragdaria F. 543.
sobrinata Hb. 709.
socia Rott. 443.
sociata Bkh. 652.
solidaginis Hb. 448.
sordida Fuessl. ab. 743a.
sordida Bkh. 317.
sordidata F. 672.
sororcula Hufn. 844.
spadicea Hb. ab. 438a.
spadicearia Bkh. ab. 640a.
sparganii Esp. 362.
spartiata Fuessl. 603.
speciosa Hb. 238.
spheceiformis Gerning. 868.
spini Schiff. 71.
sphinx Hufn. 338.
spiraeae Esp. ab. 123a.
spoliata Stgr. ab. 566a.
sponsa L. 507.
stabilis View. 402.
statices L. 857.
statilinus Hufn. 55.
stellatarum L. 132.
stentzii Frr. v. (et ab.) 849a.
stigmatica Hb. 241.
strabonaria Z. gen. aest. 586a.
stragulata Hb. ab. 625a.
straminata Tr. 558.
straminea Tr. 376.
strataria Hufn. 769.
striata L. 828.
strigaria Hb. 577.
strigata Müll. 549.
strigilaria Hb. 579.
strigillaria Hb. 801.
strigilis Cl. 303.
strigosa F. 213.
strigula Thnbg. 225 (Agrotis).
strigula Schiff. 803 (Nola).
subaerata Hb. ab. 711a.
subfulvata Hw. v. 699a.
subhastata Nolck. ab. 658a.
sublustris Esp. 324.
subnotata Hb. 697.
subsequa Hb. ab. 234a.
subspadicea Stgr. ab. 439a.
subtusa F. 419.
succenturiata L. 699.
suffumata Hb. 638.
suspecta Hb. 416.
sylvanus Esp. 111.
sylvata Sc. 717.
sylvina L. 881.
syringaria L. 737.
tabaniformis Rott. 867.
tages L. 117.
tanaceti Schiff. 457.
taras Bergst. ab. 116a.
taraxaci Hb. 389.
tarsipennalis Tr. 517.
tarsiphumalis Hb. 516.
tau L. 198.
temerata Hb. 722.
tenebrata Sc. 467.
tenebrosa Hb. 393.
tentacularia L. 522.
terrarius Weymer ab. 769a.
terricularis Hb. ab. 524a.
tersata Hb. 714.
testacea Hb. 310.
testaceata Don. 667.
testaceolata Stgr. ab. 671a.
testata L. 618.
tetralunaria Hufn. 736.
thalassina Rott. 284.
thapsiphaga Tr. 455.
thaumas Hufn. 108.
tibiale Esp. 597.
tiliae L. 121.
tiliaria Hb. ab. 733a.
tincta Brahm. 276.
tiphon Rott. 69.
tipuliformis Cl. 869.

tithonus L. 64.
 togata Hb. 689.
 torva Hb. 150.
 trabealis Sc. 483.
 tragopoginis L. 394.
 trapezina L. 414.
 tremula Cl. 145 (Pheosia).
tremulae Esp. ab. 17a (Linenitis).
 tremulifolia Hb. 190.
 trepida Esp. 151.
 triangulum Hufn. 236.
tricuspis Esp. ab. 271a.
 tridens Schiff. 214.
 trifasciata Bkh. 673.
 trifolii Esp. 186 (Lasiocampa).
 trifolii Rott. 287 (Mamestra).
 trifolii Esp. 850 (Zygaena).
 trigrammica Hufn. 383.
 trilineata Sc. 550.
 trimacula Esp. 143.
 tripartita Hufn. 489.
 triplasia L. 487.
 trisignaria H. S. 695.
 tristata L. 659.
 tritici L. 260.
 tritophus F. 149.
 tritophus Esp. 150.
 truncata Hufn. 628.
 turca L. 382.
 tusciaria Bkh. 741.
 typhae Thnbg. 363.
 typica L. 354.

ulmi Stgr. ab. 121c.
 umbelaria Hb. 578.
 umbra Hufn. 472.
 umbratica Goeze. 393 (Rusina).
 unbratica L. 458 (Cucullia).
 umbrosa Hb. 243.
 unangulata Hw. 653.
 unanimis Tr. 330.
 uncula Cl. 477.
 undulana Hb. 806.

undulata L. 613.
unicolor Stgr. ab. 279a (Mamestra).
 unicolor Hufn. 860 (Pachytelia).
unicoloraria Stgr. ab. 792a.
unicoloria Esp. ab. 733b.
 unidentaria Hw. 641.
 unifasciata Hw. 664.
 unita Hb. 842.
 urticae L. 22 (Vanessa).
 urticae Esp. 816 (Spilosoma).

vaccinii L. 438.
valesina Esp. ab. 46a.
 variata Schiff. 625.
 vau punctatum Esp. 437.
 velitaris Rott. 153.
 velleda Hb. 882.
 venosata Hb. 690.
 venustula Hb. 478.
 verbasci L. 452.
 verberata Sc. 648.
 vernana Hb. 807.
 vernaria Hb. 541.
 versicolora L. 195.
 vespertaria Bkh. 635.
 vespiformis L. 870.
 vestigialis Rott. 265.
 vetulata Schiff. 614.
 vetusta Hb. 446.
 vibicaria Cl. 587.
 viciae Hb. 511.
 viciella Schiff. 861.
 villica L. 823.
 viminalis F. 301.
 vinula L. 139.
 violata Thnbg. 581.
 virens L. 369.
 viretata Hb. 608.
 virgata Rott. 594.
 virgaureae L. 78.
 virgularia Hb. 556.
 viridaria Cl. 482 (Prothymnia).
 viridaria F. 631 (Larentia).

viridata L. 544.
vitalbata Hb. 713.
vittata Bkh. 644.
vulgata Hw. 694.


w album Knoch. 72.
wauaria L. 794.

xanthocyanea Hb. var. 294.

xanthographa F. 242.
xanthomelas Esp. 23.
xarippe Butl. ab. 509a.

ypsilon Rott. 263.

ziczac L. 147.
zonaria Schiff. 767.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte aus dem Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Magdeburg](#)

Jahr/Year: 1909-1914

Band/Volume: [II](#)

Autor(en)/Author(s): Bornemann Gustav

Artikel/Article: [Verzeichnis der Großschmetterlinge aus der Umgebung von Magdeburg und des Harzgebietes. 163-251](#)