

Dupla Fungorum (1997)

Verteilt vom Institut für Botanik der Universität Graz (GZU)

Christian SCHEUER

SCHEUER, Ch. 1997. Dupla Fungorum (1997), verteilt vom Institut für Botanik der Universität Graz (GZU). - *Fritschiana* 9: 39-61.

Dupla Fungorum is a series for the publication and distribution of fungal collections with irregular numbers of specimens. Therefore every institution receiving a duplicate of a collection is cited on the label and in the published list. The collections distributed in this series are not numbered.

Dupla Fungorum (1997) is sent to the following institutions: IMI, KRAM, LI, TROM, WSP. It contains 250 collections of fungi of various taxonomic groups (but mainly Ascomycetes), among them many interesting, rarely collected species, e.g., *Arthrinium curvatum* var. *minus*, *Camarops pugillus*, *Didymella caricis*, *Heptameria uncinata*, *Lachnum clavissporum*, *Leptoglossum lobatum*, *Melampsora ribesii-viminalis*, *Micropeziza verrucosa*, *Milesia vogesiaca*, *Naeviopsis carneola*, *Obtectodiscus aquaticus*, *Phaeosphaeria caricis-firmae*, *Phyllosticta solidaginis-serotinae*, *Puccinia asperulae-odoratae*, *P. silai*, *Pyrenopeziza arctii*, *P. rigidae*, *Pyrenophora ephemera*, *Ramularia atropae*, *Uredinopsis struthiopteridis*, *Uromyces muscari*, and *Urocystis phlei-alpini*.

Dupla Fungorum (1997) includes isotype material of *Hysteronaevia stenospora* NANNF., *Hysteropeziza pusilla* B. HEIN & SCHEUER, and *Taphrophila cornu-capreoli* SCHEUER, isosyntype material of *Nitschkia salvadorae* S. AHMAD, and paratype material of *Diplonaevia davalliana* B. HEIN & SCHEUER, *Hysteronaevia clavulifera* NANNF., and *Puccinia circumalpinia* ZWETKO.

Die Serie Dupla Fungorum dient der Verteilung von Pilzaufsammlungen, aus denen nur geringe und unregelmäßige Stückzahlen von Belegen gewonnen werden konnten. Solche Aufsammlungen sind für die Verteilung in einem Exsiccatenwerk naturgemäß ungeeignet und werden üblicherweise nicht unter gleichzeitiger Ausgabe einer entsprechenden Publikation verteilt. Nachdem die floristische Information über diese Funde (v. a. in Anbetracht unserer geringen Kenntnis der heimischen Kleinpilzflora) jedoch zweifellos von Interesse ist, beabsichtigen wir in Zukunft jeder fertig zusammengestellten Lieferung von Pilz-Dubletten auch eine entsprechende Liste beizulegen. Wegen der schon angesprochenen unregelmäßigen Stückzahlen werden für jede Aufsammlung und auf jedem Etikett alle Herbarien genannt, welche eine Dublette erhalten (Herbar-Abkürzungen nach HOLMGREN, P.K., HOLMGREN, N.H., & BARNETT, L.C. 1990: Index Herbariorum, Part I. The Herbaria of the World, Ed. 8. Regnum Vegetabile, Vol. 120. New York).

Die vorliegende erste Lieferung wird an IMI, LI, TROM, KRAM und WSP verteilt und enthält 250 Aufsammlungen von Pilzen aus verschiedensten taxonomischen Gruppen (überwiegend jedoch Ascomyceten), darunter folgendes Typusmaterial: Isotypen von *Hysteronaevia stenospora* NANNF., *Hysteropeziza pusilla* HEIN & SCHEUER und *Taphrophila cornu-capreoli* SCHEUER, Isosyntypen von *Nitschkia salvadorae* S. AHMAD (möglicherweise auch von *Gloeocystidium subcoroniferum* LITSCHAUER) sowie Paratypen von *Diplonaevia davalliana* B. HEIN & SCHEUER, *Hysteronaevia clavulifera* NANNF. und *Puccinia circumalpinia* ZWETKO.

Besonders bemerkenswerte Arten sind z. B. *Arthrimum curvatum* var. *minus*, *Camarops pugillus*, *Didymella caricis*, *Heptameria uncinata*, *Lachnum clavisorum*, *Leptoglossum lobatum*, *Melampsora ribesii-viminalis*, *Micropeziza verrucosa*, *Milesia vogesiaca*, *Naeviopsis carneola*, *Obtectodiscus aquaticus*, *Phaeosphaeria caricis-firmae*, *Phyllosticta solidaginis-serotinae*, *Puccinia asperulae-odoratae*, *P. silai*, *Pyrenopeziza arctii*, *P. rigidae*, *Pyrenophora ephemera*, *Ramularia atropae*, *Uredinopsis struthiopteridis*, *Uromyces muscari* und *Urocystis phlei-alpini*.

Viele Damen und Herren haben zur Fertigstellung dieser großen Dubletten-Lieferung beigetragen. Mein Dank gilt zuerst den Herren Harald KOMPOSCH und Alois WILFLING, die einen großen Teil des Materials präpariert bzw. aufgeteilt haben. Für die zur Verfügung gestellten Aufsammlungen bzw. Bestimmungen danke ich besonders Frau Larissa N. VASILYEVA, sowie den Herren Thomas BARTA, Uwe BRAUN, Willibald MAURER, Sigmund MICHELITSCH, Markus MÖSLINGER, Kálmán VÁNKY, Alois WILFLING und Peter ZWETKO.

Christian Scheuer

- Allantoportha decedens** (Fr.: Fr.) M. E. Barr, auf abgestorbenen Zweigen von *Corylus avellana* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, am Aufstieg vom Klammgraben zum Novstein, im Bereich des „Römerweges“, ca. 800 m alt., 47°10'N/15°28'E, GF 8858/2; Gebüsch am Weg, 16.08.1992, leg. P. Zwetko & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Amphisphaerella xylostei** (Pers.: Fr.) Rulamort, auf Zweigen von *Lonicera alpigena* L., ÖSTERREICH, Tirol, Karwendel-Gebirge, Nordkette bei Innsbruck, zwischen dem obersten Parkplatz im Halltal und den Herrenhäusern, ca. 1400 m alt., 47°19'N/11°28'E, GF 8634/4; Gebüsch am Weg, 20.08.1991, leg. Ch. Scheuer, A. Nogrsek & W. Pongratz, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, TROM, WSP
- Amphisphaeria alpigena** Fuckel, auf Zweigen von *Lonicera alpigena* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, „Langer Weg“ von Stattegg-Buch auf den Schöckl, im Bereich des Göstinger Forsthauses, ca. 1100 m alt., 47°11'N/15°26'E, GF 8858/2; Gebüsch am Wegrand, 06.09.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
Anm.: Diese Art gehört in die Gattung *Amphisphaerella* (Sacc.) Kirschst., welche derzeit von J. C. Krug (Toronto, Kanada) bearbeitet wird.
- Aphanobasidium filicinum** (Bourd.) Jülich, auf Faulholz von *Pinus sylvestris* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Hohe Rannach N von Graz, Geierkogel, ca. 900 m alt., 47°10'N/15°24'E, GF 8858/1, 31.06.1985, leg. J. Poelt & J. Riedl, det. S. Michelišch. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Arthrinium curvatum** Kunze var. *minus* M. B. Ellis in M. B. Ellis & al., auf *Carex cf. elata* All. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Oberösterreich, kurz W von Steyr, Auen der Steyr beim Schloß Rosenegg, ca. 300 m alt., 48°02'N/14°22'E, GF 7952/3; an einem Altwasser, 09.04.1982, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Arthrinium cuspidatum** (Cooke & Harkn.) Höhn., auf *Juncus filiformis* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), POLEN, West-Karpaten, östliche Hohe Tatra, Tatra-Nationalpark, am Weg vom Sattel „Przelecz Liliowe“ in das Tal „Dolina Gasienicowa“, ca. 1600 m alt.; anmoorige Mulde im Pinetum mughii, 09.07.1993, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Arthrinium phaeospermum** (Corda) M. B. Ellis, + *Arthrinium arundinis* (Corda) Dyko & B. Sutton, auf *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. (abgestorbene Halme), ÖSTERREICH, Kärnten, Rosental, St. Margareten i. Rosental (46°32'N/14°25'E), beim Bach „Vocica“, 600 m alt., GF 9452/4, 02.12.1995, leg./det. W. Jaklitsch. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Ascotremella faginea** (Peck) Seaver, auf Faulholz von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, Stattegg, Falschgraben, 550-600 m alt., 47°08'N/15°25'E, GF 8858/4; bewaldete Bachschlucht, 25.09.1991, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, TROM, WSP
- Banhegyia setispora** Zeller & Tóth, auf Zweigen von *Juniperus communis* L. ssp. *communis*, ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöckl N von Graz, auf dem Plateau, nahe dem Nordrand, ca. 1420 m alt., ca. 47°12'N/15°28'E, GF 8758/4(?), 07.07.1985, leg./det. J. Poelt. Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Bertia moriformis** (Tode: Fr.) De Not., auf Faulholz, ÖSTERREICH, Steiermark, Steirisches Randgebirge, Teigtischgraben S von Voitsberg, E bis SE von St. Martin a. Wöllmißberg, ca. 430-500 m alt., 47°00'N/15°08'E, GF 8956/4; bewaldete Bachschlucht, 17.08.1993, leg./det. Ch. Scheuer. Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Biscogniauxia nummularia** (Bull.: Fr.) Kuntze, auf *Fagus orientalis* Lipsky (abgestorbene, berindete Äste), BULGARIEN, Kamčijska Planina (Kamchik Balkan), ca. 1,5 km SW von Rudnik, 200-250 m alt.; Laubmischwälder mit *Quercus cerris*, *Fagus orientalis*, *Tilia tomentosa*, 05.1996, leg. A. Drescher, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Bisporella citrina** (Batsch) Korf & S. E. Carp., auf *Fagus sylvatica* L. (Faulholz), ÖSTERREICH, Steiermark, Hochschwab-Gruppe, Afenzer Staritzen, Seebger-Sattel, unterste S-Abhänge der Seeleiten, ca. 1270 m alt., 47°37'N/15°16'E, GF 8357/4; montaner Wald mit *Fagus sylvatica*, *Picea abies*, *Abies alba*, 12.09.1990, leg. Ch. Scheuer & J. C. Krug, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Botryosphaeria festucae** (Lib.) Arx & E. Müller, auf *Leymus arenarius* (L.) Hochst. (vorjährige, abgestorbene Blätter), SCHWEDEN, Bohuslän, Koster-Archipel SW von Strömstad, Insel Sör-Koster (58°53'N/11°01'E), S der Ortschaft Ekenäs, Küste zwischen „Bergdalen“ und der Anlege-

- stelle „Kilesands bryggan“, 11.06.1990, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Bricookea sepalorum** (Vleugel) M. E. Barr, auf *Juncus trifidus* L. (vorjährige Früchte), GRÖNLAND, West-Grönland, Disko, Godhavn (69°15'N/53°33'W), Hänge N der Arktischen Station, 20-100 m alt., 29.07.1983, leg. J. Poelt, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Bricookea sepalorum** (Vleugel) M. E. Barr, auf *Juncus trifidus* L. (vorjährige Früchte), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, S vom Schladminger Obertal, W-Fuß des Sauberges, 2180 m alt., 47°16'N/13°40'E, GF 8748/1; Schneeböden im Schultfächer einer Geröllhalde, 11.06.1993, leg. A. Wilfling & M. Möslinger, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Brunnipila calycioides** (Rehm) Baral in Baral & Kriegist., auf *Juncus trifidus* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Kärnten, westliche Karnische Alpen, Gebiet des Monte Peralba (Hochweißstein), Weg vom Ötnerjoch zur Raudenspitze, ca. 2040 m alt., 46°38'N/12°44'E, GF 9342/3, 14.07.1981, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Brunnipila calycioides** (Rehm) Baral in Baral & Kriegist., auf *Juncus trifidus* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, S vom Schladminger Obertal, W-Fuß des Sauberges, 2180 m alt., 47°16'N/13°40'E, GF 8748/1; Schneeböden im Schultfächer einer Geröllhalde, 11.06.1993, leg. A. Wilfling & M. Möslinger, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Brunnipila calycioides** (Rehm) Baral in Baral & Kriegist., auf *Juncus trifidus* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Hochgolling, Anstieg vom Gollingwinkel zur Gollingscharte, 1800-1900 m alt., 47°16'N/13°45'E, GF 8748/2; Caricetum ferrugineae, 03.09.1987, leg. Ch. Scheuer & H. Köckinger, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Brunnipila calycioides** (Rehm) Baral in Baral & Kriegist., + *Hysteropezizella diminuens* (P. Karst.) Nannf. (unreif), auf *Juncus trifidus* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Seetaler Alpen, N vom Zirbitzkogel, kurz N vom Kreiskogel, Kar E unter dem Rücken zwischen Kreiskogel und Schusterleiten, ca. 2000 m alt., 47°05'N/14°33'E, GF 8953/1, 21.07.1991, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Brunnipila calycioides** (Rehm) Baral in Baral & Kriegist., auf *Juncus filiformis* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), POLEN, West-Karpaten, östliche Hohe Tatra, Tatra-Nationalpark, am Weg vom Sattel „Przelecz Liliowie“ in das Tal „Dolina Gasienicowa“, ca. 1600 m alt.; anmoorige Mulde im Pinetum mughi, 09.07.1993, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Calloria neglecta** (Lib.) B. Hein, Syn. *Calloria fusarioides* (Berk.) Fr., auf *Urtica dioica* L. (abgestorbene, vorjährige Stengel), ÖSTERREICH, Steiermark, Auen der Mur bei Mureck (46°42'N/15°46'E), ca. 235 m alt., GF 9260/4; Auwald, 10.04.1984, leg./det. S. Michelitsch. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Calycellina flaveola** (Cooke) Baral & Blank in Baral, auf *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn (abgestorbene Wedel), ÖSTERREICH, Kärnten, Nockgebiet, oberes Gurktal W von Weitensfeld, Braunsberg S von Kleinglödnitz, am Fuß der NE-Abhänge kurz W der Siedlung, ca. 790 m alt., 46°50'N/14°08'E, GF 9150/4; feuchte Wälder von *Picea abies*, mit *Betula pendula*, *Vaccinium* spp., *Sphagnum* spp., 27.08.1989, leg. Ch. Scheuer, in duplo det. H.-O. Baral (Tübingen, 1992). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Calycina herbarum** (Pers.: Fr.) Gray, Syn. *Hymenoscyphus herbarum* (Pers.: Fr.) Dennis, auf *Atropa bella-donna* L. (abgestorbene, vorjährige Stengel), ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, Plabutschzug, „Weg zur Einsiedelei“ E unterhalb vom Gaisberg-Sattel, ca. 500 m alt., 47°04'N/15°22'E, GF 8958/1; Schlagfläche, 22.09.1984, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Camarops pugillus** (Schw.: Fr.) Shear, auf Faulholz von *Carpinus betulus* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Oststeirisches Hügelland E von Graz, Graben S von Laßnitzhöhe, ca. 460 m alt., 47°04'N/15°35'E, GF 8959/2, 24.09.1992, leg. Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, TROM, WSP
- Camarops pugillus** (Schw.: Fr.) Shear, auf Faulholz von cf. *Carpinus betulus* L., ÖSTERREICH, Steiermark, NW von Bad Radkersburg, E der Straße von Halbenrain nach Klösch, Steinriegelwald ca. 3 km N von Halbenrain, ca. 230 m alt., 46°44'N/15°57'E, GF 9261/4; Bestand mit *Picea abies*

- (cult.), *Alnus glutinosa*, *Fraxinus excelsior*, etc., an einem Bach, 07.09.1994, leg. W. Maurer, Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Anm.:** Siehe dazu die Arbeiten von Lundqvist (in Svensk Bot. Tidskr. 81[2]: 65-69; 1987) und Vasilyeva & Scheuer (in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 126: 68-70; 1996).
- Camarosporium capparidis** S. Ahmad, in Sydowia 5: 393 (1951), auf *Capparis aphylla* Roth (abgestorbene Zweige), PAKISTAN, Lahore, Changa Manga, 23.03.1954, 24.02.1962, leg. S. Ahmad, det. B. C. Sutton (1996). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Cejjia hystrix** (De Not.) Baral, Syn. *Belonium hystrix* (De Not.) Höhn., auf *Molinia caerulea* (L.) Moench (abgestorbene, vorjährige Halme), DEUTSCHLAND, Bayern, Chiemgau, Litzelsee E von Prutting (47°53'N/12°12'E), ca. 485 m alt.; Molinietum am Rand des Moores, 27.08.1987, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Canangium ferruginosum** Fr., auf *Pinus nigra* Arnold ssp. *laricio* (Poir.) Maire (abgestorbene Zweige), ITALIEN, Sizilien, Prov. Catania, Ätna, Milia N von Ragalna, E des Giardino Botanico Etneo „Nuova Gussonea“, ca. 1700 m alt.; offenes Pinetum laricionis, 28.05.1988, leg. J. Poelt, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Cercospora opuli** (Fueckel) Höhn., auf *Viburnum opulus* L. (nekrotische Blattflecken), ÖSTERREICH, Steiermark, Ennstaler Alpen, Gesäuse, Hartelsgraben ca. 4 km W von Hiefiau, 600-700 m alt., 47°35'N/14°42'E, GF 8454/1; montaner Mischwald mit *Fagus sylvatica*, *Acer pseudoplatanus*, *Ulmus glabra*, *Picea abies*, 16.09.1995, leg./det. Ch. Scheuer, conf. U. Braun (Halle/S., 1996). Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Chaetosphaerella phaeostroma** (Dur. & Mont.) E. Müller & C. Booth, auf Faulholz von cf. *Acer* spec., ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, südlicher Plabutschzug, unterhalb vom Schloß St. Martin, 360-380 m alt., 47°02'N/15°23'E, GF 8958/3; feuchte Rinne in einem Quercus-Carpinetum, 20.04.1991, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Chaetosphaeria pulviscula** (Curr.) C. Booth, auf noch zähem Faulholz von cf. *Carpinus betulus* L., ÖSTERREICH, Oberösterreich, Steyr, Damberg ca. 4 km S von Steyr, W-Abhang des Damberges E der Ortschaft Sand, 500-600 m alt., ca. 47°59'N/14°25'E, GF 8052/2; Fagetum sylvaticae mit *Carex pilosa*, Flysch-Sandstein, 10.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Chaetosphaeria pulviscula** (Curr.) C. Booth, auf Faulholz, ÖSTERREICH, Steiermark, Steirisches Randgebirge, Teigtischgraben S von Voitsberg, am orographisch linken Ufer der Teigtisch, zwischen der Brücke bei 420 m alt. und der Brücke kurz unterhalb vom Gehöft „Leitenweber“ bei 480 m alt., 47°00'N/15°08'E, GF 8956/4; bewaldete Bachschlucht, 08.08.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Chlorociboria aeruginascens** (Nyl.) Kanouse ex Ramamurthi, auf grün verfärbtem Faulholz, ÖSTERREICH, Steiermark, Salzaakum S von Mariazell, am Wanderweg an der Salza, ca. 1 km E der Salzaabücke in Rasing, ca. 800 m alt., 47°45'N/15°19'E, GF 8257/2; montaner Mischwald über Kalk, 20.07.1994, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Clathrospora elynae** Rabenh., auf *Carex curvula* All. (abgestorbene, vorjährige Stengel, Blätter und Blattspitzen), ÖSTERREICH, Tirol, Ötztaler Alpen, S vom Timmelsjoch, kurz NE unterhalb vom Bankerferner, 2550-2600 m alt., 46°53'N/11°05'E, GF 9132/2; lückige, von Moosen dominierte Rasen über Silikat, 22.08.1991, leg. Ch. Scheuer, A. Nogrased & W. Pongratz, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Clathrospora heterospora** (De Not.) Wehm., auf *Juncus jacquinii* L. (abgestorbene, vorjährige Stengel und Blätter), ÖSTERREICH, Tirol, Ötztaler Alpen, ca. 3,5 km SSE von Obergurgl, im Rotmoostal etwa auf halbem Wege zwischen dem Gletscher-Vorfeld des Rotmoosferners und der Schönwieshütte, ca. 2300 m alt., 46°50'N/11°02'E, GF 9132/3; alpine Rasen an SW-exponiertem Hang, 23.08.1991, leg. Ch. Scheuer, A. Nogrased & W. Pongratz, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Clathrospora heterospora** (De Not.) Wehm., auf *Luzula alpino-pilosa* (Chaix) Breistr. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Hochgolling, Anstieg von der Gollingscharte zum Gipfel, ca. 2440 m alt., 47°16'N/13°45'E, GF 8748/2; zwischen Silikatschutt, 03.09.1987, leg. Ch. Scheuer & H. Köckinger, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Claussenomyces atrovirens** (Pers.) Korf & Abawi, auf *Fagus sylvatica* L. (entrindeter Faulast), ÖSTERREICH, Steiermark, Salztal, bei der Kläfferbrücke zwischen Gschöder und Weichsel-

- boden, 640-680 m alt., 47°38'N/15°08'E, GF 8356/4; Ufergehölz an der Salza, 12.09.1990, leg. Ch. Scheuer & J. C. Krug, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Coleosporium calalae** (DC.) G. H. Oth, Syn. *Coleosporium tussilaginis* (Pers.) Lév. sensu lato, auf *Adenostyles glabra* (Mill.) DC., DEUTSCHLAND, Schwaben, ca. 5 km WNW von Pfronten, Umgebung der Kappeler Alpe, ca. 1500 m alt., ca. 47°35'N/10°30'E, GF 8429/1, 05.08.1959, leg. J. Schröppel & H. Doppelbauer, det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Coleosporium doronici** Namysl. ex H. Syd. & P. Syd., Syn. *Coleosporium tussilaginis* (Pers.) Lév. sensu lato, II, III auf *Doronicum austriacum* Jacq. [in der Nähe einige Bäume von *Pinus cembra* L.], ÖSTERREICH, Steiermark, Wölzer Tauern, ca. 9 km SE von Donnersbach, Plannersee, Hangseite, ca. 1800 m alt., 47°24'N/14°12'E, GF 8551/3; Gebüsch von *Ainus viridis*, 24.07.1985, leg./det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Coryneum elevatum** (Riess) B. Sutton, auf *Quercus robur* L. oder *Qu. petraea* (Matt.) Liebl. (abgestorbene, noch hängende Zweige), ÖSTERREICH, Steiermark, Oststeirischer Hügelland, Lembach NE von Riegersburg, 47°00'N/15°37'E, GF 8961/4, 02.05.1996, leg. W. Maurer, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Cribraria aurantiaca** Schrad., auf Faulholz, DEUTSCHLAND, Sachsen, Elbsandstein-Gebirge, Wehlener Grund, 17.06.1967, leg./det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Cryptodiaporthe hystrix** (Tode: Fr.) Petr., auf abgestorbenen Ästen von *Acer pseudoplatanus* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Salzklamm S von Mariazell, am Wanderweg durch die Salzklamm, ca. 800 m alt., 47°45'N/15°19'E, GF 8257/2; montaner Mischwald über Kalk, 20.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Cucurbitaria cf. laburni** (Pers.: Fr.) De Not., auf abgestorbenen Zweigen von *Genista cf. salzmannii* DC., ITALIEN, Sardinien, Prov. Sàssari, Monte Limbara SE von Tempio Pausania, 1250-1300 m alt.; Kugelpolster-Heide zwischen großen Granitfelsen, 07.05.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Cyathicula megalospora** (Rea) Dennis, Syn. *Crocicreas megalosporum* (Rea) S. E. Carp. var. *megalosporum*, auf *Carex rostrata* Stokes ex With. (abgestorbene Blätter und Blattscheiden, z. T. im Wasser), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, ca. 18 km S von Gröbming, Schwarzensee, 1163 m alt., 47°17'N/13°52'E, GF 8749/1; kleine *Carex rostrata*-Rieder in Zuflüssen am S-Ufer, 05.08.1984, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, TROM, WSP
- Dasyscyphus pulverulentus** (Lib.) Sacc., auf abgefallenen Nadeln von *Pinus sylvestris* L., ÖSTERREICH, Steiermark, südlicher Stadtrand von Graz, Grambach S von Raaba, „Im Wolfgraben“, ca. 365 m alt., 47°01'N/15°30'E, GF 8959/3; Waldrand, 13.04.1991, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Derma cerasi** (Pers.: Fr.) Fr., auf *Cerasus avium* (L.) Moench (abgestorbene Äste), ÖSTERREICH, Steiermark, Poßruck, Heiligengeist-Klamm S von Leutschach, ca. 650 m alt., 46°37'N/15°28'E, GF 9358/4; bewaldete Bachschlucht mit *Acer pseudoplatanus*, *Fagus sylvatica* und *Picea abies*, 10.08.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Diaporthe leiphaemia** (Fr.: Fr.) Sacc., Syn. *Amphiporthe leiphaemia* (Fr.: Fr.) Butin, auf *Quercus robur* L. oder *Qu. petraea* (Matt.) Liebl. (abgestorbene Äste und Zweige), ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, Bez. Straßgang, Florianiberg, Umgebung der Kirche „St. Florian“, ca. 500 m alt., 47°01'N/15°23'E, GF 8958/3; Querco-Carpinetum, 04.05.1991, leg. Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diaporthe leiphaemia** (Fr.: Fr.) Sacc., Syn. *Amphiporthe leiphaemia* (Fr.: Fr.) Butin, auf *Quercus cf. robur* L. (abgestorbene Äste und Zweige), ÖSTERREICH, Steiermark, E von Leibnitz, ca. 3 km N von Lipsch, im Bereich des Schweinsbaches N von Sulzegg, 290-300 m alt., 46°47'N/15°40'E, GF 9260/1; Laubmischwald mit *Alnus glutinosa*, *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, 07.09.1994, leg. W. Maurer, Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diatrype disciformis** (Hoffm.: Fr.) Fr., auf *Fagus sylvatica* L. (Äste und Zweige), SLOWAKEI, Ost-Slowakei, Vihorlat-Gebirge, Osthang knapp unterhalb vom Tri Tably-Sattel, 815-823 m alt., junger *Fagus sylvatica*-Bestand, 14.07.1993, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP

- Diatrypella angulata** (Fr.: Fr.) Ces. & De Not. sensu Winter (1887), Syn. *Diatrypella nigro-annulata* (Grev.) Nitschke, Syn. *Diatrypella verruciformis* (Ehrh.: Fr.) Nitschke sensu lato, auf abgestorbenen Ästen von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Vorarlberg, Rankweil, E der Heilanstalt in Valduna, ca. 520-550 m alt., 47°15'N/9°38'-39'E, GF 8723/2; Mischwälder, 03.09.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Diatrypella angulata** (Fr.: Fr.) Ces. & De Not. sensu Winter (1887), Syn. *Diatrypella nigro-annulata* (Grev.) Nitschke, Syn. *Diatrypella verruciformis* (Ehrh.: Fr.) Nitschke sensu lato, auf abgestorbenen Ästen von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Steiermark, E von Leibnitz, ca. 3 km N von Lipsch, im Bereich des Schweinsbaches N von Sulzegg, 290-300 m alt., 46°47'N/15°40'E, GF 9260/1; Laubmischwald mit *Alnus glutinosa*, *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, 07.09.1994, leg. W. Maurer, Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Anm.:** Vasilyeva (in Vasilyeva & Scheuer, Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 126: 63; 1996) beschreibt besonders die makroskopischen Merkmale von *Diatrypella angulata*, welche anscheinend auf *Fagus* spezialisiert ist. Die meisten anderen Autoren stellen derzeit *D. angulata* als Synonym zu *D. verruciformis*.
- Diatrypella quercina** (Pers.: Fr.) Cooke, auf *Quercus robur* L. oder *Qu. petraea* (Matt.) Liebl. (abgestorbene Äste), ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, Stattegg, Falschgraben, 550-600 m alt., 47°08'N/15°25'E, GF 8858/4; bewaldete Bachschlucht, 06.09.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, TROM, WSP
- Didymella caricis** H. Syd., auf *Carex sylvatica* Huds. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Oberösterreich, S von Steyr, Rücken des Damberges, ca. 750 m alt., 47°59'N/14°26'E, GF 8052/2; feuchter Wegrand an *Picea abies*-Forst, 30.08.1981, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Didymella caricis** H. Syd., auf *Carex pseudocyperus* L. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, ca. 18 km S von Graz, Kaiserwald, Teichgraben bei Wundschuh, zwischen Ponigl-Teich und Wundschuh-Teich, ca. 330 m alt., 46°55'N/15°26'E, GF 9058/4; sumpfige Lichtung zwischen Bruchwald-Resten, 28.05.1992, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Didymella proximella** (P. Karst.) Sacc., auf *Schoenoplectus tabernaemontani* (C. C. Gmel.) Palla (abgestorbene, vorjährige Halme), SCHWEDEN, Bohuslän, Koster-Archipel, Insel Nord-Koster (58°54'N/11°00'E) WSW von Strömstad; Tümpel in den Küstenfelsen, 13.06.1990, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Didymella proximella** (P. Karst.) Sacc., auf *Carex paleacea* Wahlenb. (abgestorbene, vorjährige Blätter), SCHWEDEN, Bohuslän, Koster-Archipel, Insel Sör-Koster (58°53'N/11°01'E) SW von Strömstad, Halbinsel „Nästängen“ S von Ekenäs; Salzwiese an der Küste, 10.06.1990, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Didymella proximella** (P. Karst.) Sacc., auf *Carex vacillans* Drej. (abgestorbene, vorjährige Blätter), SCHWEDEN, Bohuslän, Koster-Archipel, Insel Sör-Koster (58°53'N/11°01'E) SW von Strömstad, Halbinsel „Nästängen“ S von Ekenäs; Salzwiese an der Küste, 10.06.1990, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Didymella proximella** (P. Karst.) Sacc., auf *Carex nigra* (L.) Reichard (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Oberösterreich, südliche Umgebung von Steyr, S-Hang des Damberges, 600-700 m alt., 47°59'N/14°26'E, GF 8052/2; sumpfige Wiese mit Rinsalen, 20.04.1981, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Didymella proximella** (P. Karst.) Sacc., auf *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Wölzer Tauern, Sölkpaß, beim *Pinus mugo*-Bestand NW unterhalb der Hornfeldspitze, ca. 2020 m alt., GF 47°16'N/14°05'E, GF 8750/2; kleines Moor mit *Eriophorum vaginatum*, 05.07.1989, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia davalliana** B. Hein & Scheuer (PARATYPUS), in Sydowia 38: 128 (1986), auf *Carex davalliana* Sm. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Kärnten, Nockberge, ca. 5,5 km NNE vom Rosennock, Leobengraben, kurz W vom Wirtshaus „Steiger Hütte“, ca. 1480 m alt., 46°55'N/13°44'E, GF 9048/3; Bachufer, 12.07.1982, leg. Ch. Scheuer, det. B. Hein (Berlin, 1984). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia emergens** (P. Karst.) B. Hein sensu lato, auf *Carex firma* Mygind (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Niederösterreich, Nördliche Kalkalpen, Hochschneeberg, Hänge

- vom Bahnhof Hochschneeberg auf den Waxriegel, 1800-1885 m alt., 47°45'N/15°49'E, GF 8260/2; *Caricetum firmae*, 19.08.1990, leg. A. Nograsedk, W. Pongratz & K. Waltl, det. A. Nograsedk. Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia emergens** (P. Karst.) B. Hein, auf *Juncus effusus* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Kärnten, Kreuzeck-Gruppe, Tal des Gnoppnitzbaches N von Greifenburg, ca. 1400-1500 m alt., 46°48'N/13°10'E, GF 9145/3; feuchter Wegrand, 19.08.1981, leg. Ch. Scheuer, det. J. A. Nannfeldt (Uppsala, 1982). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia emergens** (P. Karst.) B. Hein, auf *Juncus effusus* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölk-Tal S von Gröbming, im Tal des Schwarzensee-Baches, im Bereich der Sachersee-Alm, ca. 1050 m alt., 47°20'N/13°54'E, GF 8649/3; kleines Hochmoor, 17.07., 19.07.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia emergens** (P. Karst.) B. Hein, auf *Juncus effusus* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölk-Tal S von Gröbming, Umgebung des Schwarzensees, ca. 1170 m alt., 47°17'N/13°52'E, GF 8749/1, 17.07.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia emergens** (P. Karst.) B. Hein, auf *Juncus effusus* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Koralpe, Garanas ca. 8 km WNW von Schwanberg, Garanaser Hochmoor (Torfstich), ca. 1300 m alt., 46°46'N/15°05'E, GF 9256/2; feuchtes Ruderal, 08.06.1981, leg. Ch. Scheuer, det. B. Hein (Berlin, 1984). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia emergens** (P. Karst.) B. Hein, auf *Juncus monanthos* Jacq. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Totes Gebirge, ca. 6 km N vom Grundlsee, knapp unterhalb vom Jagdhaus Wildensee (Wildenseehütte), ca. 1500 m alt., 47°42'N/13°51'E, GF 8249/3, 09.08.1982, leg. Ch. Scheuer, det. B. Hein (Berlin, 1984). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia exigua** (Desm.) B. Hein, auf *Juncus subnodulosus* Schrank (abgestorbene, vorjährige Halme), DEUTSCHLAND, Oberbayern, Kr. Starnberg, S von Pöcking a. Starnberger See (47°58'N/11°17'E), am Rande des Wielinger Waldes; Flachmoor, 30.07.1967, leg. J. Poelt, det. E. Müller. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia seriata** (Lib.) B. Hein, auf *Carex alba* Scop. (abgestorbene, vorjährige Blätter und Blattspitzen), ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Rannach-Massiv N von Graz, W-Abhang des Marxen-Kogels, ca. 750 m alt., 47°09'N/15°23'E, GF 8858/1; trockener Wald mit viel *Pinus sylvestris*, 07.04.1989, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia seriata** (Lib.) B. Hein, auf *Carex alba* Scop. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Rannach-Massiv N von Graz, W-Abhänge des Geierkogels, ca. 800 m alt., 47°10'N/15°23'E, GF 8858/1, 05.06.1986, leg. J. Poelt & P. Zwetko, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Diplonaevia seriata** (Lib.) B. Hein, auf *Carex humilis* Leys. (abgestorbene Blätter), ITALIEN, Prov. Trieste, Karst, Doine von Borgo, „Grotta gigante“, ca. 250 m alt., 27.04.1984, leg. P. L. Nimis & J. Poelt, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Durella atrocyanea** (Fr.) Höhn., auf entrindetem Holz von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Niederösterreich, Baden b. Wien, Aufstieg zur Ruine Rauheneck, ca. 300 m alt., 48°00'N/16°12'E, GF 7963/3; wärmebegünstigter Laubmischwald mit *Pinus nigra*, 29.11.1992, leg./det. Ch. Scheuer. Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Durella melanochlora** (Sommerf.) Rehm, auf entrindetem Holz von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland N von Graz, 1,7 km S von Semriach, Tal des Glettbaches E vom „Alten Sandwirt“ (Seitengraben des Rötschbaches), ca. 580 m alt., 47°12'N/15°24'E, GF 8758/3; *Fagus sylvatica*-Bestand am Hang, 20.01.1991, leg. M. Magnes & Ch. Scheuer, det. M. Magnes. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Erysiphe convolvuli** DC., auf *Calystegia sepium* (L.) R. Br., ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, Bez. Geidorf, Herdergasse, ca. 365 m alt., 47°04'N/15°27'E, GF 8958/2; an einem Gartenzaun, 08.1995, leg. A. Wilfling & N. Hoffmann, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Eudarluca caricis** (Fr.) O. Erikss., auf *Puccinia urticata* F. Kern var. *urticae-vesicariae* (Kleb.) Zwetko, auf *Carex vesicaria* L. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, WNW von Mureck, N von Straß, Rabenhofteiche ca. 2 km E von Wagendorf, ca. 270 m alt., 46°45'N/15°38'E,

- GF 9259/2; Großseggen-Ried, 05.06.1980, 19.06.1982, leg./det. Ch. Scheuer. Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Eutypa lata** (Pers.: Fr.) Tul. & C. Tul., auf abgestorbenem, berindetem Laubholz-Ast, ÖSTERREICH, Steiermark, Salzkamm S von Mariazell, am Wanderweg durch die Salzkamm, ca. 800 m alt., 47°45'N/15°19'E, GF 8257/2; montaner Mischwald über Kalk, 20.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Eutypa lata** (Pers.: Fr.) Tul. & C. Tul., auf entrindetem Laubholz, ÖSTERREICH, Steiermark, Salzkamm S von Mariazell, am Wanderweg durch die Salzkamm, ca. 800 m alt., 47°45'N/15°19'E, GF 8257/2; montaner Mischwald an einem steilen Hang über Kalk, 09.08.1992, leg. Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Eutypa lata** (Pers.: Fr.) Tul. & C. Tul., auf abgestorbenen Ästen von *Lonicera xylosteum* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Salzkamm bei Mariazell, Wanderweg durch die Salzkamm, im Bereich des Kreuzberglis, ca. 800 m, ca. 47°45'N/15°20'E, GF 8258/1; montaner Mischwald über Kalk, 30.07.1994, leg. Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Eutypa lata** (Pers.: Fr.) Tul. & C. Tul., auf Faulholz von *Acer pseudoplatanus* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, Stattegg, Falschgraben, 550-600 m alt., 47°08'N/15°25'E, GF 8858/4; bewaldete Bachschlucht, 25.09.1991, leg. Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Eutypa maura** (Fr.: Fr.) Fuckel, Syn. *Eutypa acharii* Tul. & C. Tul., auf Faulholz von *Acer pseudoplatanus* L., ÖSTERREICH, Oberösterreich, W von Steyr, Auen der Steyr bei Rosenegg, 300-310 m alt., 48°02'N/14°22'E, GF 7952/3; Auwald mit zahlreichen Pflanzen der Montanstufe über kalkreichem Flußschotter, 14.09.1985, leg. Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Eutypa maura** (Fr.: Fr.) Fuckel, Syn. *Eutypa acharii* Tul. & C. Tul., auf entrindetem Faulholz von *Acer pseudoplatanus* L., ÖSTERREICH, Oberösterreich, Steyr, Damberg ca. 4 km S von Steyr, W-Abhang des Damberges E der Ortschaft Sand, 500-600 m alt., ca. 47°59'N/14°25'E, GF 8052/2; Fagelum sylvaticae mit *Carex pilosa* über Flysch-Sandstein, 10.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Eutypa maura** (Fr.: Fr.) Fuckel, Syn. *Eutypa acharii* Tul. & C. Tul., auf entrindetem Faulholz von *Acer pseudoplatanus* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Oststeirisches Hügelland, Breitenfeld a. d. Rittschein (47°01'N/15°57'E), ca. 3,5 km NNE von Riegersburg, GF 8961/4, 04.05.1996, leg. H. Kahr & W. Maurer, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Eutypa dissepta** (Fr.: Fr.) Rappaz, auf abgestorbenen Ästen von *Ulmus* spec., ÖSTERREICH, Vorarlberg, Rheintal, SW von Meiningen, „Rote Au“ zwischen Ill und Spirsbach, ca. 430 m, 47°17'N/9°33'E, GF 8723/1; Auwald-Reste mit *Picea abies*-Aufforstungen, 05.09.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Eutypella scoparia** (Schw.: Fr.) Ellis & Everh., auf abgestorbenen Ästen von *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, ÖSTERREICH, Steiermark, Bad Radkersburg, Auwälder der Mur S von Laafeld, ca. 205 m alt., 46°40'N/16°00'E, GF 9362/1, 22.02.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- ***Eutypella scoparia** (Schw.: Fr.) Ellis & Everh., auf abgestorbenen Ästen von *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, ÖSTERREICH, Steiermark, Bad Radkersburg, Auwälder der Mur S von Laafeld, ca. 205 m alt., 46°40'N/16°00'E, GF 9362/1, 22.02.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Anm.:** Diese beiden Proben von *Eutypella scoparia* stammen vom selben Fundort, jedoch nicht aus derselben Aufsammlung.
- Eutypella scoparia** (Schw.: Fr.) Ellis & Everh., auf abgestorbenen Ästen von *Robinia pseudacacia* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Bad Radkersburg, Auwälder der Mur S von Laafeld, ca. 205 m alt., 46°40'N/16°00'E, GF 9362/1, 22.02.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- ***Eutypella scoparia** (Schw.: Fr.) Ellis & Everh., auf abgestorbenen Ästen von *Robinia pseudacacia* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Bad Radkersburg, Auwälder der Mur S von Laafeld, ca. 205 m alt., 46°40'N/16°00'E, GF 9362/1, 22.02.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Anm.:** Diese beiden Proben von *Eutypella scoparia* stammen vom selben Fundort, jedoch nicht aus derselben Aufsammlung.

- Eutypella sorbi** (Alb. & Schw.: Fr.) Sacc., auf abgestorbenen Ästen von *Sorbus aria* (L.) Cr., ÖSTERREICH, Steiermark, Salzkamm S von Mariazell, am Wanderweg durch die Salzkamm, ca. 800 m, ca. 47°45'N/15°19'E, GF 8257/2; montaner Mischwald an einem steilen Hang über Kalk, 30.07.1994, leg. Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Eutypella sorbi** (Alb. & Schw.: Fr.) Sacc., auf abgestorbenen Ästen von *Sorbus aucuparia* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Wechselgebiet, ca. 7 km NW von Friedberg, Schlucht bei der „Neuen Glas-hütte“ (47°29'N/15°59'E), SW von Mönichkirchen, ca. 1000 m alt., GF 8561/2, 03.12.1994, leg. W. Maurer, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Ganoderma australe** (Fr.) Pat., Syn. *G. europaeum* Stey., Syn. *G. adpersum* (S. Schulzer) Donk, auf *Aesculus hippocastanum* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, im Stadtpark, ca. 365 m alt., 47°04'N/15°26'E, GF 8958/2; auf einem lebenden, alten Stamm, ca. 0,5 m über dem Boden, 28.02.1974, leg./det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, WSP
- Gloeocystidium subcoroniferum** Litschauer „n. sp.“, auf Holz von *Populus tremula* L., SCHWEDEN, Sudermannia, [Stockholm.] Nacka, zwischen Källtorp und Saltsjö-Duvnäs, 28.05.1922, leg. L. Romell, det. V. Litschauer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
Anm.: In den bisher herangezogenen Standardwerken konnte dieses Taxon nicht gefunden werden. Es ist daher unsicher, ob es sich hier um Typusmaterial handelt oder *Gloeocystidium subcoroniferum* eine nomen nudum ist.
- Graddonia coracina** (Bres.) Dennis, auf Faulholz von *Alnus viridis* (Chaix) DC. im Bach, ÖSTERREICH, Tirol, Ötztal, Untergurgl, unterste E-exponierte Abhänge der Sonnbergalm, W oberhalb von Dreihäusern, ca. 1800 m alt., 46°53'N/11°02'E, GF 9132/1; kleiner Wildbach, 24.08.1991, leg. Ch. Scheuer, A. Nogrask & W. Pongratz, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/ Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Graphiola phoenicis** (Moug.) Poit., auf *Phoenix canariensis* Hort. ex J. B. Chabeau (cult.), ÖSTERREICH, Steiermark, Zeltweg (47°11'N/14°45'E); auf einer Topfpflanze, 29.05.1996, leg. H. Melzer, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Helvella lacunosa** Afzel. ex Fr., DEUTSCHLAND, Bayern, Regierungsbez. Schwaben, Landkr. Aichach-Friedberg, Forst „Höglwald“ bei Ried, ca. 540 m alt., 48°17'N/11°05'E; zwischen Fallaub von *Fagus sylvatica*, 03.10.1995, leg./det. S. Raidl. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Heptameria uncinata** Rehm, auf *Artemisia vulgaris* L. (abgestorbene, vorjährige Stengel), ÖSTERREICH, Steiermark, ca. 2,5 km N von Judenburg, 2 km S von Fohnsdorf, Wasendorf, über dem Nordufer der Pöls, ca. 730 m alt., 47°11'N/14°40'E, GF 8754/3; trockene Konglomerat-Abbrüche, 16.07.1989, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Hericium coralloides** (Scop.: Fr.) Pers., Syn. *Hericium alpestre* Pers., auf *Abies alba* Mill., ÖSTERREICH, Steiermark, Salzkammergut, Altaussee (47°38'N/13°46'E), 10.1974. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Hohenbuehelia unguicularis** (Fr.: Fr.) O. K. Miller, + *Mytilinidion tortile* (Schw.) Ellis & Everh., auf Borke von *Juniperus macrocarpa* Sibth. & Sm., ITALIEN, Sardinien, Prov. Cagliari, an der Küste NNE von Buggerru, ca. 2 km S von Portixeddu, ca. 5-15 m alt.; Dünenvegetation, 02.05.1986, leg. Ch. Scheuer, det. A. Hausknecht (1997). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Hymenoscyphus fagineus** (Pers.: Fr.) Dennis, auf Cupulen von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, Stattegg, Falschgraben, 550-600 m alt., 47°08'N/15°25'E, GF 8858/4; bewaldete Bachschlucht, 25.09.1991, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Hymenoscyphus scutula** (Pers.) W. Phillips var. *scutula*, auf *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. (vorjährige, abgestorbene Stengel), ÖSTERREICH, Steiermark, Rottenmanner Tauern, Pöstal S von St. Johann a. Tauern, ca. 1015 m alt., 47°20'N/14°28'E, GF 8652/4; sumpfiges Bachufer mit *Alnus incana*, *Cirsium oleraceum*, *Carex paniculata*, *Scirpus sylvaticus*, 23.09.1984, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Hypoxylon cercidicolum** (Berk. & M. A. Curtis ex Peck) Y.-M. Ju & J. D. Rogers, Syn. *Hypoxylon moravicum* Pouzar, auf *Fraxinus excelsior* L. (abgestorbene, berindete Äste), ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, Bez. Maria Trost, N-Abhänge des Kirchkogels, 430-470 m alt., 47°06'N/15°29'E, GF 8858/4; schattiger Mischwald mit viel *Carpinus betulus* und *Fraxinus excelsior*, 04.09.1994,

leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP

Anm.: Wie bei den meisten anderen Funden von *Hypoxylon cercidicum* aus der Steiermark sind auch die Stromata dieser Aufsammlung steril.

Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr., auf abgestorbenen Ästen von *Corylus avellana* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Steirisches Randgebirge, Teigtischgraben S von Voitsberg, am orographisch rechten Ufer der Teigtisch, kurz unterhalb der Langmann-Sperre, ca. 620 m alt., 46°59'N/15°06'E, GF 9056/2; bewaldete Bachschlucht, 08.08.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, TROM, WSP

Hysterium pulicare Pers.: Fr., auf Borke von *Quercus robur* L. oder *Qu. petraea* (Matt.) Liebl., ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, Stattegg, Falschgraben, 550-600 m alt., 47°08'N/15°25'E, GF 8858/4; bewaldete Bachschlucht, 06.09.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP

Hysteronaevia clavulifera Nannf., + *Clathrospora heterospora* (De Not.) Wehm. und anderen Kleinpilzen, auf *Juncus jacquini* L. (abgestorbene, vorjährige Blätter und Stengel), ÖSTERREICH, Tirol, Ötztaler Alpen, ca. 3,5 km SSE von Obergurgl, im Rotmoostal etwa auf halbem Wege zwischen dem Gletscher-Vorfeld des Rotmoosferners und der Schönwieshütte, ca. 2300 m alt., 46°50'N/11°02'E, GF 9132/3; alpiner Rasen an SW-exponiertem Hang, 23.08.1991, leg. Ch. Scheuer, A. Nogrask & W. Pongratz, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP

***Hysteronaevia clavulifera** Nannf., + *Clathrospora heterospora* (De Not.) Wehm., auf *Juncus jacquini* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Tirol, Ötztaler Alpen, ca. 3,5 km SSE von Obergurgl, im Rotmoostal etwa auf halbem Wege zwischen dem Gletscher-Vorfeld des Rotmoosferners und der Schönwieshütte, ca. 2300 m alt., 46°50'N/11°02'E, GF 9132/3; alpiner Rasen an SW-exponiertem Hang, 23.08.1991, leg. Ch. Scheuer, A. Nogrask & W. Pongratz, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP

Anm.: Diese beiden Proben von *Hysteronaevia clavulifera* stammen vom selben Fundort, jedoch von verschiedenen Beständen der Wirtspflanze.

Hysteronaevia clavulifera Nannfeldt (PARATYPUS), in Nordic J. Bot. 4: 234 (1984), auf *Juncus jacquini* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Kärnten, westliche Karnische Alpen, Gebiet des Monte Peralba (Hochweißstein), am Weg vom Hochweißstein-Haus zum Hochalpl-Joch (P. d. Oregone), 2100 m alt., 46°38'N/12°44'E, GF 9342/3; Caricetum ferrugineae über Kalk, 15.07.1981, leg. Ch. Scheuer, det. J. A. Nannfeldt (Uppsala, 1982). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP

Anm: Erster zentraleuropäischer Fund!

Hysteronaevia scirpina (Peck) Nannf., auf *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman (abgestorbene, vorjährige Halme), DEUTSCHLAND, Bayern, Wildseefilz bei Peustelsau, W von Bad Kohlgrub, ca. 900 m alt., 47°40'N/10°57'E, GF 8331/2; Moor mit *Pinus mugo* ssp. *uncinata*, 29.08.1987, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP

Hysteronaevia stenospora Nannf., + *Hysteropeziza* aff. *pusilla* B. Hein & Scheuer, *Hysteropezizella subsessilis* (Rehm) Nannf., vereinzelt *Hysteronaevia scirpina* (Peck) Nannf., auf *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman (vorjährige, abgestorbene Halme), SCHWEIZ, Kt. Graubünden, Rhätische Alpen, Albula-Paß, am Aufstieg von der Paßstraße zur Fuorcla Crap alv, 2050-2300 m alt., 25.08.1980, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP

Anm.: Die winzigen, ± oberflächlich dem Substrat aufsitzenden Apothecien von *Hysteronaevia stenospora* und *Hysteropeziza* aff. *pusilla* sind unter dem Stereomikroskop nicht verlässlich unterscheidbar. Auch die größeren, aus dem Substrat hervorbrechenden Apothecien von *Hysteronaevia scirpina* und *Hysteropezizella subsessilis* ähneln einander im Habitus sehr stark.

Hysteronaevia stenospora Nannfeldt (ISOTYPUS), in Nordic J. Bot. 4: 246 (1984), auf *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Wölzer Tauern, ca. 9 km SE von Donnersbach, Umgebung der Planneralpe, Plannerkessel, beim Kothütensee, 1750-1800 m alt., 47°23'N/14°11'E, GF 8651/1; Moor mit *Pinus mugo*, 25.08.1981, leg. Ch. Scheuer, det. J. A. Nannfeldt (Uppsala, 1982). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP

Hysteronaevia stenospora Nannf., auf *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Wölzer Tauern, ca. 9 km S von Donnersbachwald, am Aufstieg von der Seifriedalm auf die Gamskarspitze, ca. 2050 m alt., 47°18'N/14°08'E, GF 8650/4;

- Kar mit kleinen Lacken, 16.08.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Hysteroaevia stenospora** Nannf., auf *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Wölzer Tauern, ca. 9,5 km SSE von Donnersbachwald, kurz N der Idlereckscharte, SW unterhalb vom Alker, ca. 2050 m alt., 47°18'N/14°09'E, GF 8650/4; Kar mit kleinen Lacken, 15.08.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Hysteropeziza pusilla** B. Hein & Scheuer (ISOTYPUS), in Sydowia 38: 134 (1986), auf *Carex brizoides* L. (vorjährige, z. T. noch grüne Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland N von Graz, Pailgraben E von Gratkorn, ca. 420 m alt., 47°07'N/15°22'E, GF 8858/3; *Alnus*-Bestand am Bachufer, 11.05.1981, leg. Ch. Scheuer, det. B. Hein (Berlin, 1984). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Hysteropezizella diminuens** (P. Karst.) Nannf., auf *Carex atrata* L. (vorjährige, abgestorbene Blätter), ÖSTERREICH, Kärnten, östliche Karnische Alpen, am Aufstieg vom Lom-Sattel zum Osternig (Oisternig), 1700-1800 m alt., 46°33'N/13°29'E, GF 9446/2, 15.07.1980, leg. Ch. Scheuer, det. B. Hein (Berlin, 1982). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Hysteropezizella phragmitina** (P. Karst. & Starbäck) Nannf., auf *Carex rostrata* Stokes ex With. (vorjährige, abgestorbene Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, Ramsau am Dachstein, Schildlehen, 2 km W von Ramsau-Ort, Moor unterhalb vom Rittiserwald (Rittissberg), 1180 m alt., 47°25'N/13°37'E, GF 8547/4, 17.08.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- *Hysteropezizella phragmitina** (P. Karst. & Starbäck) Nannf., auf *Carex rostrata* Stokes ex With. (vorjährige, abgestorbene Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, Ramsau am Dachstein, Schildlehen, 2 km W von Ramsau-Ort, Moor unterhalb vom Rittiserwald (Rittissberg), 1180 m alt., 47°25'N/13°37'E, GF 8547/4, 17.08.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Anm.:** Die beiden oben angeführten Aufsammlungen von *Hysteropezizella phragmitina* stammen vom selben Fundort, jedoch von verschiedenen Beständen der Wirtspflanze.
- Hysteropezizella phragmitina** (P. Karst. & Starbäck) Nannf., auf *Carex rostrata* Stokes ex With. (vorjährige, abgestorbene Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölk-Tal S von Gröbming, ca. 2 km S vom Schwarzensee, Lemperkar-See, 1828 m alt., 47°16'N/13°52'E, GF 8749/1; *Carex rostrata*-Ried im Verlandungsbereich, 17.07.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Hysteropezizella subsessilis** (Rehm) Nannf., + vereinzelt *Hysteroaevia scirpina* (Peck) Nannf., auf *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman (vorjährige, abgestorbene Halme), SCHWEIZ, Kt. Graubünden, Rhätische Alpen, Albula-Paß, am Aufstieg von der Paßstraße zur Fuorcla Crap alv, 2050-2300 m alt.; anmoorige Stelle, 25.08.1980, leg. Ch. Scheuer, det. J. A. Nannfeldt (Uppsala, 1982). – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Hysteropezizella subsessilis** (Rehm) Nannf., + *Hysteroaevia scirpina* (Peck) Nannf., auf *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartman (vorjährige, abgestorbene Halme), ÖSTERREICH, Steiermark, Ramsau am Dachstein, Schildlehen, 2 km W von Ramsau-Ort, Moor unterhalb vom Rittiserwald (Rittissberg), 1180 m alt., 47°25'N/13°37'E, GF 8547/4, 17.08.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Anm.:** *Hysteroaevia scirpina* und *Hysteropezizella subsessilis* ähneln einander im Habitus so stark, daß es unmöglich ist, die beiden Arten beim Aufteilen und Sortieren von Exsiccatenmaterial unter dem Stereomikroskop verlässlich zu trennen.
- Incrucipulum ciliare** (Schrad.: Pers.) Baral in Baral & Kriegist., auf *Quercus robur* L. oder *Qu. petraea* (Matt.) Liebl. (vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, Stubalpe, SW von Köflach, Graben des Frei-Gößnitz-Baches W vom Hanselwirt, ca. 800 m alt., 47°02'N/15°03'E, GF 8956/3; feuchte Böschung, 26.09.1985, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Kirschsteiniothelia aethiops** (Berk. & M. A. Curtis) D. Hawksw., auf Faulholz von cf. *Carpinus betulus* L., ÖSTERREICH, Steiermark, E von Leibnitz, ca. 3 km N von Lipsch, im Bereich des Schweinsbaches N von Sulzegg, 290-300 m alt., 46°47'N/15°40'E, GF 9260/1; Laubmischwald mit *Alnus glutinosa*, *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, 07.09.1994, leg. W. Maurer, Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP

- Lachnellula occidentalis** (G. G. Hahn & Ayers) Dharne, auf einer kleinen, ganz abgestorbenen *Larix decidua* Mill. (cult.), POLEN, Ost-Karpaten, Bieszczady-Gebirge, Bieszczady-Nationalpark, am Aufstieg von Wolosate zum Tarnica, 980-1030 m. alt., geforstete Bestände von *Larix decidua* und *Picea abies*, 12.07.1993, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Lachnum clavisorum** (Mouton) J. H. Haines, auf *Juncus cf. effusus* L. (vorjährige, abgestorbene Halme), DEUTSCHLAND, Rheinland-Pfalz, Hoher Westerwald, „Klebsand“ bei Elkenroth, Kaolin-grube, ca. 500 m alt., GF 5213/3, 23.10.1992, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Lachnum nudipes** (Fuckel) Nannf., auf Stengeln von *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., ÖSTERREICH, Burgenland, E von Güssing, an der Straße von Strem nach Güssing, SW von Urbersdorf, Feuchtwiese an der Strem, ca. 215 m alt., 47°03'N/16°21'E, GF 8964/1, 09.05.1992, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Lanzia echinophila** (Bull.: Fr.) Korf, Syn. *Rutstroemia echinophila* (Bull.: Fr.) Höhn., auf Cupulen von *Castanea sativa* Mill., ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, Bez. Geidorf, Reinerkogel, ca. 450 m alt., 47°05'N/15°26'E, GF 8958/2; Laubmischwald mit viel *Fagus sylvatica* und *Castanea sativa*, 27.08.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Lasiosphaeria strigosa** (Alb. & Schw.: Fr.) Sacc., auf Faulholz, ÖSTERREICH, Steiermark, Türritzer Alpen, 2 km E von Mariazell, Gem. Halltal, Seitental „Rechengraben“, beim Morzin-Denkmal, ca. 800 m alt., 47°48'N/15°21'E, GF 8158/3; Gebüsch an der Straße, 02.07.1991, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, TROM, WSP
- Lasiosphaeria strigosa** (Alb. & Schw.: Fr.) Sacc., auf Faulholz von *Acer pseudoplatanus* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Salztal, N-Ufer der Salza bei der Brücke zum Prolesgraben, ca. 6 km SW von Gußwerk, ca. 710 m alt., 47°42'N/15°14'E, GF 8257/3; Gehölzstreifen am Ufer, 21.07.1994, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Leptoglossum lobatum** (Pers.: Fr.) Ricken, auf Moosen (Fam. Amblystegiaceae), GRÖNLAND, West-Grönland, Disko, Bläsedal E von Godhavn (69°15'N/53°33'W), 08.1982, leg./det. J. Poelt. Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Leptotrichia verrucosa** (Wallr.) Schüeppe, auf *Galium boreale* L. (z. T. noch lebende Stengel und Blätter), DEUTSCHLAND, Bayern, Loisachtal, Pfrühlmoos S von Eschenlohe, ca. 650 m alt., ca. 47°33'N/11°09'E, GF 8432/2(?); auf einem Schuttkegel am E-Rand des Moores, 28.08.1987, leg. J. Poelt, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Lopadostoma gastrinum** (Fr.: Fr.) Traverso forma?, auf berindeten, abgestorbenen Ästen von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Steiermark, S von Feldbach, W-Abhang des Gleichenberger Kogels, im Bereich des Steinbruchs kurz N von Gleichenberg-Dorf, ca. 460 m alt., 46°53'N/15°54'E, GF 9161/1; Wälder mit *Quercus* und *Fagus sylvatica* über Basalt, an einem kleinen Graben, 26.02.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
Anm.: Vasilyeva & Scheuer (in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 126: 63; 1996, als *Lopadostoma spec. indet.*) wiesen auf die sehr kleinen Ascosporen dieser Sippe hin, welche beim vorliegenden Fund eng mit *Lopadostoma turgidum* (Pers.: Fr.) Trav. vergesellschaftet war (siehe dort).
- Lopadostoma turgidum** (Pers.: Fr.) Trav., auf berindeten, abgestorbenen Ästen von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Steiermark, S von Feldbach, W-Abhang des Gleichenberger Kogels, im Bereich des Steinbruchs kurz N von Gleichenberg-Dorf, ca. 460 m alt., 46°53'N/15°54'E, GF 9161/1; Wälder mit *Quercus* und *Fagus sylvatica* über Basalt, an einem kleinen Graben, 26.02.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Lophiostoma viridarum** Cooke, auf abgestorbenen Zweigen von *Cistus incanus* L., ITALIEN, Prov. Roma, SW von Rom, Tenuta di Caccia di Castel Porziano, 0-20 m alt.; niedere Macchie im Strandbereich, 08.05.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Lophium mytilinum** (Pers.: Fr.) Fr., auf Borke von cf. *Picea abies* (L.) Karsten, ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölkital S von Gröbming, Sachersee-Alm am Schwarzenseebech, ca. 1060 m alt., 47°20'N/13°53'E, GF 8649/3, 12.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Massaria anomia** (Fr.) Petr., Syn. *Aglaspora profusa* (Fr.) De Not., auf abgestorbenen Zweigen von *Robinia pseudacacia* L., ÖSTERREICH, Steiermark, kurz N von Ehrenhausen, am E-Ufer der Mur an der Straße nach Obervogau, ca. 250 m alt., 46°44'N/15°34'E, GF 9259/3; Auwald, 05.09.1996, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP

- Massaria inquinans** (Tode: Fr.) De Not., auf abgestorbenen Ästen von *Acer pseudoplatanus* L., ÖSTERREICH, Oberösterreich, Steyr, „Thaddlau“ zwischen dem Stadtteil „Ennsdorf“ und St. Ulrich b. Steyr, ca. 400 m, 48°01'N/14°26'E, GF 7952/4; Laubmischwald über Flysch-Sandstein, 09.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Massarina corticola** (Fuckel) L. Holm, auf entrindetem Treibholz von cf. *Alnus incana* (L.) Moench, ÖSTERREICH, Salzburg, Pinzgau, Nationalpark Hohe Tauern, Hollersbachtal, im Bereich der Leitneralm, am Bachlehrweg, ca. 1100 m alt., ca. 47°15'N/12°25'E, GF 8740/3; Mündungsbereich eines Seitenbaches, 10.08.1992, leg. Ch. Scheuer, det. A. Aptroot (Baarn, 1995). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Massarina corticola** (Fuckel) L. Holm, auf noch zähem Faulholz, ÖSTERREICH, Steiermark, S von Feldbach, W-Seite des Gleichenberger Kogels, im Bereich des Steinbruchs kurz N von Gleichenberg-Dorf, 340-460 m alt., 46°53'N/15°53'-54'E, GF 9161/1; Wälder mit *Quercus* und *Fagus sylvatica* über Basalt, 26.02.1995, leg. Ch. Scheuer, det. A. Aptroot (Baarn, 1995). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- ***Massarina corticola** (Fuckel) L. Holm, auf noch zähem Faulholz, ÖSTERREICH, Steiermark, S von Feldbach, W-Seite des Gleichenberger Kogels im Bereich des Steinbruchs kurz N von Gleichenberg-Dorf, 340-460 m alt., 46°53'N/15°53'-54'E, GF 9161/1; Wälder mit *Quercus* und *Fagus sylvatica* über Basalt, 26.02.1995, leg. Ch. Scheuer, det. A. Aptroot (Baarn, 1995). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Anm.:** Die beiden oben angeführten Proben von *Massarina corticola* stammen vom selben Fundort, jedoch aus verschiedenen Aufsammlungen.
- Melampsora allii-populina** Kleb., II auf Blättern von *Populus nigra* L., ÖSTERREICH, Niederösterreich, Wiener Becken, bei Wienerherberg (48°03'N/16°33'E), ca. 165 m alt., GF 7965/1; am Rand des Auwaldes, 19.06.1994, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Melampsora ribesii-viminalis** Kleb., II auf Blättern von *Salix viminalis* L., ÖSTERREICH, Niederösterreich, Wiener Becken, W von Wienerherberg (48°03'N/16°33'E), ca. 170 m alt., GF 7965/1; in einem feuchten Gebüsch, 23.09.1994, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Melanconis alni** Tul., auf abgestorbenen Zweigen von *Alnus viridis* (Chaix) DC., ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, 13 km SE von Schladming, 50-200 m W unterhalb der Preintaler Hütte am Steig zum Riesachsee, 1620 m alt., 47°18'N/13°48'E, GF 8648/4; an einem Bach, 02.09.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Melanconis thelebola** (Fr.) Sacc., Syn. *Pseudovalsella thelebola* (Fr.) Sacc., auf abgestorbenen Zweigen von *Alnus incana* (L.) Moench, ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölk-Tal S von Gröbmung, W-Ufer des Schwarzensees, 1170-1180 m alt., 47°17'N/13°52'E, GF 8749/1, 12.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, WSP
- Melanconis thelebola** (Fr.) Sacc., Syn. *Pseudovalsella thelebola* (Fr.) Sacc., auf abgestorbenen Zweigen von *Alnus incana* (L.) Moench, ÖSTERREICH, Steiermark, Salztal, Hochschwab, ca. 5 km WSW von Weichselboden, Antengraben SE von Gschöder, am Göttenbach, ca. 650 m alt., 47°38'N/15°06'E, GF 8356/4, 21.08.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, WSP
- Melogramma campylosporium** Fr., auf berindeten, abgestorbenen Ästen von *Carpinus betulus* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Poßruck, Heiligengeist-Klamm S von Leutschach, ca. 500 m alt., 46°38'N/15°28'E, GF 9358/4; bewaldete Bachschlucht mit *Acer pseudoplatanus*, *Fagus sylvatica*, *Fraxinus excelsior*, *Picea abies*, 10.08.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Melogramma campylosporium** Fr., auf berindeten, abgestorbenen Ästen von *Corylus avellana* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Poßruck, Heiligengeist-Klamm S von Leutschach, ca. 400-650 m alt., 46°37'-38'N/15°28'E, GF 9358/4; bewaldete Bachschlucht mit *Acer pseudoplatanus*, *Fagus sylvatica*, *Fraxinus excelsior*, *Picea abies*, 10.08.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Micropeziza verrucosa** (E. Müller) Nannf., auf *Carex sempervirens* Vill. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Kärnten, Kreuzeck-Gruppe, N von Greifenburg, ESE vom Kreuzeck, im Tal des Seebaches unterhalb der Feldner Hütte, ca. 1900 m alt., 46°49'N/13°08'E, GF 9144/4; einzelne

- Horste von *Carex sempervirens* am Wanderweg, 19.08.1981, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Microsphaera astragali** (DC.) Trev., auf *Astragalus glycyphyllos* L., ÖSTERREICH, Salzburg, östlicher Stadtrand von Salzburg, Aigen, „Aigner Park“, ca. 420 m alt., 47°47'N/13°05'E, GF 8244/2, 24.08.1892, leg. K. Fritsch, det. U. Braun (Halle/S., 1984). – Verteilt an/Distributed to: GZU, WSP
- Microsphaera viburni** (Duby) S. Blumer, auf Blättern von *Viburnum opulus* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Rasing S von Mariazell, an der Salza kurz E der Salzabücke, ca. 800 m alt., 47°45'N/15°18'E, GF 8257/2; Gebüsch am Ufer, 14.09.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Milesia vogesiaca** (P. Syd. & H. Syd.) Faull, II auf *Polystichum aculeatum* (L.) Roth, ÖSTERREICH, Steiermark, Poßbruck, Heiligengeist-Klamm S von Leutschach, 400-650 m alt., 46°37'-38'N/15°28'E, GF 9358/4; bewaldete Bachschlucht mit *Acer pseudoplatanus*, *Fagus sylvatica*, *Fraxinus excelsior* und *Picea abies*, 27.08.1985, leg./det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Mollisia cf. uda** (Pers.) Gillet, auf nassem, in einem Bach liegenden Faulholz, ÖSTERREICH, Steiermark, Koralpe, Reinischkogel, Gem. Greisendorf, Sommereben, nahe dem Gasthof Reinbacher, ca. 850 m alt., 46°56'N/15°11'E, GF 9057/3; Bach in einem montanen *Picea abies*-Wald, 14.07.1988, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Mollisia cf. uda** (Pers.) Gillet, auf nassem, in einem Bach liegenden Faulholz, ÖSTERREICH, Steiermark, Koralpe, 8,5 km WSW von Deutschlandsberg, an der orographisch linken Talseite der Schwarzen Sulm, kurz E vom Gehöft „Müllerbauer“, 1040-1080 m alt., 46°48'N/15°06'E, GF 9156/4; *Alnus incana*-Bestand mit Rinnsalen, 23.06.1991, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Mycosphaerella bulgarica** Petr., Syn. *Mycosphaerella alpina* Arx, auf *Carex curvula* All. (abgestorbene Blätter und Blattspitzen), ÖSTERREICH, Steiermark, Wölzer Tauern, ca. 4 km E von Donnersbachwald, E-Hänge des Schreinl, 2050-2150 m alt., 47°22'N/14°10'E, GF 8651/1, 07.1972, leg. J. Poelt, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Mycosphaerella bulgarica** Petr., Syn. *Mycosphaerella alpina* Arx, auf *Carex curvula* All. (abgestorbene Blätter und Blattspitzen), ÖSTERREICH, Steiermark, Koralpe, ca. 2 km NNE vom Großen Speikkogel, Hühnerstütze, ca. 1980 m alt., 46°48'N/14°59'E, GF 9155/4; windverfegte Rasen, 16.07.1983, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, TROM, WSP
- Mycosphaerella ephedrae** (Hollós) Arx, auf *Ephedra* spec. (abgestorbene Zweige), ITALIEN, Sardinien, Prov. Sàssari, an der Nordküste NE von Valledòria, Badesi Mare, 0-3 m alt., Strandvegetation, 06.05.1986, leg. J. Poelt, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Mycosphaerella hypostomatica** Höhn., auf *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilm. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, östliche Umgebung von Graz, nach Süden offener, bewaldeter Graben zwischen Hönigthal und Laßnitzhöhe, 480-500 m alt., 47°05'N/15°34'E, GF 8959/1, 13.06.1980, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Naeviella paradoxa** (Rehm) Clem., auf *Juncus trifidus* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Kärnten, westliche Karnische Alpen, Gebiet des Monte Peralba (Hochweißstein), Weg vom Öfnerjoch zur Raudenspitze, ca. 2040 m alt., 46°38'N/12°44'E, GF 9342/3, 14.07.1981, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Naeviopsis carneola** B. Hein & Nannfeldt [in Holm, L. & Nannfeldt, J. A.†] (1992), Fungi exsiccati Suecici praesertim Upsalienses, Fasc. 69, no. 3428], auf *Juncus filiformis* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), POLEN, W-Karpaten, östliche Hohe Tatra, Tatra-Nationalpark, am Weg vom Sattel „Przelec z Liliow“ in das Tal „Dolina Gasienicowa“, ca. 1600 m alt.; anmoorige Mulde im Pinetum mughi, 09.07.1993, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Navicella pileata** (Tode: Fr.) Fabre, Syn. *Lophiostoma excipuliforme* (Fr.) Ces. & De Not., auf Borke von *Populus nigra* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Murtal S von Leibnitz, Auwald bei Ehrenhausen, ca. 250 m alt., 46°44'N/15°34'E, GF 9259/3; gefällter Baum am Ufer der Mur, 04.04.1981, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, TROM, WSP
- Nectria cinnabarina** (Tode: Fr.) Fr., auf abgestorbenen Ästen von *Carpinus betulus* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, Stattegg, Falschgraben, 550-600 m alt., 47°08'N/15°25'E, GF 8858/4; bewaldete Bachschlucht, 06.09.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP

- Nectria coccinea** (Pers.: Fr.) Fr., auf abgestorbenen Ästen von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, Bez. Waltendorf, Waldstreifen zwischen dem Berliner Ring und der Rudolfstraße, 420 m alt., 47°04'N/15°29'E, GF 8958/2, 26.09.1993, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Nectria coccinea** (Pers.: Fr.) Fr., auf abgestorbenen Ästen von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Oberösterreich, ca. 4 km S von Steyr, Rücken des Damberges, E vom „Windloch“, ca. 700 m alt., 48°00'N/14°25'E, GF 7952/4; Fagetum *sylvaticae* mit *Carex pilosa* im Unterwuchs, Flysch-Sandstein, 10.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Nectria episphaeria** (Tode: Fr.) Fr., auf Stromata von *Quaternaria quaternata* (Pers.: Fr.) J. Schröt., auf abgestorbenen Ästen von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Oberösterreich, ca. 4 km S von Steyr, Rücken des Damberges, SSW der Laurenzikapelle, 740 m alt., 48°00'N/14°27'E, GF 7952/4; Waldrand mit *Quercus*, *Cerasus avium*, *Sorbus aucuparia*; Flysch-Sandstein, 10.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Nectria episphaeria** (Tode: Fr.) Fr., auf Stromata von *Diatrype stigma* (Fr.: Fr.) Ces. & De Not., auf abgestorbenen Ästen von cf. *Betula pendula* Roth, ÖSTERREICH, Oberösterreich, ca. 4 km S von Steyr, Rücken des Damberges, SSW der Laurenzikapelle, 740 m alt., 48°00'N/14°27'E, GF 7952/4; Waldrand mit *Quercus*, *Cerasus avium*, *Sorbus aucuparia*; Flysch-Sandstein, 10.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Nectria fuckeliana** C. Booth, auf abgestorbenen Ästen von *Picea abies* (L.) Karsten, ÖSTERREICH, Steiermark, Koralpe, Deutschlandsberg, an der Laßnitz bei der Brücke bei 497 m alt., 3 km NW der Burg Landsberg, 46°50'N/15°10'E, GF 9157/3; *Picea abies*-Aufforstung am Bach, 09.08.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Nectria purtonii** (Grev.) Berk., auf *Valsa* cf. *juniperina* Cooke, + *Banhegyia setispora* Zeller & Tóth, auf Zweigen von *Juniperus communis* L. ssp. *communis*, ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, „Langer Weg“ von Stattegg-Buch auf den Schöckl, im Bereich des Göstinger Forsthauses, ca. 1150 m alt., 47°11'N/15°26'E, GF 8858/2, 06.09.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Nectria purtonii** (Grev.) Berk., auf cf. *Winterella alnicola* (Höhn.) J. Read & C. Booth, auf Zweigen von *Ainus incana* (L.) Moench, ÖSTERREICH, Steiermark, Rasing S von Mariazell, an der Salza kurz E der Salzabücke, ca. 800 m alt., 47°45'N/15°18'E, GF 8257/2; Gehölzstreifen am Ufer, 20.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, WSP
- Neobarya parasitica** (Fuckel) Lowen, Syn. *Barya parasitica* Fuckel, auf *Bertia moriformis* (Tode: Fr.) De Not., auf entrindetem Faulholz von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Windische Bühel, Berghausen-Graßnitzberg, ca. 3 km SE von Ehrenhausen, ca. 350 m alt., 46°42'N/15°36'E, GF 9259/4; Laubmischwald mit *Fagus sylvatica*, *Quercus*, *Carpinus betulus*, *Castanea sativa*, 20.09.1996, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Nimborollisia eriophori** (Opiz) Nannf., Syn. *Niptera phaea* (Rehm) Rehm, auf *Carex sempervirens* Vill. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Kärnten, Koralpe, ca. 1,2 km NNE vom Großen Speikkogel, S der Hühnerstütze, westexponierte Abbrüche über dem Großen Kar, ca. 2000 m alt., 46°47'N/14°58'E, GF 9255/2; alpine Rasen, 16.07.1983, leg./det. Ch. Scheuer. Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Nimborollisia eriophori** (Opiz) Nannf., Syn. *Niptera phaea* (Rehm) Rehm, auf *Eriophorum angustifolium* Honck. (± im Wasser liegende, abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Kärnten, Nockberge, ca. 9 km NE von Radenthein, 3,5 km E vom Rosennock, Oswalder Bock WNW unterhalb vom Mallnock, 1920-1940 m alt., 46°52'N/13°45'E, GF 9148/2; Moore und Quellfluren am Bach, 11.07.1990, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Nimborollisia eriophori** (Opiz) Nannf., Syn. *Niptera phaea* (Rehm) Rehm, auf *Eriophorum angustifolium* Honck. (± im Wasser liegende, abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölk-Tal S von Gröbming, ca. 2 km S vom Schwarzensee, Lemperkar-See, 1828 m alt., 47°16'N/13°52'E, GF 8749/1; Moore an verlandeten Seeufer, 06.09.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP

- Nitschkia salvadorae* S. Ahmad (ISO-SYNTYPUS), in Petrak & Ahmad, Sydowia 8: 167 (1954), on decaying stems of *Salvadora oleoides* Decne., PAKISTAN, Ladhar, Sheikhpura, 14.09.1949, leg./det. S. Ahmad (# 2742). – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Obtectodiscus aquaticus* E. Müller, Petrini & Samuels, auf *Carex rostrata* Stokes ex With. (im Wasser flutende, abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölk-Tal S von Gröbming, ca. 2 km S vom Schwarzensee, Lemperkar-See, 1828 m alt., 47°16'N/13°52'E, GF 8749/1; *Carex rostrata*-Ried am Seeufer, 06.09.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Odontura raphidospora* (Rehm) Clem., Syn. *Beloniella raphidospora* (Rehm) Boud., auf Holz von cf. *Larix decidua* Mill., ÖSTERREICH, Kärnten, Kreuzeck-Gruppe, ca. 5 km NW von Greifenburg, am Weg von der Emberger Alm zum Ochsenörl, 1840-1900 m alt., 46°46'N/13°08'E, GF 9244/2; südseitige Hänge mit offenen, nassen Rasen, 15.07.1978, leg./det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Perichaena depressa* Lib., auf Rinde von Faulholz, ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, Rettenbach-Klamm W von Mariatrost, ca. 450 m alt., 47°06'N/15°28'E, GF 8858/4; bewaldete Bachschlucht, 25.09.1987, leg./det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Pezicula acericola* (Peck) Sacc., auf *Acer campestre* L. (abgestorbene, berindete Zweige), ÖSTERREICH, Steiermark, ca. 1 km NW von Gamlitz, Grubtal, bewaldeter NE-Hang N von Preßtal, 300-340 m alt., 46°43'N/15°32'E, GF 9259/3; Laubmischwald, 05.09.1996, leg./det. Ch. Scheuer. Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Pezicula livida* (Berk. & Broome) Rehm, auf *Larix decidua* Mill. (abgestorbene, berindete Äste), POLEN, Ost-Karpaten, Bieszczady-Gebirge, Pogorze Leskie, ca. 2 km ESE von Lesko, steile Fylschhänge zum Fluß San, ca. 550 m alt.; Bestand von *Fagus sylvatica* mit geforsteter *Larix decidua*, 13.07.1993, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Phaeosphaeria caricis-firmae* (Petr.) Leuchtm. & Schmid-Heckel, auf *Carex firma* Mygind (abgestorbene, vorjährige Blätter), ITALIEN, Friaul, westliche Karnische Alpen, Monte Peralba (Hochweilstein), 2500-2600 m alt., 46°37'N/12°43'E, GF 9342/3; Kalkfelspalten am Grat, 15.07.1981, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
Anm.: Nach einem Vergleich mit Petraks Typusmaterial in Herb. W ist sicher, daß er das typische Wandornament der reifen Ascosporen auf Grund seiner damaligen optischen Ausrüstung übersehen haben dürfte. Ansonsten entspricht der Pilz auch seiner Originalbeschreibung (Petrak, Sydowia 1: 315; 1947). Nogrask (Biblioth. Mycol. 133: 177; 1990) fand den Pilz auch auf *Carex atrata* L. Sowohl die Beschreibung, als auch die Abbildungen von Shoemaker & Babcock (Canadian J. Bot. 67: 1526; 1989) sprechen dafür, daß *Ph. caricis-firmae* und *Ph. exarata* Shoemaker & C. E. Babcock konzeptspezifisch sind. Das Substrat des Typus von *Ph. exarata* war *Carex sempervirens* Vill.
- Phaeosphaeria culmorum* (Auersw.) Leuchtm., auf *Carex hirta* L. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Oberösterreich, südliche Umgebung von Steyr, St. Ulrich, 450 m alt., 48°01'N/14°26'E, GF 7952/4; sumpfige Wiese, 21.04.1984, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Phaeosphaeria culmorum* (Auersw.) Leuchtm., auf *Juncus inflexus* L. (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Oberösterreich, südliche Umgebung von Steyr, St. Ulrich, 450 m alt., 48°01'N/14°26'E, GF 7952/4; sumpfige Wiese, 21.04.1984, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Phaeosphaeria culmorum* (Auersw.) Leuchtm., auf *Scirpus sylvaticus* L. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Oberösterreich, südliche Umgebung von Steyr, Garsten, bei der Brücke über den regulierten Mündungsbereich des Garstnerbaches beim Ennskraftwerk Garsten, beim Garstner Schwimmbad, 298 m alt., 48°01'N/14°24'E, GF 7952/3, 21.04.1984, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Phaeosphaeria epicalamia* (Riess) L. Holm, auf *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaud. (abgestorbene, vorjährige Halme), SCHWEIZ, Kt. Graubünden, Oberengadin, Val Arpiglia bei Zuoz (46°36'N/9°58'E), 1700-1900 m alt., lockerer Wald von *Larix decidua*, 27.08.1980, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Phaeosphaeria epicalamia* (Riess) L. Holm, auf *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaud., (abgestorbene, vorjährige Halme), ÖSTERREICH, Kärnten, westlicher Ausläufer der Kreuzeck-Gruppe, ca. 5 km E von Dölsach, Abstieg zur Hatz-Alm N vom Ederplan, ca. 1900 m alt., 46°49'N/12°54'E, GF 9143/3, subalpiner Wald von *Picea abies*, *Larix decidua* und *Pinus cembra*, 20.07.1983, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP

- Phaeosphaeria fuckelii** (Niessl) L. Holm, + *Phaeosphaeria sowerbyi* (Fuckel) L. Holm, auf *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla (abgestorbene Halme), TSschechien, Mähren, W von Mährisch-Weißkirchen (Hranice), Leipnik (Lipnik), am Ufer der Bečva, 05.1938, leg./det. F. Petrak. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Phellinus igniarius** (L.: Fr.) Quél., auf *Salix* spec., JUGOSLAWIEN, Montenegro, Umgebung von Andrijeva, an der Auffahrt zum Čakor-Paß, oberhalb des Dorfes Velika, ca. 1040 m alt., 13.07.1974, leg./det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, WSP
- Phyllosticta solidaginis-serotinae** Petr., auf *Solidago gigantea* Ait. (nekrotische Blattflecken), ÖSTERREICH, Voralberg, Feldkirch, kurz W von Götzis, kurz S von Kommingen, ca. 410 m alt., 47°20'N/9°37'E, GF 8623/4, Weidengebüsche und Schilfbestände an kleinen, stehenden Gewässern, 04.09.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Phytophthora cactorum** (Lebert & Cohn) J. Schröt., auf Keimlingen von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Koralpe, Laßnitzklause W von Deutschlandsberg, W unterhalb der Burg Landsberg, ca. 420 m alt., 46°48'N/15°12'E, GF 9157/3; Laubmischwald, 13.05.1995, leg. J. Hafellner & M. Magnes, det. J. Hafellner. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Pleospora herbarum** (Pers.: Fr.) Rabenh. ex Ces. & De Not., auf *Aster tripolium* L. (vorjährige, abgestorbene Stengel), SCHWEDEN, Bohuslän, Koster-Archipel SW von Strömstad, Insel Sör-Koster (58°53'N/11°01'E), 1 km SSW der Ortschaft Ekenäs, am Strand in unmittelbarer Nähe von „Bergdalen“; Salzwiese mit *Bolboschoenus maritimus*, 11.06.1990, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Pleospora herbarum** (Pers.: Fr.) Rabenh. ex Ces. & De Not., auf *Iris foetidissima* L. (vorjährige, abgestorbene Blätter bzw. Blattspitzen), ENGLAND, Devon, W von Barnstaple, auf einer Küstendüne in den Braunton Burrows (ordnance survey map reference SS 450 355), ca. 5 m alt., 13.03.1989, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Pleospora herbarum** (Pers.: Fr.) Rabenh. ex Ces. & De Not., auf abgestorbenen Zweigen von *Kerria japonica* (L.) DC. (cult.), ÖSTERREICH, Steiermark, Oststeirisches Hügelland, Riegersburg, in den Burganlagen, ca. 470 m alt., 47°00'N/15°56'E, GF 8961/4, 12.10.1993, leg./det. Ch. Scheuer. Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Pleospora herbarum** (Pers.: Fr.) Rabenh. ex Ces. & De Not., auf *Leymus arenarius* (L.) Hochst. (vorjährige, abgestorbene Blätter), SCHWEDEN, Bohuslän, Koster-Archipel SW von Strömstad, Insel Sör-Koster (58°53'N/11°01'E), S der Ortschaft Ekenäs, am Strand zwischen „Bergdalen“ und der Anlegestelle „Kilesands bryggan“, 10.06., 11.06.1990, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Pleospora herbarum** (Pers.: Fr.) Rabenh. ex Ces. & De Not., auf *Senecio jacobaea* L. (vorjährige, abgestorbene Stengel), ENGLAND, Devon, W von Barnstaple, auf einer Küstendüne in den Braunton Burrows (ordnance survey map reference SS 450 355), ca. 5 m alt., 13.03.1989, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Pleospora herbarum** (Pers.: Fr.) Rabenh. ex Ces. & De Not. **forma?** (z. T. parasitiert von einem Coelomyceten), auf *Pancratium illyricum* L. (vorjährige, abgestorbene Blätter), ITALIEN, Sardinien, Prov. Cagliari, Felsküste ca. 1,5 km N von Buggerru, ca. 30-50 m alt.; niedrige Macchie zwischen Kalkfelsen, 02.05.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Anm.:** Diese *Pleospora* hat für *P. herbarum* eigentlich zu große Ascosporen und erinnert damit eher an *P. triglochinicola* J. Webster, welche jedoch bisher nur auf *Triglochin maritimum* L. gefunden wurde.
- Polydesmia pruinosa** (Berk. & Broome) Boud., auf *Diatrype stigma* (Hoffm.: Fr.) Fr., auf Faulast von *Betula pendula* Roth, ÖSTERREICH, Kärnten, Nockgebiet, oberes Gurktal W von Weitensfeld, Braunsberg S von Kleinglödnitz, am Fuß der NE-Abhänge kurz W der Siedlung, ca. 790 m alt., 46°50'N/14°08'E, GF 9150/4; feuchte Wälder von *Picea abies*, mit *Betula pendula*, *Vaccinium* spp., *Sphagnum* spp., 27.08.1989, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Propolis versicolor** (Fr.) Fr., Syn. *Propolomyces versicolor* (Fr.) Dennis, Syn. *Propolis faginea* (Schrad.) P. Karst., auf entrindetem Laubholz, ITALIEN, Sardinien, Prov. Nuoro, Monte Arbo N von Ussassái, 950-1060 m alt.; *Quercetum ilicis* in einer Bachschlucht, 04.05.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Psilachnum acutum** (Velen.) Svrček, auf *Scipus sylvaticus* L. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, östliche Umgebung von Graz, SSE von St. Radegund, N von Kumberg,

- Graben beim Schloß Kainberg, ca. 550 m alt., 47°10'N/15°31'E, GF 8859/1, 24.05.1987, leg. J. Poelt, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Puccinia actaeae-agropyri** Ed. Fischer, Syn. *Puccinia recondita* Rob. ex Desm. sensu lato, I auf *Actaea spicata* L., ÖSTERREICH, Niederösterreich, Hohe Wand W von Wiener Neustadt, am Weg von Maierdorf hinauf zum Gasthof Postl, ca. 900 m alt., 47°49'N/16°02'E, GF 8162/3, 21.06.1984, leg./det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, WSP
- Puccinia adoxae** R. Hedw., III auf *Adoxa moschatellina* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Oststeirisches Hügelland, Raabtal, Altarm-Rest am orographisch linken Ufer der Raab, ca. 300 m W der Straße zwischen Lödersdorf und Leitersdorf, 270 m alt., 46°57'N/15°56'E, GF 9061/2; Unterwuchs eines Auwald-Restes, 28.04.1996, leg. M. Möslinger & E. Unger, det. M. Möslinger. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Puccinia allii** (DC.) Rudolphi, II, III auf *Allium* cf. *schoenoprasum* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, Bez. Geidorf, Botanischer Garten der Karl-Franzens-Universität, ca. 365 m alt., 47°04'N/15°27'E, GF 8958/2, 15.11.1994, leg. P. Zwetko, F. Steffan & Ch. Scheuer, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Puccinia asperulae-odoratae** Wurth, II auf *Galium odoratum* (L.) Scop., ÖSTERREICH, Steiermark, Oststeirisches Hügelland, Heiligenkreuz a. Waasen, an der Straße nach Prosdorf, ca. 350 m alt., 46°57'N/15°35'E, GF 9059/2; Mischwald, 22.08.1985, leg./det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, WSP
- Puccinia circumalpina** Zwetko (PARATYPUS), in Biblioth. Mycol. 153: 73 (1993), II, III auf *Carex alba* Scop. (an einer Stelle reichlich, ohne möglichen Haplophase-Wirt), ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Rannach-Massiv N von Graz, W-Hänge des Geierkogels, ca. 800 m alt., 47°10'N/15°23'E, GF 8858/1, 30.06.1985, leg. J. Poelt & P. Zwetko, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Puccinia cnici-oleracei** Pers. ex Desm., III auf *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill, ÖSTERREICH, Steiermark, Rottenmanner Tauern, im Tal der Gullung S von Oppenberg, kurz N vom „Schatterlehen“, 1080 m alt., 47°25'N/14°17'E, GF 8551/4; Hochstauden am Bach, 01.08.1983, leg. Ch. Scheuer, det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Puccinia komarovii** Tranzschel, I, II auf *Impatiens parviflora* DC., DEUTSCHLAND, Oberpfalz, Oberpfälzer Jura (Fränkische Alb) NNW von Regensburg, Buchenberg N von Parsberg, ca. 500 m alt., 13.06.1964, leg. Lau, Poelt & Oberwinkler, det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Puccinia liliacearum** Duby, III auf *Ornithogalum kochii* Pari., ÖSTERREICH, Burgenland, Leithagebirge, am W-Fuß des Zeilerberges, ca. 200 m alt., 47°58'N/16°45'E, GF 8066/2; Laubwald, 08.04.1995, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- cf. **Puccinia magnusiana** Koern., I auf *Ranunculus repens* L., ÖSTERREICH, Burgenland, N vom Neusiedler See, zwischen Neusiedl a. See und Jois, ca. 120 m alt., 47°57'N/16°48'E, GF 8066/2; Feuchtwiese, 14.05.1994, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Puccinia poarum** Nielsen, I auf *Tussilago farfara* L., ÖSTERREICH, Burgenland, Parndorfer Platte, ca. 5 km NNE von Parndorf, S von Neuhof, ca. 160 m alt., 48°02'N/16°53'E, GF 7967/3; Brachland, 18.05.1995, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Puccinia recondita** Rob. ex Desm. sensu lato, I auf *Anchusa officinalis* L., ÖSTERREICH, Burgenland, Galgenberg NE von Neckenmarkt, ca. 240 m alt., 47°36'N/16°33'E, GF 8365/3; Wegrand, 07.05.1994, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Puccinia retifera** Lindr., II, III auf Blättern von *Chaerophyllum bulbosum* L., ÖSTERREICH, Burgenland, Parndorfer Platte, N von Halbthurn (47°52'N/16°58'E), am Rand des Karlwaldes, ca. 150 m alt., GF 8167/2, 1984, leg. H. Melzer, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Puccinia silai** Fuckel, II, III auf Blättern von *Silaum silaus* (L.) Schinz & Thell., ÖSTERREICH, Burgenland, Leithagebirge, bei Bruck a. d. Leitha (48°01'N/16°46'E), W der Bildstockhöhe, ca. 160 m alt., GF 7966/4; Feuchtwiese, 06.08.1994, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Puccinia silai** Fuckel, III auf Blättern von *Silaum silaus* (L.) Schinz & Thell., ÖSTERREICH, Burgenland, bei Oggau am W-Ufer des Neusiedlersees, ca. 116 m alt., 47°50'N/16°40'E, GF 8166/3; Rand

- einer Wiese am Schilfgürtel, 17.10.1995, leg. H. Melzer, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Puccinia tinctoricola** Magnus, III auf *Serratula tinctoria* L., ÖSTERREICH, Niederösterreich, Wiener Becken, NE von Kaisersteinbruch, ca. 170 m alt., 47°59'N/16°42'E, GF 8066/1; feuchte Wiese, 25.09.1994, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Pyrenopeziza arctii** (W. Phillips) Nannf., auf *Arctium* spec. (abgestorbene, vorjährige Stengel), POLEN, Nida-Becken, Steppenreservat Skorocice, ca. 7 km SW von Busko, ca. 200 m alt., 50°26'N/20°41'E alt.; N-exponierter, staudenreicher Hangfuß, 07.07.1993, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Pyrenopeziza rigidae** (Nannf.) Défago, + *Hysteropezizella* spec., auf *Carex bigelowii* Torr. ex Schweinitz (abgestorbene, vorjährige Blätter), SCHWEDEN, Torne Lappmark, Jukkasjärvi sn: Felssturzbereich SE der Bahnstation von Vassijaure, entlang des Flusses Kärkejåkka, ca. 700 m alt., 68°25'N/18°19'E, 05.08.1980, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- *Pyrenopeziza rigidae** (Nannf.) Défago, + *Hysteropezizella* spec., auf *Carex bigelowii* Torr. ex Schweinitz (abgestorbene, vorjährige Blätter), SCHWEDEN, Torne Lappmark, Jukkasjärvi sn: Felssturzbereich SE der Bahnstation von Vassijaure, entlang des Flusses Kärkejåkka, ca. 700 m alt., 68°25'N/18°19'E, 05.08.1980, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Anm.:** Die beiden oben angeführten Proben von *Pyrenopeziza rigidae* stammen vom selben Fundort, jedoch aus verschiedenen Aufsammlungen.
- Pyrenophora ephemera** Crivelli, auf *Luzula alpino-pilosa* (Chaix) Breistr. (abgestorbene, vorjährige Blätter), SCHWEIZ, Kt. Graubünden, Rhätische Alpen, Dischma-Tal bei Davos, Dürrboden-Gletschboden, 2000-2100 m alt., zwischen Silikatblöcken, 26.08.1980, leg./det. Ch. Scheuer. Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Quaternaria quaternata** (Pers.: Fr.) J. Schröt., Syn. *Eutypella quaternata* (Pers.: Fr.) Rappaz, auf abgestorbenen Ästen von *Fagus sylvatica* L., ÖSTERREICH, Steiermark, E von Leibnitz, ca. 3 km N von Lipsch, im Bereich des Schweinsbaches N von Sulzegg, 290-300 m alt., 46°47'N/15°40'E, GF 9260/1; Laubmischwald mit *Alnus glutinosa*, *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, 07.09.1994, leg. W. Maurer, Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Ramularia anchusae** Massai., auf *Anchusa officinalis* L. (nekrotische Blattflecken), SCHWEDEN, Bohuslän, Koster-Archipel, Insel Nord-Koster (58°54'N/11°00'E) WSW von Strömstad; trockener Wegrand, 13.06.1990, leg. J. Poelt, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Ramularia arvensis** Sacc., auf *Potentilla recta* L. (nekrotische Blattflecken), ÖSTERREICH, Oberösterreich, Steyr, Fuchsluckengasse, ca. 320 m alt., 48°02'N/14°25'E, GF 7952/4; an einer trockenen Straßenböschung, 16.06.1996, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Ramularia atropae** Allesch., auf *Atropa bella-donna* L. (nekrotische Blattflecken), ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, Stattegg-Buch, SW-Abhänge der Erhart-höhe W vom Hohenberg, ca. 820 m alt., 47°09'N/15°26'E, GF 8858/2; an einer Forststraße, 30.09.1995, leg./det. Ch. Scheuer, conf. U. Braun. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Ramularia minutissima** (H. Syd.) U. Braun, auf *Hypericum maculatum* Cr. (nekrotische Blattflecken), ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, 13 km SE von Schladming, ca. 200 m W unterhalb der Preintaler Hütte, ca. 1620-1630 m, 47°18'N/13°48'E, GF 8648/4; Hochstauden und Zwergsträucher neben *Alnus viridis*; 02.09.1994, leg. Ch. Scheuer, M. Möslinger & Lar. N. Vasilyeva, det. U. Braun (1996). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Rhabdospora pleosporoides** Sacc., auf *Heracleum sphondylium* L. (abgestorbene, vorjährige Stengel), ÖSTERREICH, Steiermark, Rasing S von Mariazell, an der Salza kurz E der Salzabücke, ca. 800 m alt., 47°45'N/15°18'E, GF 8257/2; Kohldistel-Wiese am Ufer, 14.09.1995, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Rhamphoria pyriformis** (Pers.: Fr.) Höhn., auf cf. *Quercus robur* L. oder *Qu. petraea* (Matt.) Liebl. (Faulholz), ÖSTERREICH, Steiermark, S von Graz, Kaiserwald, Teichgraben bei Wundschuh, beim Neu-Teich, ca. 350 m alt., ca. 46°55'N/15°25'E, GF 9058/4; am Rand eines Bruchwald-ähnlichen

- Gehölzes, 19.11.1993, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Rhizodiscina lignyota** (Fr.) Hafellner, auf Faulholz, ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, Stattegg, Falschgraben, 550-600 m alt., 47°08'N/15°25'E, GF 8858/4; bewaldete Bachschlucht, 25.09.1991, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Silla ferruginea** (Pers.: Fr.) P. Karst., auf abgestorbenen Ästen von *Corylus avellana* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Koralpe, Deutschlandsberg, an der Laßnitz zwischen der Brücke (429 m alt.) kurz unterhalb von „Am Scheidsberg“ und dem Ausgang der „Klause“ (ca. 400 m alt.), 46°48'-49'N/15°11'-12'E, GF 9157/3; Mischwald mit *Fagus sylvatica*, *Acer pseudoplatanus*, etc., 09.08.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Tapesia rosae** (Pers.) Fuckel, auf abgestorbenen Zweigen von *Rosa tomentosa* Sm., ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölk-Tal S von Gröbming, Umgebung des Schwarzensees, im Bereich der Harmeralm, ca. 1200 m alt., 47°17'N/13°52'E, GF 8749/1; wärmebegünstigtes Hang, 19.07.1986, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Taphrophila cornu-capreoli** Scheuer (ISOTYPUS), in Biblioth. Mycol. 123: 172 (1988), auf *Carex paniculata* L. (abgestorbene, vorjährige Blätter), ÖSTERREICH, Steiermark, Rottenmanner Tauern, Pölstal, am Ufer der Pöls S von St. Johann a. Tauern, ca. 1015 m alt., 47°20'N/14°28'E, ca. 1015 m alt.; sumpfiges Bachufer mit *Alnus incana*, *Filipendula ulmaria*, *Cirsium oleraceum*, *Scirpus sylvaticus*, etc., 12.08.1984, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Trematosphaeria hydrela** (Rehm) Sacc., auf Faulholz in einem kleinen Tümpel, DEUTSCHLAND, Bayern, Wildseefilz bei Peustelsau, W von Bad Kohlgrub, ca. 900 m alt., 47°40'N/10°57'E, GF 8331/2; *Picea abies*-Bestand am Rand des Moores, 29.08.1987, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Trematosphaeria hydrela** (Rehm) Sacc., auf Holz von *Fagus sylvatica* L. im Bach, ÖSTERREICH, Steiermark, Ennstaler Alpen, Gesäuse, Hartelsgraben ca. 4 km SW von Hieflau, ca. 840 m alt., 47°34'N/14°42'E, GF 8454/1, 23.07.1994, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Trematosphaeria hydrela** (Rehm) Sacc., auf entrindetem Faulholz in einem Bach, ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölk-Tal S von Gröbming, unterste Abhänge des Kochofen W über Kleinsölk, am Baumlehrpfad, 1050-1150 m alt., 47°23'N/13°56'E, GF 8649/2, 14.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Trematosphaeria hydrela** (Rehm) Sacc., auf entrindetem Faulholz im Bach, ÖSTERREICH, Steiermark, Poßruck, Heiligengeist-Klamm S von Leutschach, 400-650 m alt., 46°37'-38'N/15°28'E, GF 9358/4; bewaldete Bachschlucht mit *Acer pseudoplatanus*, *Fagus sylvatica* und *Picea abies*, 10.08.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Tympanis conspersa** Fr., auf abgestorbenem Ast von *Sorbus aucuparia* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölk-Tal S von Gröbming, W-Ufer des Schwarzensees, 1170-1180 m alt., 47°17'N/13°52'E, GF 8749/1, 12.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, TROM, WSP
- Tympanis laricina** (Fuckel) Sacc., auf kleinem, abgestorbenem Baum von *Larix decidua* Mill., ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, 7 km S von Gröbming, 1,5 km S vom Kochofen, Fleischkögel W oberhalb der Lafenberg-Alm, ca. 1880 m alt., 47°23'N/13°54'E, GF 8649/1, 05.07.1988, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Typhula cf. athyrii** Remsberg, auf *Athyrium filix-femina* (L.) Roth (Rhachen abgestorbener, vorjähriger Wedel), ÖSTERREICH, Steiermark, Seckauer Tauern, beim Hochreichhart-Schutzhaus (1483 m alt.), 47°22'N/14°42'E, GF 8654/1, 04.09.1975, leg. J. Poelt & J. Hafellner, det. P. Remler. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Uredinopsis struthiopteridis** Störmer ex Dietel, II auf *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro, ÖSTERREICH, Steiermark, Poßruck, Heiligengeist-Klamm S von Leutschach, 400-650 m alt., 46°37'-38'N/15°28'E, GF 9358/4; bewaldete Bachschlucht mit *Acer pseudoplatanus*, *Fagus sylvatica* und *Picea abies*, 27.08.1985, leg./det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, WSP
- Urocystis phlei-alpini** C. Terrier, auf Blättern von *Phleum pratense* L., ÖSTERREICH, Steiermark, Oststeirisches Hügelland, Bez. Weiz, ca. 5 km ENE von Birkfeld, Miesenbach (47°22'N/15°45'E),

- Südhang ca. 200 m W der Volksschule, ca. 800 m alt., GF 8660/2; Mähwiese, 15.06.1996, leg. A. Wiffling, det. Ch. Scheuer, in duplo conf. K. Vánky (Tübingen, 1997). – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, TROM, WSP
- Uromyces ambiguus** (DC.) Fuckel, II, III auf Jungpflanzen von *Allium cf. scorodoprasum* L., ÖSTERREICH, Niederösterreich, zwischen dem südöstlichen Stadtrand von Wien und dem Flughafen Wien-Schwechat, SE von Mannswörth, ca. 155 m alt., GF 7865/3; Auwald, 07.04.1995, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Uromyces gageae** Beck, III auf *Gagea pratensis* (Pers.) Dum., ÖSTERREICH, Burgenland, Leithagebirge, E von Wimpassing a. d. Leitha, ca. 240-250 m alt., 47°55'N/16°26'E, GF 8064/4; Laubwald, 18.04.1995, leg./det. Th. Barta, conf. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Uromyces gageae** Beck, III auf *Gagea lutea* (L.) Ker-G., ÖSTERREICH, Burgenland, Mönchwald ca. 2 km WNW von Deutschkreutz, ca. 200 m alt., 47°36'N/16°35'E, GF 8365/4; Laubwald, 03.04.1995, leg./det. Th. Barta, conf. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Uromyces gageae** Beck, III auf *Gagea lutea* (L.) Ker-G., ÖSTERREICH, Niederösterreich, zwischen dem südöstlichen Stadtrand von Wien und dem Flughafen Wien-Schwechat, in der Poigenau (Beugenau) bei Mannswörth, ca. 155 m alt., GF 7865/3; Waldrand, 07.04.1995, leg./det. Th. Barta, conf. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Uromyces gageae** Beck, III auf *Gagea lutea* (L.) Ker-G., ÖSTERREICH, Niederösterreich, südliches Wiener Becken, nördliches Steinfeld, ca. 7 km SE von Baden b. Wien, in den Triestingauen bei Tattendorf (47°57'N/16°18'E), ca. 220 m alt., GF 8063/2, 10.04.1995, leg./det. Th. Barta, conf. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Uromyces lineolatus** (Desm.) J. Schröt., I auf *Pastinaca sativa* L., ÖSTERREICH, Burgenland, N vom Neusiedler See, zwischen Neusiedl a. See und Jois, ca. 120 m alt., 47°57'N/16°48'E, GF 8066/2; Feuchtwiese, 14.05.1994, leg./det. Th. Barta, conf. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, LI, WSP
- Uromyces ilycoctoni** (Kalchbr.) Trotter, III auf *Aconitum vulparia* Rchb., ÖSTERREICH, Steiermark, S von Mariazell, Salzaklamm, Wanderweg an der Salza im Bereich der Holzbrücke ca. 0,5 km E der Salzabücke in Rasing, 780-800 m alt., 47°45'N/15°19'E, GF 8257/2; montaner Mischwald über Kalk, 31.07.1994, leg./det. Ch. Scheuer, conf. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Uromyces ilycoctoni** (Kalchbr.) Trotter, III auf *Aconitum vulparia* Rchb., ÖSTERREICH, Steiermark, S von Mariazell, Salzaklamm, Wanderweg an der Salza im Bereich der Holzbrücke ca. 0,5 km E der Salzabücke in Rasing, 780-800 m alt., 47°45'N/15°18'E, GF 8257/2; montaner Mischwald über Kalk, 14.09.1995, leg./det. Ch. Scheuer, conf. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Uromyces muscari** (Duby) Lév., Syn. *Uromyces scillarum* (Grev. ex Berk.) Wint., III auf *Muscari tenuiflorum* Tausch, ÖSTERREICH, Niederösterreich, Marchfeld, am Bahndamm bei Angern a. d. March, ca. 150 m alt., 48°23'N/16°49'E, GF 7666/2, 05.05.1995, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Uromyces poae** Rabenh., Syn. *Uromyces dactylidis* G. H. Otth var. *poae* (Rabenh.) Cummins, I auf *Ranunculus ficaria* L., ÖSTERREICH, Burgenland, N von Neckenmarkt (47°36'N/16°33'E), ca. 250 m alt., GF 8365/3; an einem Bachufer, 16.04.1995, leg. Th. Barta, det. P. Zwetko. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Uromyces valerianae** (Schumach.) Fuckel, II auf *Valeriana montana* L., ÖSTERREICH, Tirol, Tanneheimer Berge, ca. 3 km SW von Vils, am Weg zur Vilsler Alpe, ca. 1200 m alt., ca. 47°32'N/10°36'E, GF 8429/4, 09.08.1959, leg. A., J. & J. Schröppel & H. Doppelbauer, det. J. Poelt. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Valsa ceratosperma** (Tode: Fr.) Maire, Syn. *Valsa ceratophora* Tul. & C. Tul., auf *Rubus idaeus* L. (abgestorbene Stengel), ÖSTERREICH, Steiermark, Graz, Bez. Mariatrost, ca. 400 m ESE oberhalb der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 1, ca. 450 m alt., 47°06'N/15°29'E, GF 8858/4, 29.09.1993, leg. Ch. Scheuer, det. J. Hafellner. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Vibrissea decolorans** (Saut.) A. Sánchez & Korf, Syn. *Apostemidium leptosporum* (Berk. & Broome) Quél., auf Faulholz von *Alnus viridis* (Chaix) DC. im Bach, ÖSTERREICH, Tirol, Ötztal, Untergurgl, unterste E-exponierte Abhänge der Sonnbergalm, ca. 1800 m alt., 46°53'N/11°02'E, GF 9132/1; kleiner Wildbach, 23.08.1991, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, TROM, WSP

- Vibrissea decolorans** (Saut.) A. Sánchez & Korf, Syn. *Apostemidium leptosporum* (Berk. & Broome) Quél., auf Faulholz von *Alnus viridis* (Chaix) DC. im Bach, ÖSTERREICH, Tirol, Ötztal, Untergurgl, unterste E-exponierte Abhänge der Sonnbergalm, W oberhalb von Dreihäusern, ca. 1800 m alt., 46°53'N/11°02'E, GF 9132/1; kleiner Wildbach, 24.08.1991, leg. Ch. Scheuer, A. Nograsek & W Pongratz, det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, TROM, WSP
- Winterella alnicola** (Höhn.) J. Reid & C. Booth, auf abgestorbenen Zweigen von *Alnus cf. incana* (L.) Moench, ÖSTERREICH, Steiermark, Rasing S von Mariazell, an der Salza kurz E der Salzabrücke, ca. 800 m alt., 47°45'N/15°18'E, GF 8257/2; Gehölzstreifen am Ufer, 20.07.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, LI, TROM, WSP
- Winterella alnicola** (Höhn.) J. Reid & C. Booth, auf *Alnus incana* (L.) Moench oder *A. glutinosa* (L.) Gaertn., ÖSTERREICH, Steiermark, Grazer Bergland, Schöcklgebiet N von Graz, Klammgraben 1 km WSW von St. Radegund, 670-705 m alt., 47°10'N/15°28'E, GF 8858/2; bewaldete Bachschlucht, 06.09.1994, leg. Lar. N. Vasilyeva & Ch. Scheuer, det. Lar. N. Vasilyeva (Graz, 1994). – Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP
- Xylaria filiformis** (Alb. & Schw.: Fr.) Fr., auf *Scirpus sylvaticus* L. (abgestorbene Stengel), ÖSTERREICH, Steiermark, Rottenmanner Tauern, am Pölsbach S von St. Johann a. Tauern, ca. 1015 m alt., 47°20'N/14°28'E, GF 8652/4; sumpfiges Bachufer mit *Alnus incana*, *Cirsium oleraceum*, *Filipendula ulmaria*, *Carex paniculata*, etc., 12.08.1984, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Xylaria filiformis** (Alb. & Schw.: Fr.) Fr., auf abgestorbenen Stengeln von *Cicerbita alpina* (L.) Wallr. [Syn. *Mulgedium alpinum* (L.) Less.], ÖSTERREICH, Steiermark, Schladminger Tauern, Kleinsölk-Tal S von Gröbming, Aufstieg von der Putzental-Alm zur Oberen Alm, ca. 1500 m alt., 47°16'N/13°51'E, GF 8749/1; Hochstaudenflur, 18.09.1991, leg./det. Ch. Scheuer. – Verteilt an/Distributed to: GZU, IMI, KRAM, TROM, WSP
- Xylaria longipes** Nitschke, auf entrindetem Faulholz von *Acer pseudoplatanus* L., ÖSTERREICH, Vorarlberg, Rankweil, E der Heilanstalt in Valduna, 520-550 m alt., 47°15'N/9°38'E, GF 8723/2; Mischwald mit *Ilex aquifolium* im Unterwuchs, 03.09.1995, leg. G. Kovacs, det. Ch. Scheuer. Verteilt an/Distributed to: GZU, KRAM, LI, TROM, WSP