download www.zobodat.at

γ. parviflora. Floribus minimis. *Involucro 3 vel 4 plo longiore quam flos,* quam proprietatem nulla formarum sponte nascentium exhibet.

Synonyma: N. humilis Hort.? Vidi specimina multa in horto quodam urbis Francofurti et in „Magasin Schleicher."

20. **N. elata Boiss.** Pl. nov. I, 66. (1842). Caule erecto ramoso; ramis strictis. Floribus involucratis, *laciniis involucri setaceis.* Sepalis ovatis basi attenuatis sessilibus. Petalis longe stipitatis, *ungue laminam subaequante*, labio exteriore bipartito lanceolato, *laciniis linearibus,* interiore late ovato. Antheris brevissime apiculatis. Capsulis 4—5 ad apicem usque connexis laevibus. *Seminibus* angulatis exasperatis nigris *compluribus denticulis brevissimis ornatis.*

Synonyma: N. intermedia C. Koch. Linnaea XIX, 48. — N. involucrata C. Koch l. c.

Area geogr.: Asia minor: Assos in dumetis! (Sint. 1049. HGB et HBB); Mysia: Koukourdanlik! (Calvert 335. 486. HGB): Bithynia! (C. Koch HGB); Lydia: sepes prope Philadelphiam! (HGB) ect.

Floret Junio et Julio.

Index specierum et varietatum.

Garidella L. 24
anethifolia Salisb. — nigellaeformis St. Lag. — Nigellastrum L.
— nigelliformis St. Lag. = N. Nigellastrum Willk.
ungiucularis Lam. = N. unguicularis Spenner.
Komaroffia Ktze.
diversifolia Ktze. = N. integrifolia Regel.
Nigella L.
agrestis J. u. C. Presl. = arvensis L.
amoena Salisb. = Hispanica L.
aristata Sibth. = Huthii Brand β) aristata
Armena Stev. = segetalis M. B. β) Armena Boiss.
arvensis L. 24
— caudata Boiss.
— Cossoniana Ball. = Gallica Jord. β) Cossoniana Brand.
— cretensis Rev. = arvensis var. microcarpa Boiss.
— divaricata Boiss.
— foeniculacea Velenovsky.
— glauca Boiss. = tuberculata Gris.
— glaucescens Guss. = arvensis var. divaricata Boiss.
— involucrata Boiss. = tuberculata Gris.
— microcarpa Boiss.
— trachycarpa Borb.
— typica Boiss. — verruculosa Beck. = arvensis L.

download www.zobodat.at

arvensis Pallas = segetalis M. B.
aspera C. Koch = tuberculata Gris.
Assyriaca Boiss. 27
bicolor Boiss. = segetalis M. B.
Bourgaei Jord. = Damascena L. γ) glaucescens Rev.
ciliaris D.C. 13
Cilicica Boiss. = stellaris Boiss.
coarctata Gmel. = Damascena L. fl. pl. β) coarctata.
coerulea Lam. = Damascena L.
confusa Salle = Gallica Jord.
corniculata DC. = orientalis L.
cretensis Stev. = } arvensis L. var. microcarpa Boiss.
cretica Mill. = }
Damascena L. 34
— Africana Brand.
— coarctata Willd. = fl. pl. β) coarctata.
— glaucescens Rev.
— minor Willk. = glaucescens Rev.?
— pallidiflora Rev.
— typica Brand.
deserti Boiss. 28
— Arabica Boiss. = deserti Boiss.
— Assyriaca Boiss. = Assyriaca Boiss.
— tenuifolia Brand.
divaricata Beaupré = arvensis L. var. divaricata Boiss.
divaricata Willk. = Gallica Jord. var. divaricata Brand.
diversifolia Franchet = integrifolia Regel.
doliata Pall. = arvensis L.
elata Boiss. 36
elegans Salisb. = Damascena L.
foeniculacea DC. = arvensis β) foeniculacea Velenovsky.
foeniculacea Hohen. = segetalis M. B.
fumariaefolia Kotschy 15
— Cassica Brand.
Gaditana Soleir. = N. Hispanica L.
Gallica Jord. 9
— Algeriensis Brand. — Cossoniana Brand. — divaricata Brand.
Garidella Spenner = Nigellastrum Willk.
Hispanica Gren. et Godr. = Gallica Jord. var. divaricata Brand.
Hispanica L. 23
— genuina Coss. = Hispanica L.
— glaucescens Boiss. = Gallica Jord. var. divaricata Brand.
— intermedia Coss.
— parviflora Coss. = Gallica Jord.
Huthii Brand 26
— aristata Brand.
Indica Roxb. = sativa L.
integrifolia Regel 12

download www.zobodat.at

intermedia C. Koch. — involucrata C. Koch = elata Boiss.
involucrata Mch. = Damascena L.
laevis Delil. = arvensis L. var. divaricata Boiss.
latifolia Mill. = arvensis L.
multifida Gater. = Damascena L.
Nigellastrum Willk. 11
Noëana Boiss. = oxypetala Boiss. var. Noëana
orientalis L. 13
— microcarpa Brand.
oxypetala Boiss. 14
— involucrata Brand. — Noëana Boiss.
— Persica Brand. — tenuifolia Boiss.
— tenuiloba Sint. = tenuifolia Boiss.
— typica Brand.
Persica Boiss. = oxypetala Boiss. var. Noëana
polygyna Mch. = Hispanica L.
pygmaea DC = Damascena L. fl. pl. β) coarctata?
sativa L. 33
— brachyloba Boiss. = hispidula Boiss.
— Cretica DC = N. arvensis L. var microcarpa Boiss.
— hispidula Boiss.
— Indica DC = N. sativa L.
— pygmaea Pers. = N. Damascena L. fl. pl. β) coarctata?
— citrina DC. (?)
segetalis M. B. 23
— Armena Boiss.
stellaris Boiss. 15
stellaris Boiss. (olim!) = fumariaefolia Ky.
Tauberti Brand. 27
Taurica Stev. = Damascena L.
tenuiflora Gilib. = arvensis L.
truncata Viv. = sativa. L.
tuberculata Gris. 26
unguicularis Spenner 11
unguiculata Stokes = arvensis L.
verrucosa C. Koch = segetalis M. B. β) Armena Boiss.
Nigellastrum Mch.
ciliare Bercht et Presl. = ciliaris DC.
corniculatum Bercht et Presl. = orientalis L.
flavum Mch. — orientale Bercht et Presl. = orientalis L.

Bücherschau.

Zacharias, Otto. Forschungsberichte aus der Biologischen Station zu Plön, Theil 3, mit 2 Taf., 17 Abb. und 3 Tab. Berlin 1895, VII, 210 S.

Der dritte Theil dieser Berichte zeigt schon durch seinen Umfang, der dem der ersten beiden Theile zusammen gleich-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Helios - Abhandlungen und Mitteilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: 13

Autor(en)/Author(s): Redaktion von Helios Frankfurt/Oder

Artikel/Article: Index specierum et varietatum. 36-38