

Nachträge

zu

Huth's Flora von Frankfurt.

Von
Dr. A. Brand.

Wer die im Jahre 1895 erschienene zweite Auflage von *Huth's Flora von Frankfurt* mit der im Jahre 1882 erschienenen ersten Auflage vergleicht, der wird erstaunt sein über die bedeutende Veränderung, die unsere Flora im Verlaufe dieser 13 Jahre erlitten hat. Eine nicht unerhebliche Zahl von neuen Arten ist festgestellt worden, die theils durch Einwanderung aus dem oberen Theile unseres Stromgebietes, theils durch Einschleppung (vorzüglich durch russisches Getreide), in unser Gebiet gelangt sind. Auch neue Standorte seltenerer Pflanzen sind in grosser Menge aufgefunden. In den Jahren 1895—1897 nun hat sich unser Beobachtungsgebiet einer so regen Durchforschung zu erfreuen gehabt, dass der Zeitpunkt gekommen sein dürfte, die Freunde unserer Pflanzenwelt von den gewonnenen Ergebnissen in Kenntniss zu setzen. Ich bitte bei dieser Gelegenheit alle diejenigen Herren, die sich an dieser Durchforschung betheiligt haben, in Zukunft mir in der gleichen liebenswürdigen Weise zur Seite stehen zu wollen, in der sie den uns leider allzufrüh entrissenen besten Kenner und Bearbeiter unserer Flora bisher unterstützt haben. Es soll mein eifriges Bestreben sein, die *Huth'sche Flora* im Sinne des Verfassers weiterzuführen und zu ergänzen. Gleichzeitig gebe ich die Versicherung, dass die mir eventuell zugehenden Belegexemplare nicht etwa in meinem Privatherbar auf Nimmerwiedersehen verschwinden werden; dieselben werden vielmehr dem von *Huth* begründeten Herbarium Francofurtanum einverleibt werden, welches

nach dem Tode des Besitzers von unserem Verein erworben worden ist, so dass in Zukunft jeder die Originalexemplare in unserem Museum vergleichen und untersuchen kann.

Im Folgenden gebe ich nun die neuen Beobachtungen wieder in der Reihenfolge, in der sie das mir vorliegende Handexemplar der Flora aufführt. Die Namen der Beobachter zitiere ich mit folgenden Abkürzungen:

A = *Ascherson*; **B** = *Brand*; **G** = *Golenz*; **H** = *Huth*;
T = *Taubert*; **W** = *Wenske*.

Formen, die für das Gebiet neu sind, werden durch einen Stern hervorgehoben.

Ranunculaceae

Thalictrum minus a) *montanum*. Drossen: Bullerberge (T). — b) *flexuosum*. Zielenzig: Westabhang des Postumthales bei der Walkmühle (T).

Th. flavum. Krossen: Oderwiesen bei Hundsbelle (Lüddeke); Aue nach Russdorf (A).

Hepatica triloba. Zielenzig: Postumthal (T); Lagow: Thiergarten (T); Schermeissel: an den Bächen-Seen (T); Gleissen: Buchenwälder (T); Krossen: Hundsbelle (Seler).

Pulsatilla vernalis. Krossen: zwischen Siebenbeuthen und Rampitz (T), Krossener Mühle (Lüddeke); Sternberg: Kunersdorfer Mühle (T); Schermeissel: Weg zur Bergmühle (T); Schwiebus: Sawischer Vorderheide (G).

Anemone ranunculoides. Sternberg: Park von Görbitsch (B).

Ranunculus Ficaria * f. *parviflora* Hth. Pfl. in allen Theilen etwa halb so gross als die typische. Sternberg: an dem verbotenen Fusswege bei Görbitsch (H).

R. fluitans. Zielenzig: in der Postum, häufig bis nach Kriescht (T).

R. bulbosus * b. *glaberrimus* Hth. Pfl. 30—60 cm hoch; mit Ausnahme der Kelchblätter völlig kahl. Frankfurt: Elfensteig (H).

Actaea spicata. Sternberg: Buchwald am Görbitschsee (H); Lagow: Tschetsch-See (G).

Fumariaceae

Corydalis intermedia. Sternberg: am Ostufer des Görbitsch-Sees.

Cruciferae

- * **Chorispora tenella** DC. Frankfurt: Proviantamt (*Graebner*).
Barbarea vulgaris. Sternberg: Park von Görbitsch.
 * **Cardamine silvatica** Link. Sternberg: Springmühle am Karschensee; Lagow: Forsthaus Buchspring (G).
 * **Sisymbrium strictissimum** L. soll von *Lux* in wenigen Exemplaren am Buschmühlenwege gefunden sein.
Erysimum hieracifolium a) **strictum**. Krossen: Oderauen bei Günthersberg (T); Guben: am Schlachthause an der Neisse (W).
Erucastrum Pollichii. Küstrin: Werbig (T).
Diplotaxis tenuifolia. Frankfurt: Buschmühle (B).
Lepidium Draba. Frankfurt: Mittelmühle (B), Bahndamm bei den Nuhnen (B).
L. campestre. Frankfurt: Bahnübergang an der Ziegelei (B).
Neslea panniculata. Krossen: Güntherberg (T); Lagow: Petersdorf (T).
Bunias orientalis. Frankfurt: Nuhnen (B).

Violaceae

- Viola palustris**. Sternberg: Waldsümpfe bei Leichholz (T), zwischen Langer Fisch- und Pinnow-See (H).
V. mirabilis. Schermeißel: Buchenschlucht bei Gleissen.

Droseraceae

- Drosera intermedia**. Sternberg: an der Pleiske (T); zwischen Langer Fisch- und Pinnow-See (H); Lagow (G); Krossen (*Lüddecke*).
D. rotundifolia. Sternberg: an der Pleiske (T).
D. anglica. Sternberg: Wilkensee.

Silenaceae

- Gypsophila fastigiata**. Sternberg: an der Pleiske (G).
 * **G. paniculata** L. Eine in Oesterreich heimische beliebte Gartenpflanze. Frankfurt: Proviantamt (H).
Dianthus arenarius. Krossen: Beutnitz, Wald nach Griesel hin, zwischen Günthersberg und Massow (T); Fürstenberg: Grinnitz am Wege nach Melschnitz (T).
D. caesioides. Krossen: Kalkteich, Langer Hals.
Viscaria viscosa. Schermeißel: Teichstrauch; Drossen: Schwänenberge; Krossen: Kienberge (*Seler*).

- Silene conica.** Frankfurt: Kleefeld bei der Buschmühle (H).
S. nutans * **b. gracilior** Hth. Mit rother Blüte. Frankfurt:
 Elfensteig (H).

Alsinaeae

- Sagina nodosa** **b. glandulosa.** Fürstenwalde: Berkenbrück
 am Delnsee (B).
Stellaria nemorum. Zielenzig: an der Postum bis Kriescht
 häufig (T).

Linaceae

- Radiola multiflora.** Lagow: Westufer des Tschetsch-Sees;
 Schermeissel: Aecker nördl. von den Bächen-Seen (T).

Malvaceae

- Malva Alcea.** Krossen: zwischen Sauermanns Mühle und
 Thiemendorf (A); Messow; Oderdamm bei Schönfeld;
 Lagow: Petersdorf (T).

Hypericaceae

- Hypericum humifusum.** Lagow: Westufer des Tschetsch-
 Sees; Schermeissel: nördlich von den Bächen-Seen (T).
H. quadrangulum. Krossen: Chaussee beim Gold. Löwen (A).
H. montanum. Krossen: Kienberge bei Hundsbelle (T);
 Sauermanns Mühle (Seler); Sternberg: an der Pleiske
 bei der Schneidemühle; Lagow: Buchmühle; Kriescht:
 zwischen Mittelbusch und Obermühle.

Geraniaceae

- Geranium pyrenaicum.** Lebus: Chaussee am Bahnhof (B).
 Krossen: bei Sauermanns Mühle und Läsgen.
G. sanguineum. Frankfurt: Tzschetzchnower Oberweg
 (B); Königswalde: Neukrug (T).
G. dissectum. Frankfurt: am Bahndamm zwischen Nulmen
 und Rosengarten (B).
G. columbinum. Lagow: am Wege zum Thiergarten (T).

Balsaminaceae

- Impatiens noli tangere.** Krossen: Sauermanns Mühle (A).
 Sternberg: an der Pleiske; Kriescht: an der Postum (T).

Papilionaceae

- Ulex europaeus.** Küstrin: Reitwein (B).
Cytisus nigricans. Sternberg: an der Pleiske (A). La-
 gow: (G).

- Medicago minima.** Frankfurt: am Müllroser Kanal zwischen Finkenheerd und Brieskow (H); Königswalde: Höllenkeute.
- Trifolium striatum.** Frankfurt: Tzschetzschnow (*Paeske*).
- T. rubens.** Lagow: Kirchhof (G).
- T. hybridum.** Lagow: Tschetsch-See (G).
- Astragalus arenarius.** Zielenzig: Postumthal b. d. Neumühle.
- Vicia silvatica.** Schermeissel: zwischen dem Gr. und Kl. Bächen-See (T); Krossen: Sauermanns Mühle (A). Lagow: Thiergarten (G).
- Lathyrus silvester.** Kriescht: zwischen Mittelbusch und Obermühle (T); Lagow: Thiergarten, Tschetsch-See, Bahnhof Neu-Kunersdorf.
- L. vernus.** Lagow, Schermeissel, Gleissen: in den Buchenwäldern (T).
- L. niger.** Lagow: Thiergarten.

Rosaceae

- Geum Willdenowii.** Königswalde: Schluchten am Berg-Vorwerk (A).
- * **Potentilla intermedia auct.** wurde 1895 bei Gelegenheit der Excursion des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg beim Proviantamt entdeckt.
- P. rupestris.** Lagow: zwischen den Bächen-Seen.
- P. supina.** Schermeissel: Dorfaue (G).
- P. alba.** Sternberg: ca. 1/2 Meile südöstlich der Kunersdorfer Mühle; Gleissen: Weg zur Bergmühle; Königswalde: Forsthaus Neukrug. Drossen: Eichgrund (T); Schermeissel: westlich vom Bürger-See (G).
- P. procumbens.** Lagow: Lange Wiese; Sternberg: Spiegelberg (G).
- P. rubens.** Zielenzig: Chaussee nach Schermeissel (G); Beeskow: zwischen Siehdichum und Bremsdorfer Mühle (H).
- Alchemilla arvensis.** Lagow: Weg zum Thiergarten; Schermeissel: Bächen-Seen (T).
- Sanguisorba minor.** Schermeissel: Hennenberge (G).

Onagraceae

- Epilobium angustifolium.** Krossen: zwischen Russdorf und Tscheusdorf (A); Sternberg: Schneidemühle (T).
- E. montanum.** Zielenzig: Postumthal; Königswalde: Berg-Vorwerk (T).

Circaea alpina. Sternberg: Spring-Mühle; Schermeissel: zwischen den Bächen-Seen (T, G); Königswalde; Bergmühle (T).

Trapa natans. Guben: Deulowitzer See (W). Wieder verschwunden?

Halorrhagidaceae

Myriophyllum spicatum. Guben: Deulowitzer See (W); Schermeissel: Gr. Bächen-See (G).

Lythraceae

Lythrum Hyssopifolia. Fürstenberg: Rempitz bei der Ziegelei (T).

Peplis Portula Fürstenberg: Alt-Rempitz bei der Ziegelei; Krossen: Gänsepfuhl in Alt-Beutnitz (T).

Crassulaceae

Sempervivum soboliferum. Königswalde: Alter Kirchhof (G).

Saxifragaceae

Saxifraga tridactylitis Lagow: Melz-See; U. F. Buchspring (G).

Umbelliferae

Sanicula europaea. Lagow: Buchenwälder, Thiergarten. Schermeissel: nach Gleissen zu (T).

Seseli annuum. Küstrin: Hügel bei Werbig (T).

Libanotis montana. Fürstenberg: Oderdamm zwischen Rempitz und der Ziegelei (T); Krossen: Auewiesen neben der Grüneberger Chaussee (A).

Peucedanum Cervaria. Krossen: Kienberge bei Hundsbelle (A); Küstrin: Hügel bei Werbig.

* **Chaerophyllum hirsutum.** Königswalde: Bergmühle (G).

Araliaceae

Hedera Helix L. Königswalde: Buchenschlucht.

Caprifoliaceae

Ebulum humile. Sternberg: zwischen Malsow und Teuerzig (T).

Linnaea borealis. Königswalde: Forsthaus Neukrug (T);

Rubiaceae

Asperula odorata. Lagow, Schermeissel, Königswalde. Buchenwälder; Krossen: Kienberge.

* **A. arvensis.** Guben: Taubstunnen-Anstalt (W).

A. cynanchica. Lebus: Schlucht an den Kreuzen und Weg nach Klessin (B).

* **Galium cruciata.** Müllrose: an der Schlaube (W).

* **G. rotundifolium.** Guben: Pinnow (W).

Compositae

Petasites officinalis. Frankfurt: am Müllroser Kanal zwischen Lindow und Finkenheerd (H).

Aster Linosyris. Neuzelle: Dielower Berge.

A. Amellus. Guben: Kaltenborner Berge; Seelow: Dolgelin.

Pulicaria dysenterica. Müncheberg: Ahrendorf.

* **Bidens connatus.** Frankfurt: Oderufer (B).

Gnaphalium uliginosum * b) nudum. Frankfurt: Oderufer.

Anthemis tinctoria. Küstrin: zwischen Mallnow und Podelzig; Guben: Petershagen, Falkenhagen.

Arnica montana. Guben: bei den Weinbergen.

Senecio erraticus. Frankfurt: Schäferewiesen. (H u. B).

Wir fanden die Pflanze 1896 hier zum ersten Mal. Es ist wegen der stattlichen Grösse und des von den übrigen Senecioarten abweichenden Habitus der Pflanze nicht wahrscheinlich, dass sie in den früheren Jahren übersehen sein sollte. Sie scheint also jetzt anzufangen, sich vom Ochsenwerder, bisher dem einzigen Standorte bei Frankfurt, weiter auszubreiten. Krossen: Oderniederung und Kienberge; Küstrin: Vorflutkanal, Pappelhorst.

S. sarracenicus. Krossen: Fährwald bei Deutsch-Nettkow.

S. paludosus. Krossen; Küstrin.

Carduus acanthoides. Krossen: Kirchhof.

Picris hieracioides. Küstrin: Tucheband.

Scorzonera purpurea. Küstrin: Grampener Berge; Krossen: Krämersborner Gr. Heide.

S. humilis. Küstrin: Grampener Berge. Beeskow: zwischen Siehdichum und Grunow (H u. B).

Hieracium praealtum. Krossen: Kienberge; Neuzelle: Dielower Berge.

* **b) fallax.** Krossen: Kienberge.

* **H. floribundum.** Krossen: Oderdamm bei Gr. Blumenberg und Fährwald.

H. cymosum. Krossen: Kienberge und Fährwald.

H. pratense. Frankfurt: Bahndamm nach Rosengarten (B); Guben; Neuzelle.

Ambrosiaceae

Xanthium spinosum. Guben, Küstrin.

Campanulaceae

Phyteuma spicatum. Krossen: Hundsbelle.

Campanula sibirica. Frankfurt: Simons Mühle (II).

C. Rapunculus. Ziebingen: Schlossgarten; Müncheberg: Chaussee bei Heinersdorf.

Ericaceae

Erica Tetralix. Beeskow: Lamitzsch.

Hypopityaceae

Pirola uniflora. Guben: Quelle jenseits der Kaltenborner Berge; Neuzelle: zwischen Mittelmühle und Schweizkow.

P. rotundifolia. Friedland: Lettiner See.

Chamophila umbellata. Guben: Stadtheide, Pinnower Theerofen; Krossen: Kossar; Beeskow: Schweinebraten.

Ramischia secunda. Fürstenwalde: Berkenbrück (B).

Convolvulaceae

Cuscuta lupuliformis. Frankfurt: Brieskower See (B). Viele strauchartige Weiden sah ich, die durch diese Schnarotzerpflanze zum völligen Absterben gebracht worden waren..

Borraginaceae

Lappula Myosotis. Podelzig: am Bahnhof (B).

Pulmonaria officinalis. Zielenzig; Gleissen; Schermeissel: Buchwald.

P. angustifolia. Küstrin: Reitwein, bei der grossen Lehngrube (A 1866).

Lithospermum officinale. Küstrin: zwischen Wuhden und Klessin; Krossen: Kienberge.

Solanaceae

Solanum villosum. Fürstenwalde: Holzablage Kunersdorfer Berg.

Nicandra physaloides. Krossen: Weinberge (A 1866).

Scrophulariaceae

Verbascum Blattaria. Krossen: Oderdamm bei Poln. Nettow; Fürstenwalde: Spree beim Ulanenstall.

- V. phoeniceum.** Fürstenwalde: nach Neuendorf zu.
- Linaria minor.** Bei Krossen, Guben, Seelow, Küstrin.
- L. arvensis.** Krossen: Kähnen, Griesel, Bobersberg; Lagow.
- L. Flatine.** Guben: Jetschko, zwischen Neissedamm und Schenkendorf; Küstrin: Hathenow.
- Digitalis ambigua.** Beeskow: Forsthaus Schwarzheide; Küstrin: Vor dem Theerofen und nach Kutzdorf hin; Seelow: Lietzener Park.
- Veronica montana.** Sternberg: Buchenwald bei Görbitsch.
- V. prostrata** bei Müncheberg, Seelow.
- V. latifolia.** Lebus: zwischen Wuhden und Klessin (B); Krossen: Kienberge, Krämersborner Gr. Heide; Guben: Drenziger Berge; Müncheberg: Heinersdorf; Seelow: Bruchabhänge.
- Pedicularis silvatica.** Guben: an mehreren Orten.
- Melampyrum cristatum.** Krossen: Kienberge; Müncheberg: Heinersdorf.
- Orobanche caryophyllacea.** Lebus: Schlucht an den Kreuzen (B).
- Lathraea Squamaria.** Krossen: Griesel.

Labiatae

- Mentha Pulegium.** Küstrin: Kalenzig.
- M. longifolia.** Küstrin: Gorgast; Rathstock.
- Hyssopus officinalis.** Frankfurt: bei der Buschmühle auf abgeladenem Schutt (*Lux.* und *Grunemann*).
- Stachys germanicus.** Küstrin: Tamsel.
- St. arvensis.** Beeskow: Pfaffendorf, Glieneke.
- St. annuus.** Guben: Kirchhof; Lagow; Sternberg: Pleisshammer.
- Chaiturus Marrubiastrum.** Krossen: an mehreren Orten; Guben: Schmachtenhagen.

Plantaginaceae

- Litorella uniflora.** Lieberose; Fürstenwalde: Petershagener See (A. 1887).

Lentibulariaceae

- Utricularia intermedia.** Krossen: Güntersberg.

Primulaceae

- Anagallis coerulea.** Guben: Markersdorf.

* **Androsace septentrionalis.** Krossen: Krämersborner Mittelheide am Kalkteich.

* **Empetraceae**

* **Empetrum nigrum.** Guben: Pinnow.

Chenopodiaceae

Chenopodium urbicum. Krossen: an vielen Stellen.

Ch. polyspermum. Neuzelle; Krossen: Neu-Rehfeld, Fährwald bei Deutsch-Nettkow; Schermeißel: herrschaftlicher Garten.

Atriplex nitens. Frankfurt: Tzschetzschnow (A 1862).

* **A. oblongifolium.** Krossen: Kienberge.

Euphorbiaceae

Euphorbia lucida. Küstrin: Reitwein; Krossen: Niemaschleba (A 1890).

Acalyphaceae

Mercurialis annua. Krossen: zwischen Läsgen und Nettkower Mühle; Guben.

Salicaceae

Salix pentandra. Guben: Wiesen an der Spruke (W).

Juncaginaceae

* **Triglochin maritimus.** Lagow; Fürstenwalde: Hangelberg.

Najadaceae

* **Potamogeton densus.** In der Fischzuchterei des Herrn *Hübner* (Thalmühle) angepflanzt; scheint sich dort zu erhalten.

P. obtusifolius. Seelow (*Götter*).

P. pusillus. Sternberg: in der Pleiske bei Koritten (G).

P. nitens. Lagow.

P. alpinus. Guben; Bärwalde.

Zannichellia palustris. Fürstenwalde: Buchholz, Dorfteich.

Lemnaceae

Lemna trisulca. Guben: in schwarzen Fliess bei der Spruke (W).

Orchidaceae

Orchis globosus. Fürstenfelde.

O. militaris. Lieberose: Förster Kellners Wiese (*Busch*).

O. coriophorus. Krossen: nach den Boberwiesen zu, Deichow, Chrumow; Guben.

O. incarnatus. Lieberose: Münchhofe, dort auch weiss blühend.

Cephalanthera rubra. Seelow: Lietzener Park (*Rudolph*).

C. grandiflora. Krossen: Kienberge.

Goodyera repens. Sternberg: Corittener Heide.

Iridaceae

Iris sibirica. Guben; Müllrose (*Meyer*).

Amaryllidaceae

Leucoium vernum. Wild bei Guben: Döbern.

Liliaceae

Gagea minima. Dieses zierliche Pflänzchen, welches seit vielen Jahren im Gebiet nicht mehr beobachtet worden ist, wurde 1896 von dem Primaner *Detto* auf dem alten Kirchhof entdeckt und auch in diesem Jahre von mir dort wiedergefunden.

S. silvatica. Guben: Neuzelle; Küstrin.

* **Ornithogalum Boucheanum.** Frankfurt: Dammvorstadt (*Weiland*). Die Pflanze dürfte häufig mit *O. nutans* verwechselt worden sein.

Allium acutangulum. Krossen: Oderaue, auch weiss blühend (A).

A. fallax. Krossen: Krämersborner Gr. Heide.

Juncaceae

Juncus filiformis. Beeskow: Spreewiesen; Fürstenwalde: Spreehagen, Hangelsberg (A).

Cyperaceae

Rhynchospora fusca. Fürstenwalde: Spreehagen; Beeskow: Trebatsch.

Scirpus pauciflorus. Lieberose: Behlow.

S. Holoschoenus. Krossen; Briesen: Weg nach Neubrück.

* **Carex cyperoides.** Wuhden (A); Guben.

C. dioeca. Guben.

C. digitata. Drossen: Stampei (A 1885).

C. limosa. Höllengrund bei Hohenwalde (*Rüdiger*); Lietzener Park (*Götter*).

Gramina

Avena pratensis. Reitwein.

Trisetum flavescens. Frankfurt: Proviantamt, Buschmühle.

Aira caryophylla. Frankfurt: Blankensee (*Decker*).

Melica ciliata. Seit langen Jahren zum ersten Male wieder auf der Mauer von Bueks Hause im Jahre 1897 von *Huth* beobachtet (cf. Flora p. 187).

Bromus commutatus. Frankfurt: Proviantamt (*Hennings*).

Triticum caninum. Krossen: Kienberge.

Hordeum arenarium. Guben; Küstrin: Gorgaster Park.

Rhizocarpae

Pilularia globulifera. Fürstenwalde: Petersdorfer See.

Lycopodiaceae

Lycopodium Selago. Krossen: Griesel, Krämersborner Gr. Heide, Fürstl. Revier Neustall; Schermeissel: zwischen den Bächen-Seen.

L. Chamaecyparissus. Müllrose; Lagow am See; Sternberg: Grosser Fisch-See (*Graebner*).

L. annotinum. Schermeissel; Guben; Sternberg: Fenn zwischen Gr. Fisch- und Görbitschsee (*Graebner*).

L. inundatum. Guben.

Equisetaceae

Equisetum silvaticum. Krossen; Guben.

E. pratense. Krossen: Griesel, Bläsgen; Sternberg: Görbitschsee (*Beyer*).

Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum. Sternberg: Truschkenwald; Guben; Bärwalde.

Botrychium ramosum. Beeskow: Lehmgruben bei Sauen.

Filices

Blechnum Spicant. Guben: an der Dorche zwischen Schwerzkow und Göhlen.

Asplenium Trichomanes. Lagow: Thiergarten, Schlucht am Persken-Luch.

A. Ruta muraria. Fürstenwalde: Kirchhofsmauer; Krossen: Stadtkirche.

Phegopteris polypodioides. Guben, Bobersberg.

Ph. Dryopteris. Lagow: am See.

Osmunda regalis. Beeskow: Siehdichum (*Potonié*).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Helios - Abhandlungen und Mitteilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Brand August

Artikel/Article: [Huth's Flora von Frankfurt 55-66](#)