

## Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

Zusammengestellt vom Botanischen Verein Nürnberg.

(Vgl. Deutsche Bot. Monatsschrift 1900/01.)

- Clematis vitalba* L. Zwischen Dehnberg und Simonshofen, auf Rhätkeuper, VIII a (Sch.)<sup>1)</sup>.  
*Anemone silvestris* L. Ritzmannshof, im mittleren Keuper (P., H. und Rösel), VII b.  
*Adonis aestivalis* L. nebst var. *citrinus* Hoffm. Thalmässing, VIII c (Honig).  
*Myosurus minimus* L. Neustadt a. A., VIII a (S., Sch.).  
*Ranunculus auricomus* L. f. *reniformis* Kittel. Leichendorf b. Zirndorf, VIII b; Westheim und Sontheim b. Windsheim, VII a (P.).  
*Trollius Europaeus* L. Spalt, VIII c (Haagen).  
*Aconitum variegatum* L. Lichtenstein, VIII b (H.).  
*Fumaria Vaillantii* Loisl. Gibitzenhof, VIII b (P.).  
*Dentaria bulbifera* L. Ludwigshöhe (N.); Berge b. Sickersdorf (Schnaittach) (H.); Streitberg und Leutzdorf (Kefler), VIII a.  
*Erysimum crepidifolium* Rehb. Eschenbach b. Hersbruck, bis herab in den Dogger, VIII b (Sch.).  
*Erucastrum Pollichii* Sch. et Sp. Münchener Bahnstrecke b. Schweinau, VIII c (P.); häufig zwischen Haltestelle und Dorf Clarsbach am Strafsenrand, VII b (Sch.).  
*Lunaria rediviva* L. Am Eibenfels b. Klausberg, VIII a (K.).  
*Cochlearia officinalis* L. Artelshofen, VIII a (Dittmar).  
*Thlaspi perfoliatum* L. Im Keuper b. Erlenstegen, VIII a (M.); Rügland, VII b (P.); Neustadt, VII b (S., Sch.).  
*Lepidium draba* L. Köpffwasen b. Neustadt und Unterstrahlbach (Sch.), VII b; Bahnhof Hartmannshof (H.), VIII b.  
*Lepidium campestre* R. Br. Spiels, Poppenhof b. Osternohe (K.), VIII a.  
*Coronopus Ruellii* All. Mkt. Bibart, unter der Eisenbahnbrücke b. Langenfeld, VII a (Sch.).  
*Isatis tinctoria* L. Bahnstation Eibach, VIII c; Bahndamm b. Kirchefembach, VII b (Sch.); Neustadt (M.), VII b.  
*Viola hirta* × *odorata* f. *permixta* Jord. Neustadt, VII b (S.).  
*Viola canina* × *silvestris*. Gräf b. Windsheim, VII a (S.).  
*Viola pumila* Chaix. Windsheim, VII a (P.).  
*Dianthus armeria* L. Baudenbach, VII a; häufig am „Hohen Schlag“ b. Grünsberg, VIII b (Sch.).  
*Saponaria officinalis* L. Im Dolomit- und Werkkalkhorizont an dem Strafsenzug Pegnitz-Pottenstein-Behringersmühle-Muggendorf-Streitberg öfter am Strafsenrand, so bei Ebersberg, Pottenstein, Tüchersfeld, Stämpfermühle, Muggendorf, VIII a (Sch.).  
*Vaccaria parviflora* Munch. var. *nobilis* A. Schwarz. Erlenstegen, VIII a (M.).  
*Alsine verna* Bartl. Klausberg, VIII a (K., R.); am Eitzelwanger Keller, VIII b (Sch.).  
*Stellaria glauca* With. Marienberg, VIII a (Honig); Dechsendorf, VII b (P.).  
*Acer campestre* L. Ein sehr alter und großer Baum am „Kellerhaus“ in Kirchröttenbach, VIII a (Sch.).  
*Cytisus nigricans* L. Königstein-Bernhof (H.); zwischen Neuhaus und Krottensee (Sch.). VIII b.  
*Trifolium ochroleucum* L. Ritzmannshof. VII b (M.); Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Trifolium fragiferum* L. nov. f. *divulsa* O. Prechtelsbauer: der untere Teil des Blütenköpfchens ist abgerückt. Westheim b. Windsheim, VII b (P.).  
*Ornithopus sativus* Brot. An der Haltestelle Clarsbach (Sch.); Bahnkörper zwischen Zirndorf und Weiherhof (Abraham). VII b.  
*Vicia dumetorum* L. Auf Waldblößen b. Prackenfels (Rhätkeuper), VIII b (Sch.).

<sup>1)</sup> Namensabkürzungen für die Finder: Heller (H.), Kaufmann (K.), Meister (M.), Niebler (N.), Prechtelsbauer (P.), Riedner (R.), Scherzer (Sch.), Semler (S.).

- Vicia Pannonica* Jacq. Um Windsheim, VII a (Sch.).  
*Vicia Pannonica* Jacq. var. *purpurascens* Koch. Rothenberg b. Burgfarrnbach, VII b (H.); Windsheim, VII a (Sch.).  
*Vicia Cassubica* L. Pommersfelden, VII a (Bauer).  
*Potentilla alba* L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Alchimilla arvensis* Scop. Siegeldorf, VII b; Obersteinbach b. Scheinfeld, VII a (Sch.); Gebersdorf, VII b (H.).  
*Agrimonia odorata* Mill. Reuth b. Lauf (Sch.), VIII b.  
*Spiraea filipendula* L. Sontheim, VII b (P.).  
*Spiraea aruncus* L. Häufig am Nordabhang des Schwanbergs, VII a (Sch.).  
*Pirus torminalis* Ehrh. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Myriophyllum verticillatum* L. Stein, VIII c (H.).  
*Bryonia alba* L. Röthenbach b. Altdorf, VII b (Sch.).  
*Herniaria glabra* L. Bei Weinhof auf Lias; auf dem Hutanger zu Schönberg auf rhätischem Keuper (Sch.), VIII b.  
*Sempervivum soboliferum* Sims. Riegelstein, VIII a (K., R.).  
*Chrysosplenium oppositifolium* L. Enzendorf und Artelshofen, VIII a (Dittmar).  
*Astrantia maior* L. Rinnenbrunn, VIII b (H.); am Fuß des „Hansgörgel“ b. Reichenschwand, VIII a (Zahn); häufig am Waldabhang nördlich von Höhenberg b. Neumarkt, VIII b (Sch.).  
*Eryngium campestre* L. Terrasse vor dem Restaurationsgebäude auf dem Schwanberg, auf Lehrbergschicht, VII a (Sch.).  
*Oenanthe fistulosa* L. Pommersfelden, VII a (Bauer).  
*Seseli annuum* L. Häufig westlich der Burg Veldenstein auf kretacischen Bildungen, VIII a; Ritzmannshof im mittleren Keuper, VII b (Sch.).  
*Libanotis montana* Crntz. Schütters- und Stämpfermühle, VIII a (Sch.).  
*Torilis infesta* Koch. Roth im Keuper, VIII c (Honig).  
*Peucedanum oreoselinum* Mch. Atzelsberg (Sch.).  
*Caucalis daucoides* L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Turgenia latifolia* Hffm. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Scandix pecten Veneris* L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Lonicera periclymenum* L. Eibach, VIII c (P.); Rofsstall, Bürglein, VII b (Sch.).  
*Lonicera caprifolium* L. Zwischen Bürglein und Großshabersdorf, VII b (Sch.).  
*Asperula arvensis* L. Arzlohe, VIII b (Rösel).  
*Galium boreale* L. Abenberg, VII b (Bauer).  
*Galium rotundifolium* L. Altdorf-Rieden (H.); Lichteneck, VIII b (M.), Michelsberger Wald b. Bamberg, VII a (P.).  
*Petasites albus* Gaertn. Artelshofen, VIII a (Dittmar).  
*Inula conyza* DC. Auf Diluvialsand; Herrenhütte b. Nürnberg, VIII a (Sch.).  
*Pulicaria vulgaris* Grtr. Langenfeld, Baudenbach, VII a (Sch.).  
*Galinsogaea parviflora* Cav. Kirchröttenbach, VIII a (Sch.).  
*Rudbeckia laciniata* L. „Himmelgarten“ zu Grünsberg b. Altdorf, VIII b (Sch.).  
*Matricaria discoidea* DC. Schloßhof zu Grünsberg, neuer Güterbahnhof Nürnberg, Mögeldorf, St. Jobst, VIII b und VIII a.  
*Chrysanthemum corymbosum* L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Senecio spathulifolius* DC. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Senecio aquaticus* Huds. Grünsberg, VIII b (Sch.).  
*Cirsium eriophorum* Scop. Ritzmannshof im mittleren Keuper, VII b (Sch.).  
*Carduus crispus* L. Vor dem Schloßeingang zu Grünsberg, VIII b (Sch.).  
*Carduus crispus* × *nutans* L. Erlenstegen, VIII a (M.); Prackenfels, VIII b (Sch.).  
*Lappa nemorosa* Körn. Nordabhang des Plösselbergs b. Hohenstadt, VIII b (Sch.).  
*Scorzonera humilis* L. Erlau b. Bamberg, VII a (P.).  
*Achyroperus maculatus* Scop. Zwischen Neuhaus und Krottensee auf kretacischer Alüberdeckung, VIII b (Sch.).  
*Taraxacum levigatum* DC. Großreuth-Gebersdorf b. Nürnberg, VIII c (P.).

- Crepis foetida* L. Auf dem Schlofsberg b. Pegnitz, VIII a (Sch.).  
*Xanthium spinosum* L. Herrenhütte b. Nürnberg, VIII a (M.).  
*Vaccinium oxycoccos* L. Hahnbach b. Amberg (außerhalb des Regnitzgebietes) VIII b (N.).  
*Pirola uniflora* L. Eschenau-Eggenheid, VIII a (Weisel).  
*Vinca minor* L. Siegersdorf, VIII a (Sch.).  
*Menyanthes trifoliata* L. Hagenhausen-Eismannsberg, VIII b (Dittmar); Alfalter, VIII a (Sch.).  
*Gentiana verna* L. Zwischen Andorf und Brückendorf; Seukkendorf (im September blühend!) (Sch.), VII b.  
*Gentiana solstitialis* Wettst. Betzenstein, VIII a (Kefler); Wiese zwischen Pommelsbrunn und Hartmannshof, VIII b (S.).  
*Erythraea pulchella* Fr. Hezles, auf braun. Jura, VIII a (P.).  
*Phacelia tanacetifolia*, Verwildert b. Fürth, VII b (Bogner).  
*Lappula myosotis* Mch. Erlenstegen (M.); Bahndamm b. Herrenhütte (Sch.), VIII a.  
*Pulmonaria montana* Lej. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Echium vulgare* L. fl. albo. Behringersdorf, VIII a (R.).  
*Solanum rostratum* Dun. Bahnhof Stein, VIII c (P.).  
*Physalis alkekengi* L. Hezles, im Jura, VIII a (P.); in Hopfengärten nächst dem Leitenwald b. Neustadt a. Aisch (Lehrbergschicht), VII a (Sch.).  
*Linaria elatine* Mill. Obersteinbach b. Scheinfeld, VII a (Sch.).  
*Linaria spuria* Mill. Hezles, VIII a (P.).  
*Linaria minor* Desf. Sehr große Exemplare an Dolomittfelsen b. Pottenstein, VIII a (Sch.).  
*Linaria arvensis* Desf. Ludwigshöhe b. Rückersdorf, VIII a (M.); Obersteinbach b. Scheinfeld, VII a (Sch.).  
*Veronica chamaedrys* L. f. *fugicola* Beck. Büchenbach, VII b (S.).  
 f. *rubriflora*. Wald b. Erlenstegen, VIII a (S.).  
*Veronica teucrium* L. Limbach b. Schwabach (K., S.), Veitsbrunn (S.), VII b.  
*Veronica teucrium* L. var. *maior* Schrd. und var. *minor* Schrd. Oberbürg b. Nürnberg, VIII a (S.).  
 var. *pseudochamaedrys* Beck. Hohenstadt, VIII a (S.).  
 var. *lasiocalyx* Beck. Im Gebiet nicht selten (S.).  
*Veronica serpyllifolia* L. v. *albiflora*. Waldweg b. Kalchreut, VIII a.  
 var. *tenella* All. Wegrand b. Büchenbach, VII b (S.).  
*Veronica arvensis* L. f. *nana* Lam. Marienberg b. Nürnberg, VIII a (S.).  
*Veronica verna* L. f. *Bellardii* Wulf. Erlenstegen b. Nürnberg, VIII a (S.).  
*Veronica triphyllos* L. var. *collina* Op. Ober- und Unterbürg b. Nürnberg, VIII b (S.).  
*Veronica opaca* Fr. Schnaittach, VIII a (S.).  
*Veronica hederifolia* L. var. *triloba* Op. Zwischen Großreuth und Gebersdorf b. Nürnberg, VIII c (P.).  
*Melampyrum cristatum* L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Alectorolophus*. Über Neufunde aus dieser Gattung vgl. Pöeverlein: „Die bayerischen Arten, Formen und Bastarde der Gattung *Alectorolophus*“ in Ber. der Bayer. Bot. Ges. Bd. X.  
*Euphrasia nemorosa* Pers. Zirndorf, VII b (Sch.).  
*Euphrasia gracilis* Fr. Vacher Sumpf, VII b (S.).  
*Salvia verticillata* L. Lachheim b. Scheinfeld, VII a (Sch.).  
*Nepeta cataria* L. Tüchersfeld, VIII a (Sch.).  
*Dracocephalus thymiflorus* L. Erlau b. Bamberg, VII a (P.).  
*Melittis melissophyllum* L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).  
*Aiuga genevensis* L. nov. f. *stolonifera* Semler. Mit oberirdischen, dem Boden anliegenden seitlichen Sprossen. Hirschbachtal b. Hersbruck, VIII a.  
*Aiuga chamaepitys* L. Abgeernteter Haberacker b. Hirschbach i. frk. Jura, VIII a (Dittmar).

- Teucrium botrys* L. Kilsheim b. Windsheim, VII a (Sch.).
- Pinguicula vulgaris* L. An feuchten Dolomittfelsen bei Pottenstein, VIII a (Sch.).
- Lysimachia punctata* L. Im „Himmelgarten“ zu Grünsberg, VIII b (Sch.).
- Primula farinosa* L. Egenhausen, VII b (Frau Dora Eckardt).
- Cyclamen Europaeum* L. Ein einziges blühendes Exemplar durch Herrn Frhr. v. Stromer jun. Ende Juli 1903 zwischen Grünsberg und Burgthann, VIII b, im Gebüsch gefunden und mir überreicht. Nach Mitteilung des Herrn Frhr. v. Stromer sen. wurde weder in Dorfgärten noch in Blumentöpfen jemals C. Eur. in Grünsberg gezogen (Chr. Scherzer).
- Globularia vulgaris* L. Wildenfels (Sch.); Spiess (K. R.); Stöppach, VIII a (Schiller).
- Litorea lacustris* L. nov. f. *stolonifera* Semler, mit wurzelnden Seitentrieben. Dechsendorf b. Erlangen, VII b (S.).
- Atriplex roseum* L. Bahndamm b. St. Leonhard, VIII c (H.).
- Aristolochia clematitis* L. Pommersfelden, VII a (Bauer).
- Euphorbia platyphyllos* L. Langenfeld, VII a; Atzelsberg, Alfalter, VIII a (Sch.).
- Euphorbia verrucosa* Lmk. Auf dem Lagerplatz des alten Bahnhofes zu Lauf auf Diluvialsand, VIII b (Sch.).
- Parietaria erecta* M. K. Marloffstein-Ratsberg, VIII a (M.).
- Castanea vesca* Gaertn. Im Wirtsgarten zu Hegnenberg b. Altdorf, auf Dogger (fruchtend!), VIII b (Sch.).
- Alnus incana* DC. Kanalbrücke b. Feucht, VIII b (Zahn).
- Salix nigricans* Sm. Schwarzachufer und Schlucht südlich des Schlosses zu Grünsberg, VIII b (Sch.).
- Elodea canadensis* R. et M. Alfalter, VIII a (Sch.).
- Potamogeton fluitans* Rth. var. *americanus* Cham. Katzwang, VIII c (H.).
- Potamogeton acutifolius* Lk. Anwanden, VII b (Rösel).
- Arum maculatum* L. Grub-Rasch, VIII b (P.); Ostabhang der Ehrenbürg, zwischen Muggendorf und Behringersmühle an der Landstrasse, VIII a (Sch.).
- Typha latifolia* L. Rollhofen, VIII a (K.).
- Orchis coriophora* L. Hahnbach b. Amberg, VIII b; außerhalb des Gebiets (N.).
- Coeloglossum viride* Hartm. Ittling, Klausberg, Riegelstein, VIII a (K.); Hahnbach b. Amberg, VIII b; außerhalb des Gebiets (N.).
- Ophrys muscifera* Hds. Spiess, Klausberg, VIII a (K.); Appelsberg, VIII b (M.).
- Cephalanthera rubra* Rich. Ittling, VIII a (Sch.).
- Leucoium vernum* L. Hartmannshof (Schübel); Stallbaum (M.), VIII b.
- Lilium martagon* L. In der Schlucht nördlich des Schlosses Grünsberg, auf rhät. Keuper, VIII b (Sch.).
- Allium ursinum* L. Sontheim, VII b (P.); häufig am Nordabhang des Schwanbergs, VII a (Sch.).
- Muscari comosum* Mill. Mögeldorf, VIII a (M.).
- Muscari racemosum* Mill. Verwildert b. Fürth, VIII c (Ziegler).
- Cyperus fuscus* L. Hezles im Jura, VIII a (H.); im Rüblinggrund nördlich von Baudenbach VII a (Sch.).
- Scirpus setaceus* L. nov. f. *stolonifera* Semler, mit seitlichen oberirdischen Sprossen. Dechsendorf b. Erlangen, VII b (S.).
- Scirpus maritimus* L. Wetzendorf b. Nürnberg, VIII a (Weger).
- Carex pulicaris* L. Eibach, VIII c (H.).
- Carex Schreberi* Schr. Wiese b. Kleinreuth b. Schweinau, VIII c (H.); die var. *curvata* Knaf. Eisenbahndamm b. Anwanden, VII b (H.); neu fürs Regnitzgebiet.
- Carex riparia* × *rostrata*. Leichendorf, VII b; neu für das Regnitzgebiet! (H.).
- Carex tomentosa* L. Wald b. Anwanden, VII b (H.).
- Carex pseudo-Cyperus* L. Eibach, VIII c (H.).
- Anthoxanthum Puelii* Lecq. et Lam. Nürnberg, Umgehungsbahn beim neuen Militärschießplatz, VIII c (P.).

- Melica picta* C. Koch. Windsheim, Gräf, VII a (P.).  
*Sclerochloa dura* P. B. Mkt. Bibart, nahe am Bahnhof (Sch.); Erkenbrechtshofen b. Windsheim, VII a (K.).  
*Festuca sulcata* Hack. Gipshügel b. Windsheim, VII a (H.).  
*Lolium perenne* L. Ziegelstein, Marienberg, VIII a (Honig).  
*Salvinia natans* All. In mehreren Gewässern um Nürnberg (eingesetzt!).  
*Azolla filiculoides* Lam. Desgl.  
*Lycopodium selago* L. Felsen der „Teufelskirche“ b. Grünsberg, VIII b (Sch.).  
*Lycopodium complanatum* L. Rinnenbrunn, VIII b (Dittmar).  
*Lycopodium chamaecyparissus* A. Br. Ochenbruck, VIII b (Sch.).  
*Botrychium lunaria* L. Buschschwabach, VII b (Kaiser); Bürtel, VIII a (S.).  
*Ophioglossum vulgatum* L. Gibitzenhof, VIII b (H.).  
*Asplenium viride* Huds. Hirschbach im Jura, Kanalschleuse b. Gibitzenhof im Keuper, VIII b (H.).  
*Scolopendrium vulgare* L. Pommelsbrunn (M.); Hartmannshof (Schübel), VIII b.

### Anhang.

Eine Revision der Gruppe *Viola arvensis-tricolor* durch Herrn W. Becker-Hedersleben ergab auch für die bayerische Flora einige bemerkenswerte neue Standorte, die mit Erlaubnis des Herrn Autors hier angefügt seien.

*Viola arvensis* Murr. Moosach b. München (C. J. Mayer).

*Viola arvensis-tricolor*.

1. *verg. paullum ad V. tricolore* L. (corollis luteis calycem superant.)

Kleeäcker zwischen Anwenden und Unterbüchlein; Wald b. Großreuth b. Schw. (Nürnberg); Gebersdorf, Gibitzenhof, Sickersdorf b. Rofsstall im Getreide (sämtliche O. Prechtelsbauer); zwischen Zankelstein und Bürtel b. Hersbruck (Semler); Landshut.

2. *verg. potius ad V. tricolore* L. (coroll.  $\pm$  vel. totius violac. calyc. superant.)

Gebersdorf, Kleeäcker zwischen Anwenden und Unterbüchlein (Prechtelsbauer); Wiese b. Oberbürg, Nürnberg (Semler).

*Viola tricolor* L. Wiesenrand b. Gebersdorf; unterhalb Stein (Prechtelsbauer); Oberstdorf an der Trettach (J. Bornmüller); Reichenhall (Haußknecht); Marquardstein in campis, Oberbayern (Ross); Kufstein, sonnige Abhänge b. Urfeld am Walchensee (C. J. Mayer) 800 m; Memmingen 670 m in agris (Holler); Hohenstadt b. Hersbruck, in agris, *flor. luteis conspicuis* (Semler).

NB. Die Mutation der *Viola arvensis* in *V. tricolor* hängt ohne Zweifel mit den Feuchtigkeitsverhältnissen der betreffenden Gegend bzw. des Standortes zusammen.

Nürnberg, im November 1905.

## Beiträge zur Flora der bayerischen Pfalz.

Von Dr. Hermann Pöeverlein.

Die in der letzten Generalversammlung unserer Gesellschaft beschlossene Ausdehnung ihres Wirkungskreises auf die bayerische Pfalz gibt Anlaß, die wichtigeren erst in neuerer Zeit bekannt gewordenen Vorkommnisse pfälzischer Phanerogamen und Gefäßskryptogamen im Zusammenhange zu veröffentlichen. Hiefür bestand umso mehr ein Bedürfnis, als die Flora der Pfalz seit dem Erscheinen von Prantls „Exkursionsflora für das Königreich Bayern“ (Stuttgart 1884) und Georgiis „Exkursionsflora für die Rheinpfalz“ (ibid. 1894)<sup>1)</sup> keine zusammenfassende Darstellung mehr erfahren hat.

1) Prantls Exkursionsflora konnte bei dem Umfange des in ihr behandelten Gebietes selbstverständlich nur ziemlich allgemein und kurz gefasste Fundortsangaben bringen. Das Buch Georgiis schließt sich enge an sie an (vgl. hiezu Zahn in ABZ. I. 68 f. [1895] und Hindenlang in Mitt. der Pollichia. LVII. Jahrg. Nr. 13. 1 f., 7 f., 11 ff., 18 f., 28 f., 35 f., 40 f., 49 f., 52 f., 54 [1900]).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [1\\_1906](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. Zusammengestellt vom Botanischen Verein Nürnberg. 493-497](#)