

Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

Zusammengestellt vom Botanischen Verein Nürnberg.

(Vgl. Deutsche Bot. Monatsschrift 1900/01.)

- Clematis vitalba* L. Zwischen Dehnberg und Simonshofen, auf Rhätkeuper, VIII a (Sch.)¹⁾.
- Anemone silvestris* L. Ritzmannshof, im mittleren Keuper (P., H. und Rösel), VII b.
- Adonis aestivalis* L. nebst var. *citrinus* Hffm. Thalmässing, VIII c (Honig).
- Myosurus minimus* L. Neustadt a. A., VIII a (S., Sch.).
- Ranunculus auricomus* L. f. *reniformis* Kittel. Leichendorf b. Zirndorf, VIII b; Westheim und Sontheim b. Windsheim, VII a (P.).
- Trollius Europaeus* L. Spalt, VIII c (Haagen).
- Aconitum variegatum* L. Lichtenstein, VIII b (H.).
- Fumaria Vaillantii* Loisl. Gibitzenhof, VIII b (P.).
- Dentaria bulbifera* L. Ludwigshöhe (N.); Berge b. Sichersdorf (Schnaittach) (H.); Streitberg und Leutzdorf (Kefslér), VIII a.
- Erysimum crepidifolium* Rchb. Eschenbach b. Hersbruck, bis herab in den Dogger, VIII b (Sch.).
- Erucastrum Pollichii* Sch. et Sp. Münchener Bahnstrecke b. Schweinau, VIII c (P.); häufig zwischen Haltestelle und Dorf Clarsbach am Straßendrand, VII b (Sch.).
- Lunaria rediviva* L. Am Eibenfels b. Klausberg, VIII a (K.).
- Cochlearia officinalis* L. Artelshofen, VIII a (Dittmar).
- Thlaspi perfoliatum* L. Im Keuper b. Erlenstegen, VIII a (M.); Rügland, VII b (P.); Neustadt, VII b (S., Sch.).
- Lepidium draba* L. Köpfwasen b. Neustadt und Unterstrahlbach (Sch.), VII b; Bahnhof Hartmannshof (H.), VIII b.
- Lepidium campestre* R. Br. Spiels, Poppenhof b. Osternohe (K.), VIII a.
- Coronopus Ruellii* All. Mkt. Bibart, unter der Eisenbahnbrücke b. Langenfeld, VII a (Sch.).
- Isatis tinctoria* L. Bahnstation Eibach, VIII c; Bahndamm b. Kirchfembach, VII b (Sch.); Neustadt (M.), VII b.
- Viola hirta* × *odorata* f. *permixta* Jord. Neustadt, VII b (S.).
- Viola canina* × *silvestris*. Gräf b. Windsheim, VII a (S.).
- Viola pumila* Chaix. Windsheim, VII a (P.).
- Dianthus armeria* L. Baudenbach, VII a; häufig am „Hohen Schlag“ b. Grünsberg, VIII b (Sch.).
- Saponaria officinalis* L. Im Dolomit- und Werkkalkhorizont an dem Straßenzug Pegnitz-Pottenstein-Behringermühle-Muggendorf-Streitberg öfter am Straßendrand, so bei Ebersberg, Pottenstein, Tüchersfeld, Stämpfermühle, Muggendorf, VIII a (Sch.).
- Vaccaria parviflora* Mnch. var. *nobilis* A. Schwarz. Erlenstegen, VIII a (M.).
- Alsine verna* Bartl. Klausberg, VIII a (K., R.); am Etzelwanger Keller, VIII b (Sch.).
- Stellaria glauca* With. Marienberg, VIII a (Honig); Dechsendorf, VII b (P.).
- Acer campestre* L. Ein sehr alter und großer Baum am „Kellerhaus“ in Kirchröttenbach, VIII a (Sch.).
- Cytisus nigricans* L. Königstein-Bernhof (H.); zwischen Neuhaus und Krottensee (Sch.). VIII b.
- Trifolium ochroleucum* L. Ritzmannshof. VII b (M.); Mkt. Bibart, VII a (Sch.).
- Trifolium fragiferum* L. nov. f. *divulsa* O. Prechtelsbauer: der untere Teil des Blütenköpfchens ist abgerückt. Westheim b. Windsheim, VII b (P.).
- Ornithopus sativus* Brot. An der Haltestelle Clarsbach (Sch.); Bahnkörper zwischen Zirndorf und Weiherhof (Abraham). VII b.
- Vicia dumetorum* L. Auf Waldblößen b. Prackenfels (Rhätkeuper), VIII b (Sch.).

1) Namensabkürzungen für die Finder: Heller (H.), Kaufmann (K.), Meister (M.), Niebler (N.), Prechtelsbauer (P.), Riedner (R.), Scherzer (Sch.), Semler (S.).

- Vicia Pannonica* Jacq. Um Windsheim, VII a (Sch.).
Vicia Pannonica Jacq. var. *purpurascens* Koch. Rothenberg b. Burgfarrnbach, VII b (H.); Windsheim, VII a (Sch.).
Vicia Cassubica L. Pommersfelden, VII a (Bauer).
Potentilla alba L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).
Alchimilla arvensis Scop. Siegelsdorf, VII b; Obersteinbach b. Scheinfeld, VII a (Sch.); Gebersdorf, VII b (H.).
Agrimonia odorata Mill. Reuth b. Lauf (Sch.), VIII b.
Spiraea filipendula L. Sontheim, VII b (P.).
Spiraea aruncus L. Häufig am Nordabhang des Schwanbergs, VII a (Sch.).
Pirus terminalis Ehrh. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).
Myriophyllum verticillatum L. Stein, VIII c (H.).
Bryonia alba L. Röthenbach b. Altdorf, VII b (Sch.).
Herniaria glabra L. Bei Weinhof auf Lias; auf dem Hutanger zu Schönberg auf rhätischem Keuper (Sch.), VIII b.
Sempervivum soboliferum Sims. Riegelstein, VIII a (K., R.).
Chrysosplenium oppositifolium L. Enzendorf und Artelshofen, VIII a (Dittmar).
Astrantia maior L. Rinnenbrunn, VIII b (H.); am Fuss des „Hansgörgel“ b. Reichen schwand, VIII a (Zahn); häufig am Waldabhang nördlich von Höhenberg b. Neumarkt, VIII b (Sch.).
Eryngium campestre L. Terrasse vor dem Restaurationsgebäude auf dem Schwan berg, auf Lehrbergschicht, VII a (Sch.).
Oenanthe fistulosa L. Pommersfelden, VII a (Bauer).
Seseli annuum L. Häufig westlich der Burg Veldenstein auf kretacischen Bildungen, VIII a; Ritzmannshof im mittleren Keuper, VII b (Sch.).
Libanotis montana Crntz. Schütters- und Stämpfermühle, VIII a (Sch.).
Torilis infesta Koch. Roth im Keuper, VIII c (Honig).
Peucedanum oreoselinum Mnch. Atzelsberg (Sch.).
Caucalis daucoides L. Mkt. Bibart. VII a (Sch.).
Turgenia latifolia Hffm. Mkt. Bibart. VII a (Sch.).
Scandix pecten Veneris L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).
Lonicera periclymenum L. Eibach, VIII c (P.); Rosstall, Bürglein, VII b (Sch.).
Lonicera caprifolium L. Zwischen Bürglein und Grofshabersdorf. VII b (Sch.).
Asperula arvensis L. Arzlohe, VIII b (Rösel).
Galium boreale L. Abenberg, VII b (Bauer).
Galium rotundifolium L. Altdorf-Rieden (H.); Lichteneck, VIII b (M.), Michelsberger Wald b. Bamberg, VII a (P.).
Petasites albus Gaertn. Artelshofen, VIII a (Dittmar).
Inula conyzoides DC. Auf Diluvialsand; Herrenhütte b. Nürnberg, VIII a (Sch.).
Pulicaria vulgaris Grtr. Langenfeld, Baudenbach, VII a (Sch.).
Galinsoga parviflora Cav. Kirchröttenbach, VIII a (Sch.).
Rudbeckia laciniata L. „Himmelgarten“ zu Grünsberg b. Altdorf, VIII b (Sch.).
Matricaria discoidea DC. Schloßhof zu Grünsberg, neuer Güterbahnhof Nürnberg, Mögeldorf, St. Jobst, VIII b und VIII a.
Chrysanthemum corymbosum L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).
Senecio spathulifolius DC. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).
Senecio aquaticus Huds. Grünsberg, VIII b (Sch.).
Cirsium eriophorum Scop. Ritzmannshof im mittleren Keuper, VII b (Sch.).
Carduus crispus L. Vor dem Schlosseingang zu Grünsberg, VIII b (Sch.).
Carduus crispus × *nutans* L. Erlenstegen, VIII a (M.); Prackenfels, VIII b (Sch.).
Lappa nemorosa Körn. Nordabhang des Plösselbergs b. Hohenstadt, VIII b (Sch.).
Scorzonera humilis L. Erlau b. Bamberg, VII a (P.).
Achyrophorus maculatus Scop. Zwischen Neuhaus und Krottensee auf kretacischer Albüberdeckung, VIII b (Sch.).
Taraxacum levigatum DC. Grofsreuth-Gebersdorf b. Nürnberg, VIII c (P.).

- Crepis foetida* L. Auf dem Schlossberg b. Pegnitz, VIII a (Sch.).
Xanthium spinosum L. Herrenhütte b. Nürnberg, VIII a (M.).
Vaccinium oxycoccus L. Hahnbach b. Amberg (ausserhalb des Regnitzgebietes) VIII b (N.).
Pirola uniflora L. Eschenau-Eggenheid, VIII a (Weisel).
Vinca minor L. Siegersdorf, VII a (Sch.).
Menyanthes trifoliata L. Hagenhausen-Eismannsberg, VIII b (Dittmar); Altfalter, VIII a (Sch.).
Gentiana verna L. Zwischen Andorf und Brückendorf; Seukkendorf (im September blühend!) (Sch.), VII b.
Gentiana solstitialis Wetst. Betzenstein, VIII a (Kessler); Wiese zwischen Pommelsbrunn und Hartmannshof, VIII b (S.).
Erythraea pulchella Fr. Hezles, auf braun. Jura, VIII a (P.).
Phacelia tanacetifolia, Verwildert b. Fürth, VII b (Bogner).
Lappula myosotis Mnch. Erlenstegen (M.); Bahndamm b. Herrenhütte (Sch.), VIII a.
Pulmonaria montana Lej. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).
Echium vulgare L. fl. albo. Behringersdorf, VIII a (R.).
Solanum rostratum Dun. Bahnhof Stein, VIII c (P.).
Physalis alkekengi L. Hezles, im Jura, VIII a (P.); in Hopfengärten nächst dem Leitenwald b. Neustadt a. Aisch (Lehrbergschicht), VII a (Sch.).
Linaria elatine Mill. Obersteinbach b. Scheinfeld, VII a (Sch.).
Linaria spuria Mill. Hezles, VIII a (P.).
Linaria minor Desf. Sehr grosse Exemplare an Dolomitfelsen b. Pottenstein, VIII a (Sch.).
Linaria arvensis Desf. Ludwigshöhe b. Rückersdorf, VIII a (M.); Obersteinbach b. Scheinfeld, VII a (Sch.).
Veronica chamaedrys L. f. *fagicola* Beck. Büchenbach, VII b (S.).
f. rubriflora. Wald b. Erlenstegen, VIII a (S.).
Veronica teucrium L. Limbach b. Schwabach (K., S.), Veitsbronn (S.), VII b.
Veronica teucrium L. var. *maior* Schrd. und var. *minor* Schrd. Oberbürg b. Nürnberg, VIII a (S.).
var. *pseudochamaedrys* Beck. Hohenstadt, VIII a (S.).
var. *lasiocalyx* Beck. Im Gebiet nicht selten (S.).
Veronica serpyllifolia L. v. *albiflora*. Waldweg b. Kalchreut, VIII a.
var. *tenella* All. Wegrand b. Büchenbach, VII b (S.).
Veronica arvensis L. f. *nana* Lam. Marienberg b. Nürnberg, VIII a (S.).
Veronica verna L. f. *Bellardii* Wulf. Erlenstegen b. Nürnberg, VIII a (S.).
Veronica triphyllum L. var. *collina* Op. Ober- und Unterbürg b. Nürnberg, VIII b (S.).
Veronica opaca Fr. Schnaittach, VIII a (S.).
Veronica hederifolia L. var. *triloba* Op. Zwischen Großreuth und Gebersdorf b. Nürnberg, VIII c (P.).
Melampyrum cristatum L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).
Alectrolophus. Über Neufunde aus dieser Gattung vgl. Poeverlein: „Die bayerischen Arten, Formen und Bastarde der Gattung Alectrolophus“ in Ber. der Bayer. Bot. Ges. Bd. X.
Euphrasia nemorosa Pers. Zirndorf, VII b (Sch.).
Euphrasia gracilis Fr. Vacher Sumpf, VII b (S.).
Salvia verticillata L. Lachheim b. Scheinfeld, VII a (Sch.).
Nepeta cataria L. Tüchersfeld, VIII a (Sch.).
Dracocephalus thymiflorus L. Erlau b. Bamberg, VII a (P.).
Melittis melissophyllum L. Mkt. Bibart, VII a (Sch.).
Aiuga genevensis L. nov. f. *stolonifera* Semler. Mit oberirdischen, dem Boden anliegenden seitlichen Sprossen. Hirschbachtal b. Hersbruck, VIII a.
Aiuga chamaepitys L. Abgeernteter Haberacker b. Hirschbach i. frk. Jura, VIII a (Dittmar).

- Teucrium botrys L.* Külshausen b. Windsheim, VII a (Sch.).
Pinguicula vulgaris L. An feuchten Dolomitfelsen bei Pottenstein, VIII a (Sch.).
Lysimachia punctata L. Im „Himmelgarten“ zu Grünsberg, VIII b (Sch.).
Primula farinosa L. Egenhausen, VII b (Frau Dora Eckardt).
Cyclamen Europaeum L. Ein einziges blühendes Exemplar durch Herrn Frhr. v. Stromer jun. Ende Juli 1903 zwischen Grünsberg und Burgthann, VIII b, im Gebüsch gefunden und mir überreicht. Nach Mitteilung des Herrn Frhr. v. Stromer sen. wurde weder in Dorfgärten noch in Blumentöpfen jemals C. Eur. in Grünsberg gezogen (Chr. Scherzer).
Globularia vulgaris L. Wildenfels (Sch.); Spiess (K. R.); Stöppach, VIII a (Schiller).
Litorella lacustris L. nov. f. stolonifera Semler, mit wurzelnden Seitentrieben. Dechsendorf b. Erlangen, VII b (S.).
Atriplex roseum L. Bahndamm b. St. Leonhard, VIII c (H.).
Aristolochia clematitis L. Pommersfelden, VII a (Bauer).
Euphorbia platyphyllos L. Langenfeld, VII a; Atzelsberg, Altfalter, VIII a (Sch.).
Euphorbia verrucosa Lmk. Auf dem Lagerplatz des alten Bahnhofes zu Lauf auf Diluvialsand, VIII b (Sch.).
Parietaria erecta M. K. Marloffstein-Ratsberg, VIII a (M.).
Castanea vesca Gaertn. Im Wirtsgarten zu Hegnenberg b. Altdorf, auf Dogger (fruchtend!), VIII b (Sch.).
Alnus incana DC. Kanalbrücke b. Feucht, VIII b (Zahn).
Salix nigricans Sm. Schwarzachufer und Schlucht südlich des Schlosses zu Grünsberg, VIII b (Sch.).
Elodea canadensis R. et M. Altfalter, VIII a (Sch.).
Potamogeton fluitans Rth. var. americanus Cham. Katzwang, VIII c (H.).
Potamogeton acutifolius Lk. Anwanden, VII b (Rösel).
Arum maculatum L. Grub-Rasch, VIII b (P.); Ostabhang der Ehrenbürg, zwischen Muggendorf und Behringersmühle an der Landstraße, VIII a (Sch.).
Typha latifolia L. Rollhofen, VIII a (K.).
Orchis coriophora L. Hahnbach b. Amberg, VIII b; außerhalb des Gebiets (N.).
Coeloglossum viride Hartm. Ittling, Klausberg, Riegelstein, VIII a (K.); Hahnbach b. Amberg, VIII b; außerhalb des Gebiets (N.).
Ophrys muscifera Hds. Spiess, Klausberg, VIII a (K.); Appelsberg, VIII b (M.).
Cephalanthera rubra Rich. Ittling, VIII a (Sch.).
Leucoium vernum L. Hartmannshof (Schübel); Stallbaum (M.), VIII b.
Lilium martagon L. In der Schlucht nördlich des Schlosses Grünsberg, auf rhät. Keuper, VIII b (Sch.).
Allium ursinum L. Sontheim, VII b (P.); häufig am Nordabhang des Schwanbergs, VII a (Sch.).
Muscati comosum Mill. Mögeldorf, VIII a (M.).
Muscati racemosum Mill. Verwildert b. Fürth, VIII c (Ziegler).
Cyperus fuscus L. Hezles im Jura, VIII a (H.); im Rüblinggrund nördlich von Baudenbach VII a (Sch.).
Scirpus setaceus L. nov. f. stolonifera Semler, mit seitlichen oberirdischen Sprossen. Dechsendorf b. Erlangen, VII b (S.).
Scirpus maritimus L. Wetzendorf b. Nürnberg, VIII a (Weger).
Carex pulicaris L. Eibach, VIII c (H.).
Carex Schreberi Schr. Wiese b. Kleinreuth b. Schweinau, VIII c (H.); die var. *curvata* Knaf. Eisenbahndamm b. Anwanden, VII b (H.); neu fürs Regnitzgebiet.
Carex riparia × *rostrata*. Leichendorf, VII b; neu für das Regnitzgebiet! (H.).
Carex tomentosa L. Wald b. Anwanden, VII b (H.).
Carex pseudo-Cyperus L. Eibach, VIII c (H.).
Anthoxanthum Puelii Lecq. et Lam. Nürnberg, Umgehungsbahn beim neuen Militärschießplatz, VIII c (P.).

- Melica picta C. Koch.* Windsheim, Gräf, VII a (P.).
Sclerochloa dura P. B. Mkt. Bibart, nahe am Bahnhof (Sch.); Erkenbrechtshofen b. Windsheim, VII a (K.).
Festuca sulcata Hack. Gipshügel b. Windsheim, VII a (H.).
Lolium perenne L. Ziegelstein, Marienberg, VIII a (Honig).
Salvinia natans All. In mehreren Gewässern um Nürnberg (eingesetzt!).
Azolla filiculoides Lam. Desgl.
Lycopodium selago L. Felsen der „Teufelskirche“ b. Grünsberg, VIII b (Sch.).
Lycopodium complanatum L. Rinnenbrunn, VIII b (Dittmar).
Lycopodium chamaecyparissus A. Br. Ochenbruck, VIII b (Sch.).
Botrychium lunaria L. Buschschwabach, VII b (Kaiser); Bürtel, VIII a (S.).
Ophioglossum vulgatum L. Gibitzenhof, VIII b (H.).
Asplenium viride Huds. Hirschbach im Jura, Kanalschleuse b. Gibitzenhof im Keuper, VIII b (H.).
Scolopendrium vulgare L. Pommelsbrunn (M.); Hartmannshof (Schübel), VIII b.

Anhang.

Eine Revision der Gruppe *Viola arvensis-tricolor* durch Herrn W. Becker-Hedersleben ergab auch für die bayerische Flora einige bemerkenswerte neue Standorte, die mit Erlaubnis des Herrn Autors hier angefügt seien.

Viola arvensis Murr. Moosach b. München (C. J. Mayer).

Viola arvensis-tricolor.

1. *verg. paullum ad V. tricolorem L.* (corollis luteis calycem superant.)

Kleeäcker zwischen Anwanden und Unterbüchlein; Wald b. Großreuth b. Schw. (Nürnberg); Gebersdorf, Gibitzenhof, Sichersdorf b. Rossstall im Getreide (sämtliche O. Prechtelsbauer); zwischen Zankelstein und Bürtel b. Hersbruck (Semler); Landshut.

2. *verg. potius ad V. tricolorem L.* (coroll. ± vel. totius violac. calyc. superant.)

Gebersdorf, Kleeäcker zwischen Anwanden und Unterbüchlein (Prechtelsbauer); Wiese b. Oberbürg, Nürnberg (Semler).

Viola tricolor L. Wiesenrand b. Gebersdorf; unterhalb Stein (Prechtelsbauer); Oberstdorf an der Trettach (J. Bornmüller); Reichenhall (Haufsknecht); Marquardstein in campis, Oberbayern (Ross); Kufstein, sonnige Abhänge b. Urfeld am Walchensee (C. J. Mayer) 800 m; Memmingen 670 m in agris (Holler); Hohenstadt b. Hersbruck, in agris, flor. luteis conspicuis (Semler).

NB. Die Mutation der *Viola arvensis* in *V. tricolor* hängt ohne Zweifel mit den Feuchtigkeitsverhältnissen der betreffenden Gegend bzw. des Standortes zusammen.

Nürnberg, im November 1905.

Beiträge zur Flora der bayerischen Pfalz.

Von Dr. Hermann Poeverlein.

Die in der letzten Generalversammlung unserer Gesellschaft beschlossene Ausdehnung ihres Wirkungskreises auf die bayerische Pfalz gibt Anlaß, die wichtigeren erst in neuerer Zeit bekannt gewordenen Vorkommnisse pfälzischer Phanerogamen und Gefäßkryptogamen im Zusammenhange zu veröffentlichen. Hierfür bestand umso mehr ein Bedürfnis, als die Flora der Pfalz seit dem Erscheinen von Prantls „Exkursionsflora für das Königreich Bayern“ (Stuttgart 1884) und Georgiis „Exkursionsflora für die Rheinpfalz“ (ibid. 1894)¹⁾ keine zusammenfassende Darstellung mehr erfahren hat.

1) Prantls Exkursionsflora konnte bei dem Umfange des in ihr behandelten Gebietes selbstverständlich nur ziemlich allgemein und kurz gefaßte Fundortsangaben bringen. Das Buch Georgiis schließt sich enge an sie an (vgl. hiezu Zahn in ABZ. I. 68 f. [1895] und Hindenlang in Mitt. der Pollichia. LVII. Jahrg. Nr. 13. 1 f., 7 f., 11 ff., 18 f., 28 f., 35 f., 40 f., 49 f., 52 f., 54 [1900]).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft
zur Erforschung der heimischen Flora](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [1_1906](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. Zusammengestellt
vom Botanischen Verein Nürnberg. 493-497](#)