- Griegl). — IV: Natternberg, Bez.-A. Bad Aibling, in Wäldern; 520 m; nicht häufig; auf der Rinde von *Alnus incana* DC.; e. fr. und mit Gemmen; begleitet von *Metzgeria fureata* (L.) Lindbg.; 1. 9. 05. — Feuchter, schattiger Graben im Walde bei Abel, Bez.-A. Bad Aibling; 530 m; ziemlich häufig; auf der Rinde verschiedener Laubbäume; e. cal.; 25. 8. 05. — Siehe *Frullania dilatata* p. 14.
- Madotheca platyphylla* (L.) Dumortier. III: In den Anlagen bei Trostberg; schattig; ca. 510 m; nicht besonders häufig, an der Rinde junger Tannen; steril; 21. 5. 04.
- Eulejeunea serpyllifolia* (Dickson) Spruce. IV: Siehe *Frullania tamarisci* p. 14.
- Frullania dilatata* (L.) Dumortier. IV: Bei Bichl, Bez.-A. Tölz; ca. 625 m; auf *Fagus sylvatica* L.; e. cal.; mit *Radula complanata* (L.) Dum.; 16. 4. 06 (Schellenberg). — Feuchte, schattige Schlucht im Walde bei Abel, Bez.-A. Bad Aibling; 530 m; nicht häufig; auf Baumrinde; steril und ♂; 25. 8. 05. — Am Irsehenberg bei Öd; Waldrand, trocken; ca. 600 m; nicht häufig; auf der Rinde von *Fagus sylvatica* L.; steril, ♂ und e. cal.; mit *Radula complanata* (L.) Dum.; 31. 8. 06. — Am erratischen Block an der Strafe von Au bei Aibling nach Miesbach, Südseite; sehr trocken; ca. 600 m; nicht häufig; steril; 26. 12. 05.
- Frullania fragilifolia* Taylor. Schattige, feuchte Schlucht im Walde bei Abel, Bez.-A. Bad Aibling; 530 m; häufig, auf der Rinde von Weifstannen; steril; mit *Metzgeria fureata* (L.) Lindberg; 25. 8. 05.
- Frullania tamarisci* (L.) Dumortier. IV: Schattige, feuchte Schlucht im Walde bei Abel, Bez.-A. Bad Aibling; 530 m; ziemlich häufig; auf der Rinde von *Alnus incana* DC.; e. cal.; mit *Eulejeunea serpyllifolia* (Dickson) Spruce; 25. 8. 05.

IV. Anthocerotaceae.

- Anthoceros levis* Linné. III: Äcker bei Berbling, Bez.-A. Bad Aibling, nicht besonders feucht; ca. 490 m; sehr häufig, auf Ackererde; e. fr.; mit *Anthoceros punctatus* L. e. fr., *Riccia glauca* L. und einer *Fossombronia*; 11. 9. 05. — IV: Brachäcker bei Natternberg, Bez.-A. Bad Aibling, feuchte Stellen; 520 m; ziemlich häufig, auf Ackererde; e. fr.; unter Stoppeln und verschiedenen Phanerogamen; September 05.
- Anthoceros punctatus* Linné. III: Siehe *Anthoceros levis*. — IV: Natternberg, Bez.-A. Bad Aibling, auf feuchten Äckern; 520 m; nicht häufig; e. fr.; unter verschiedenen Phanerogamen; Ende August 05.

Zur Flora des Aischgebietes.

Von Pfarrer Hanemann in Lonnerstadt.

Die im folgenden gegebene Zusammenstellung liefert eine größere Anzahl neuer Fundorte für Gefäßkryptogamen und Phanerogamen, die weder in Prantls Exkursionsflora für das Königreich Bayern noch in der seither erschienenen floristischen Literatur enthalten sind. Vgl. A. Schwarz, Flora von Nürnberg-Erlangen; Hanemann, Neue Standorte von Pflanzen für die Bezirke VIIa und III („Mitteilungen“ Nr. 23 p. 242); Botanischer Verein Nürnberg, Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes („Mitteilungen“ Nr. 38 p. 493). Wo keine besondere Angabe beigefügt ist, ist das Substrat Keuper.

- Pilularia globulifera* L. In mehreren Weihern bei Schwarzenbach, Grofsneuses, Ailersbach (Bez.-A. Höchststadt a. Aisch), z⁵ (VII b), Schmiedelberg und Retzelsdorf bei Weisendorf und bei Weisendorf (VII b).
- Lycopodium inundatum* L. Im Bürgerwald bei Höchststadt a. A., z² (VII b), Schmiedelberg bei Weisendorf an einem Weiher vor dem nach Weisendorf zu gelegenen Wald, z³ (VII b).
- Gagea pratensis* Schult. Unterwinterbach beim Schulhause, z³ (VII a), Rohensaas bei Uhlfeld, z³ (VII b); Lonnerstadt, Äcker auf dem Galgenberg auf Lias, z⁵ (VII a).

- Ornithogalum nutans* L. Nördlich von Lonnerstadt und zwischen Lonnerstadt und Sichertshof, z⁵ (VII a), Weingartsgreuth (VII a), Höchststadt a. A. Äcker nach Westen zu, z⁴ (VII a); Kairlindach (VII b).
- Allium ursinum* L. Handthal bei Ebrach in einem sumpfigen Wäldchen, z⁵ (VII a), Sulzheimer Wald bei Gerolzhofen, z⁴ (VII a).
- A. fallax* Don. Hohlweg im Walde zwischen Uhlstadt und Unternesselbach auf Gipskeuper, z⁵, ca. 350 m (VII a).
- A. vineale* L. typ. G. B. Lonnerstadt auf dem Galgenberg auf Lias, z³ (VII a).
- Anthericum ramosum* L. Zentbechhofen auf Lias, z³ (VII a).
- Juncus tenuis* Willd. Am Fußweg zwischen Ailsbach und Lonnerstadt, z² (VII a).
- J. Tenagea*¹⁾ Ehrh. Zwischen Ailersbach und Gottesgab bei Ühlfeld, z³ (VII b); zwischen Schwarzenbach—Grofsneuses bei Höchststadt a. A., z² (VII b).
- J. capitatus* Weig. Weingartsgreuth an der Anhöhe nach dem Staatswalde zu und in einem Wäldchen nach Horbach zu, z³ (VII a).
- J. supinus* M. Bürgerwald bei Höchststadt a. Aisch, z³ (VII b), Gottesgab bei Ühlfeld (VII b), je nach dem Wasserstand an und in Weihern: *f. uliginosus* Roth z. B. Klebheim (VII b), zwischen Schwarzenbach—Grofsneuses bei Höchststadt a. A. (VII b) und *fluitans* Lam. bei Höchststadt a. A. nach Krausenbachhofen zu, z³ (VII b).
- J. alpinus* Vill. Schwarzenbach und Ailersbach bei Höchststadt a. A., z³ und öfters (VII b).
- Lemna trisulca* L. Unterwinterbach in der Weisach, z⁴ (VII a).
- Potamogeton pectinatus* L. *f. scoparius* Wallr. In einem kleinen Weiher bei Fetzelhofen (VII a).
- P. pectin.* *f. interruptus* Asch. In der Aisch bei Sterpersdorf, Bez.-A. Höchststadt a. A., z³.
- P. alpinus* B. *purpurascens* Asch. et G. Moorbach bei Hesselberg (VII b), Reumannswind und Eckersbach bei Schlüsselfeld (VII a).
- P. alpinus* B. *v. obscurus* Asch. et G. Röthenbach bei Dechsendorf, z⁵.
- P. fluitans* B. In d. Ehe zwischen Stübach—Langenfeld, z⁴ (VII a).
- P. lucens* L. *f. acuminatus* Fries. In der Umgebung von Lonnerstadt—Höchststadt a. A.—Ühlfeld (VII a und VII b) die vorherrschende Form.
- P. Zizii* M. et K. *var. sublacustris* Fisch. Weiher beim Bahnhof Höchststadt a. A., z³ (VII b).
- P. Zizii* M. et K. *var. substagnalis* Fisch. Fetzelhofen bei Lonnerstadt in einem kleinen Weiher, z³ (VII a).
- P. Zizii* M. et K. *var. substagnalis* Fisch. *f. riparius* . . . (*var. coriaceus* Nolte). Weiher in der Nähe des Bahnhofs Höchststadt a. A.²⁾
- P. gramineus* L. *f. graminifolius* Fr. Adelsdorf—Weppersdorf; Ailersbach—Gottesgab (VII b).
- P. gram.* *f. heterophyllus* Fries. Um Höchststadt a. A.—Lonnerstadt—Ühlfeld—Weisendorf, z⁵ (VII b).
- P. gramineus* L. *terrester* Fries. In den zwei heißen dürren Sommern der Jahre 1904 und 1905 oft im ganzen Weihergebiete westlich von Erlangen bis Lonnerstadt—Ühlfeld (VII b).
- P. compressus* L. Kieferndorf bei Höchststadt a. A., z¹ (VII a).
- P. acutifolius* Link. Schwarzenbach bei Höchststadt a. A. (VII b), Sintmann bei Weisendorf (VII b); Medbach bei Höchststadt a. A. (VII a).

1) Nachdem nunmehr die Regeln der botanischen Nomenklatur, angenommen vom Internationalen Botanischen Kongress zu Wien 1905, im Druck erschienen sind (Verlag von Gustav Fischer in Jena 1906, Preis 2,50 M.), wird künftig die hier geforderte bzw. empfohlene Schreibweise auch in den Publikationen der Bayer. Bot. Gesellschaft beobachtet werden. Nr. X der „Empfehlungen“ lautet: Alle spezifischen Namen schreibt man mit kleinen Anfangsbuchstaben; davon sind ausgenommen alle von Personennamen abgeleiteten Namen (substantivische wie adjektivische) sowie diejenigen spezifischen Namen, die substantivische oder adjektivische Gattungsnamen darstellen. Beispiele: *Ficus indica*, *Circaea lutetiana*, *Brassica Napus*, *Lythrum Hyssopifolia*, *Aster novibelgii*, *Malva Tournefortiana*, *Phyteuma Halleri*. (Die Redaktion.)

2) Die aufgeführten Potameen sind von Herrn Prof. Dr. Fischer in Bamberg durchgesehen, bestätigt und in einigen Fällen berichtigt worden.

- P. acutif. L. f. maior* Fieber. Adelsdorf in einem Weiher nach dem Kellerhäuschen zu, z² (VII b).
- P. obtusifolius M. et K. f. latifolius* Fieber. Waldweiher im Bürgerwald bei Höchststadt a. A., z³ (VII b); Ailersbach bei Höchststadt a. A., z² (VII b), Schwarzenbach—Großsneuses, z³ (VII b); Adelsdorf—Weppersdorf, z³ (VII b).
- P. crispus L. f. obtusifolius* Fieber. In der Weisach bei Lonnerstadt, in der Aisch bei Lonnerstadt (VII b und VII a).
- P. crisp. f. serratulus* B. In der Ehe bei Gutenstetten (VII a).
- P. pusillus L. f. vulgaris* Fries. Schwarzenbach bei Lonnerstadt, Adelsdorf, z⁴ (VII b).
- P. pus. L. f. Berchtoldi* Fries. Im Seebach bei Dechsendorf, z⁴ (VII b).
- Rhynchospora alba* Vahl. Poppenwind bei Höchststadt a. A. am Rande eines Waldweihers (VII b); Schmiedelberg bei Weisendorf, z³ (VII b).
- Scirpus uniglumis* Link. Krausenbechhofen bei Höchststadt a. A. (VII b).
- Sc. ovatus* Roth. Weiher im Bürgerwald bei Höchststadt a. A., z³ (VII b), Weisendorf—Oberlindach, Poppenwind—Hesselberg, öfters und z⁴ (VII b); Schlüsselfeld (VII a).
- Sc. acicularis* L. In der ganzen Weihergegend von Erlangen westlich bis Lonnerstadt—Dachsbach (VII b) verbreitet und in dem westlich von der Aisch gelegenen Weihergebiete Fetzelhofen-Ailsbach bei Lonnerstadt (VII a).
- Sc. setaceus* L. Kleinneuses und Krausenbechhofen und Poppenwind bei Höchststadt a. A., z³ (VII b); Ailersbach—Gottesgab bei Ühlfeld (VII b), Allbach bei Emskirchen (VII b).
- Sc. mucronatus* L. Bürgerwald bei Höchststadt a. A., z¹ (VII b).
- Sc. maritimus* L. Lonnerstadt (VII b und VII a), ebenso Höchststadt a. A., oft.
- Carex Davalliana* Sm. Weiherränder im Bürgerwald bei Höchststadt a. A., öfters (VII b), Lonnerstadt öfters (VII b); auch VII a von Lonnerstadt—Schlüsselfeld.
- C. pulicaris* L. Kleinneuses bei Höchststadt a. A. (VII b), Medbach bei Höchststadt a. A., z³ (VII b); Frimmersdorf bei Lonnerstadt (VII a).
- C. cyperoides* L. Arnshöchststadt bei Ühlfeld, z³ (VII b), Krausenbechhofen bei Höchststadt a. A. (VII b), Oberlindach und Schmiedelberg bei Weisendorf, z³ (VII b).
- C. Schreberi* Schrk. Poppenwind bei Höchststadt a. A. (VII b); Pommersfelden (VII a).
- C. vulpina L. nemorosa* Reb. Handthal bei Ebrach in einem sumpfigen Erlenwäldchen, z⁴ (VII a).
- C. teretiuscula* Good. Gottesgab bei Ühlfeld (VII b), Medbach bei Höchststadt a. A., z³ (VII a).
- C. paniculata L. v. simplicior* And. Frimmersdorf bei Lonnerstadt (VII a).
- C. tomentosa* L. Von Erlangen bis zum Steigerwald noch nicht gefunden; Sulzheimer Wald bei Gerolzhofen (VII a).
- C. brizoides* L. Staatswald bei Lonnerstadt (VII a), Bürgerwald bei Höchststadt a. A. (VII b).
- C. umbrosa* Host. Rand des Staatswaldes bei Lonnerstadt 1 Standort, z² (VII a).
- C. pilulifera* L. Um Höchststadt a. A. und Lonnerstadt vielerorts, z⁴ (VII b und VII a).
- C. montana* L. Im Staatswald bei Lonnerstadt (VII a), Pommersfelden (VII a).
- C. Oederi Ehrh. pygmaea* And. In den trockenen Sommern 1904 und 1905 massenhaft in dem Weihergebiete Höchststadt a. A.—Lonnerstadt—Ühlfeld—Weisendorf (VII b und herüber nach VII a).
- C. Pseudo-cyperus* L. Bösenbachhofen und Saltendorf bei Höchststadt a. A., z³ (VII a).
- C. acutiformis* Ehrh. Gottesgab bei Ühlfeld (VII b), Schwarzenbach bei Lonnerstadt (VII b), Saltendorf und Poppenwind bei Höchststadt a. A. (VII a und VII b).
- C. riparia* L. Bürgerwald bei Höchststadt a. A. (VII b), Kregemark bei Zentbechhofen (VII a).
- C. lasiocarpa* Ehrh. (= *filiformis* Aut.). Saltendorf bei Höchststadt a. A., z³ (VII a); Gottesgab und Ailersbach bei Ühlfeld, z³ (VII b); Buch bei Höchststadt a. A., z³ (VII b).
- Oryza clandestina* Al. Br. Graben bei Lonnerstadt, z³ (VII b), Weisendorf nach Sauerheim zu, z⁴ (VII b); Hesselberg—Dannberg bei Höchststadt a. A., z⁴ (VII b); Adelsdorf—Weppersdorf, z³ (VII b).
- Alopecurus geniculatus* L. Feuchte Aischwiesen und -gräben bei Höchststadt a. A. (VII a).

- Agrostis canina* L. Zwischen Gottesgab und Ailersbach bei Ühlfeld, an und in einem Weiher, z⁵ (VII b).
- Calamagrostis lanceolata* Roth. Bei Gottesgab (VII b), Graben bei Traishöchststadt bei Dachsbach (VII b).
- Avena caryophyllea* L. Gottesgab—Ailersbach einige Male (VII b), Schornweisach (VII a), Lonnerstadt öfters VII a und VII b, ebenso um Höchststadt a. A. (VII a und VII b).
- Melica uniflora* Retz. Staatswald bei Lonnerstadt (VII a).
- Poa palustris* L. Moor bei Gottesgab, z³ (VII b).
- Bromus racemosus* L. Wiesen an der Strafe zwischen Mailach—Ühlfeld, z⁵ (VII a).
- Orchis incarnatus* L. Moor bei Gottesgab, z⁴ (VII b), Frimmersdorf bei Lonnerstadt, z³ (VII b).
- O. maculatus* L. Nackendorf bei Höchststadt a. A., z³ (VII a), Pommersfelden, z⁴ (VII a); Staatswald bei Lonnerstadt, z³ (VII a), Bürgerwald bei Höchststadt a. A. (VII b).
- Epipactis palustris* Crantz. Gottesgab, z³ (VII b), Moor westlich von Frimmersdorf, z⁴ (VII a), Ebrach, z⁴ (VII a), Aisch bei Adelsdorf, z³ (VII a).
- Alisma plantago* L. v. *lanceolatum* Schultz. Bahnhof bei Höchststadt, z³ (VII b).
- Al. graminifolium* Ehrh. var. *typicum* (G. Beck). Steppach bei Pommersfelden (VII a), Schloßweiher in Weingartsgreuth, z³ (VII a), Reumannswind, z³ (VII a); Steppach, z³ (VII a).
- Al. graminifolium* Ehrh. v. *angustissimum* Asch. et Gr. Sauerheim bei Weisendorf, z³ (VII b); Adelsdorf—Weppersdorf, z² (VII b).
- Triglochin palustre* L. Lappach und Krausenbechhofen bei Höchststadt a. A., z³ (VII b), Gottesgab und Rohensaas bei Ühlfeld (VII b).
- Helodea canadensis* Rich. Bei Höchststadt a. A. neben der Aisch an der steinernen Brücke (VII b), einziger Standort in dem großen Weihergebiete westlich von Erlangen.
- Hydrocharis morsus ranae* L. Nach Prantl Nk. verbr. in dem Weihergebiete westlich von Dechsendorf weder in VII b noch VII a gefunden.
- Aristolochia Clematitis* L. Lonnerstadt Hecken im Orte (VII a), Saltendorf bei Höchststadt a. A. (VII a), Poppenwind bei Höchststadt a. A. (VII b).
- Rumex maritimus* L. Kieferndorf—Saltendorf bei Höchststadt a. A., z⁵ (VII a); Lonnerstadt, Weisendorf (VII b), Weppersdorf bei Adelsdorf (VII b), M.-Bibart (VII a).
- R. limosus* Th. (= *palustre* Sm.). Weiher bei Kieferndorf bei Höchststadt a. A. (VII a).
- Albersia Blitum* Kunth. Lonnerstadt im Orte (VII b), Adelsdorf (VII a).
- Amarantus retroflexus* L. Lonnerstadt im Orte (VII a), Mailach bei Lonnerstadt (VII a), Ühlfeld (VII a).
- Spergula Morisonii* Bor. (= *vernalis* Willd.). Lonnerstadt bei St. Anton-Kapelle (VII b).
- Sagina ciliata* Fries. Ailsbach bei Lonnerstadt, z³ (VII a).
- Stellaria uliginosa* Murr. Röthenbach bei Erlangen, z⁴ (VII b).
- Gypsophila muralis* L. Um Lonnerstadt, Höchststadt a. A. und Ühlfeld VII b und VII a häufig.
- Tunica prolifera* Scop. Rauschenberg und rechts von der Strafe nach Schornweisach bei Ühlfeld (VII a).
- Dianthus Armeria* L. Lappach bei Lonnerstadt, z³ (VII b), Ühlfeld (VII b), Medbach—Kieferndorf bei Höchststadt a. A., z⁴ (VII b), Lonnerstadt nach dem Staatswalde zu, z³ (VII b), Weppersdorf bei Adelsdorf, z³ (VII b).
- D. Armeria* × *deltoides* Hellw. Lappach und Fetzelhofen bei Lonnerstadt, z² (VII b und VII a).
- Cucubalus bacifer* L. Etzelskirchen bei Höchststadt a. A., z² (VII a).
- Montia minor* Gmel. Lonnerstadt: nach Ailsbach zu in einem Acker, z⁴ (VII a) und bei Lappach, z⁵ (VII b).
- Thalictrum flavum* L. Zwischen Hesselberg und Poppenwind am Moorgraben und östlich von Hesselberg am Seebach, z⁵ (VII b), Gottesgab bei Ühlfeld, z³ (VII b).
- Hepatica triloba* Gilb. Zentbechhofen auf Lias (VII a), Lonnerstadt im Lädla auf Keuper (VII a).

- Myosurus minimus* L. Viel um Lonnerstadt—Weingartsgreuth—Höchststadt a. A. (VII a), Ühlfeld (VII a), Schwarzenbach—Ailersbach—Gottesgab (VII b).
- Batrachium aquatile* Dum. v. *succulentum* Koch. In dem Weihergebiete westlich von Dechsendorf öfters bis an die Aisch (VII b).
- Adonis flammeus* Jacq. v. *anomalus* Wallr. Lehmäcker zwischen Nackendorf—Schirmsdorf, z³ (VII a).
- Ranunculus sceleratus* L. Bei Kieferndorf (VII a), Pommersfelden (VII a), Handthal bei Ebrach (VII a).
- R. Lingua* L. Westlich von Dechsendorf—Kosbach nah bei Hesselberg—Poppenwind—Moorhof (VII b); Lappach (VII b), Gottesgab (VII b), VII a nicht mehr.
- Nigella arvensis* L. Nackendorf bei Höchststadt a. A., z⁴ (VII a), Weingartsgreuth, z⁵ (VII a), St. Anton-Kapelle bei Lonnerstadt (VII b).
- Aquilegia vulgaris* L. In der Kregemark bei Zentbechhofen, z⁴ (VII a), im Staatswalde bei Lonnerstadt (VII a), im Bürgerwalde bei Höchststadt a. A., z⁴ (VII b).
- Nuphar luteum* Sm. In der Aisch bei Höchststadt a. A., z⁴.
- Corydalis solida* Sm. Frimmersdorf bei Lonnerstadt in einer Hecke vor der Mühle (VII a).
- Conringia perfoliata* Link (= *Erysimum orientale* R. Br.). Kalkhaltige Lehmäcker zwischen Nackendorf—Schirmsdorf bei Höchststadt a. A., z⁵ (VII a).
- Teesdalea nudicaulis* R. Br. Pommersfelden (VII a), Geißelwind (VII a), um Ühlfeld und Lonnerstadt, Höchststadt—Neuhaus—Adelsdorf vielfach (VII b).
- Lepidium campestre* R. Br. Poppenwind—Biengarten bei Höchststadt a. A., z³ (VII b); Bösenbechhofen und Medbach bei Höchststadt a. A., z³ (VII a).
- Hypericum humifusum* L. v. *Liottardi* Vill. Vielerorts um Lonnerstadt, Höchststadt a. A., Ühlfeld (VII a und VII b), Weisendorf (VII b), Gleifsenberg, Weingartsgreuth, Mühlhausen, z⁵ (VII b).
- Elatine hexandra* Dcl. Rezelsdorf und Schmiedelberg bei Weisendorf, z³ (VII b), Arnshöchststadt bei Ühlfeld (VII b); Nackendorf bei Höchststadt a. A. (VII a).
- El. Alsiniastrum* L. Bei Prantl: Nk. früher Bayreuth angegeben; bei Schwarz, Nürnberg-Erlang. Flora, heisst es: „Dechsendorf (Zuccarini 1819), Weisendorf (Schreb 1790); nach Glück liegen von beiden Standorten Belegexemplare im Herbar. Boic. vor, aber neuere Bestätigung fehlt. Schw. u. K. geben auch Sauerheim nächst Weisendorf, Hoppe 1797 allgemein Erlangen an. (Von A. Schwarz wurde diese Art im Jahre 1903 bei Herzogenaaurach entdeckt. Die Redaktion.)
- Neu aufgefunden in einem kleinen westlich nahe bei Klebheim bei Höchststadt a. A. (VII b) gelegenen Weiher, z³ (1898) und in einem unmittelbar bei Schmiedelberg bei Weisendorf gelegenen Gänseweiher, z⁴ (VII b) und endlich in einem Weiher westlich von Nackendorf bei Höchststadt a. A., z³ (VII a); in letzterem kam die Pflanze nur in den trockenen Jahren 1904 und 1905 zum Vorschein.
- Viola Riviniana* Reichenb. Um Höchststadt a. A. (VII b) und Lonnerstadt (VII a) öfters.
- Geranium pratense* L. Von Windsheim ins Aischtal herab bei Diespeck—Dachsbach—Ühlfeld auf Aischwiesen.
- Radiola linoides* Roth. Vielfach um Weisendorf (VII b), Höchststadt a. A. (VII b), Lonnerstadt (VII b und VII a), Burghaslach (VII a).
- Oxalis stricta* L. Medbach bei Höchststadt a. A., z⁴ (VII b); Weingartsgreuth, z⁴ (VII a); Buch bei Höchststadt a. A. (VII b).
- Polygonum vulgare* L. v. *oxypterum* Rchb. Reumannswind (VII a), zwischen Höchststadt a. A. und Lappach, z³ (VII b).
- P. amarellum* Crantz. Sumpfwiesen bei Gottesgab, z⁵ (VII b).
- Tithymalus Lathyrus* Scop. Seit Jahren im Pfarrgarten zu Lonnerstadt (VII a).
- Hydrocotyle vulgaris* L. In dem Weihergebiete von Erlangen bis Höchststadt a. A.—Ühlfeld (VII b) und in dem Zentbechhofener Weihergebiete öfters; ebenso um Weisendorf, z. B. Oberlindach, Sauerheim und Schmiedelberg (VII b).
- Oenanthe fistulosa* L. Um Höchststadt a. A., Lonnerstadt, Ühlfeld, Weisendorf öfters (VII b).
- Peucedanum Cervaria* Cass. Grofsneuses bei Lonnerstadt, z³ (VII b); Bürgerwald bei Höchststadt a. A., z³.

- Laserpitium prutenicum* L. Grofsneuses bei Lonnerstadt (VII b).
Scandix pecten Veneris L. Im Keupergebiete bisher nur bei Buch bei Höchststadt a. A. auf einem Acker mit schwerem Boden, z³ (VII b).
Epilobium adnatum Grieseb. Bahnhof bei Höchststadt, Strafsengraben nach Kraiendorf zu, z⁴ (VII b); im Strafsengraben von Saltendorf nach Höchststadt a. A. zu, z³ (VII a); im Strafsengraben bei Fetzelhofen bei Lonnerstadt, z³ (VII a).
Myriophyllum verticillatum L. Fetzelhofen (VII a).
M. spicatum L. Im Weihergebiete von Dechsendorf bis Lonnerstadt öfters (VII b), Lonnerstadt an und in der Weisach (VII a).
Lythrum Hyssopifolia L. Im ganzen Weihergebiete von Erlangen bis Höchststadt a. A.—Lonnerstadt—Ühlfeld—Dachsbach—Weisendorf öfters, z. B. Sauerheim und Schmiedelberg bei Weisendorf; Poppenwind, Hesselberg, Klebheim, Neuhaus, Bahnhof Höchststadt a. A.; Ailersbach—Gattesgab bei Ühlfeld, Weppersdorf bei Adelsdorf (VII b), bei Ailsbach 3 km westlich von der Aisch, z³ (VII a) (im Steigerwalde nach Prantl 2 W.).
Peplis Portula L. Häufig im ganzen grofsen Weihergebiete, oft massenhaft, wie z. B. beim Bahnhofe Hemhofen (VII b).
Rosa collina Jacq. Lonnerstadt rechts von der Brücke am Wege nach Mühlhausen (VII a) in einer Hecke, z².
R. gallica L. Vom Steigerwalde her, woselbst vielerorts, z. B. um Ebrach, Geiselwind, Rehweiler, Burgebrach, am Staatswalde b. Lonnerstadt (VII a), Schornweisach (VII a).
R. trachyphylla Rau. (Prantl: 1 Angabe) bei Höchststadt a. A. links von der Strafsenach nach Pommersfelden (VII a), und zwar: f. *typica* Rau.
Rubus saxatilis L. Im Staatswalde bei Lonnerstadt, z³ (VII a); Höchststadt a. A., im Bürgerwalde, z⁴ (VII b).
Potentilla supina L. Poppenwind—Hesselberg, z⁵ (VII b).
Comarum palustre L. In dem ganzen Weihergebiete verbreitet.

(Schluss folgt.)

Über Farbenvarietäten.

Von X. Wengenmayr, Kaufbeuren.

I. Die Farbenvarietäten der *Gentiana verna* L.

Seit ungefähr zwei Jahrzehnten richtete ich mein Augenmerk auf die Farbenabweichungen der *Gentiana verna*. Die von mir in dieser Zeit beobachteten sind folgende, für die ich folgende Bezeichnungen vorschlagen möchte:

1. Blüten viel heller blau als an der typischen Pflanze: *var. subcaerulea*;
2. Blüten bläulichweifs: *var. lactea*;
3. Blüten reinweifs: *var. alba*;
4. Blüten hell-lila: *var. lilacina*;
5. Blüten dunkelviolet: *var. ianthina*;
6. Blüten am Schlunde weifs, Zipfel blau: *var. varia*.

Varietät *subcaerulea* ist nicht selten; *var. lactea* ziemlich selten, noch seltener die reinweisse *alba*; *var. lilacina* steht an einem Platze in mehreren Exemplaren und zeigt seit einigen Jahren ihre eigentümlich gefärbten Blüten; Varietät *ianthina* fand ich bisher nur in einem Exemplar; Varietät *varia* findet sich in mehreren Stücken an einem Waldrande und fällt durch ihren weissen Schlundkranz von weitem auf. Sämtliche Varietäten habe ich in hiesiger Gegend gesammelt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [2_1907](#)

Autor(en)/Author(s): Hanemann

Artikel/Article: [Zur Flora des Aischgebietes. 14-19](#)