Was den Anstoß zu solcher Vermehrung gibt, bleibt vorläufig dunkel. Daß Verletzungen das Austreiben der Augen veranlassen können, ist experimentell nachgewiesen. Eine Verletzung könnte hier aber nur bei der eingetopften Pflanze vorgekommen sein, muß in der Natur aber wohl in Wegfall kommen, da irgendwelche Störungen nicht zu bemerken waren. Das Aussehen der Pflanzen ließ keinen sicheren Schluß auf die Ursachen zu. Wohl waren die Orchis latifolii auffallend durch schlaffen Wuchs, verminderte Blütenzahl und große Brakteen, was vielleicht auf alternde Pflanzen schließen ließe; allein bei den übrigen Stücken traf dies nicht zu; diese waren sichtlich große kräftige Pflanzen in voller Lebenskraft. Man könnte also daran denken, daß das Nichtaustreiben der Augen auf Hemmungserscheinungen zurückzuführen ist, die bei kräftiger Ernährung wegfallen.

Jedenfalls aber ist durch diese Funde das Vorkommen vegetativer Vermehrung

bei unseren Orchideen nachgewiesen.



## Cirsium Harzii Khek nova hybr.

= C. carniolicum Scop. × heterophyllum (L.) Hill.

Von Eugen Khek, Apotheker in Wien.

R a d i x stolonifer, stolones breviores et crassiores quam in C. heterophyllo. C a u l i s erectus usque ad inflorescentiam simplex (ca. 1,50-1,2 mt. altus), inflorescentia ramosa, sparse arachnoideo-pilosa, partim fere glabra, haud alata.

Folia omnia mollia herbacea, subtus dense et adpresse tomentosa, albida, lanata, inferiora ambitu lanceolato-ovata, ca. 28—30 cm longa, 10—12 cm lata, in petiolum elongatum (ca. 20 cm longum) basi sensim angustata, grosse dentato serrata; folia media et superiora partim sessilia, interdum petiolata, sessilia basi semiamplexicaulia, non lobata, fere duplo serrata, ambitu lanceolato cuneata, folia petiolata profunde pinnatiloba, lobis utrinque 6—8 anguste lanceolatis plerumque impartitis, acutissime et minute dentatis apice acutissimis in aculeum tenuem exeuntibus.

C~a~p~i~t~u~l~a compluria în apice caulis terna, breviter pedunculata, cetera  $\pm$  longe pedunculata, foliis minoribus suffulta, in sicco quidem (etiam oppressa) 4,5 cm

lata et ca. 3,5 cm longa, dilute purpureo brunea.

S q u a m a e anthodii lanceolatae angustatae sparse puberulae apice purpurascentes, inferiores in acumen longum attenuatae, superiores attenuatae, acutae.

Unterscheidet sich von Cirsium heterophyllum (L.) Hill var. indivisum DC. durch weniger dichtes Jndument auf den Stengeln und insbesondere auf der Blattrückseite, durch hin und wieder lappige, dornige seitliche Fortsätze an der Basis der stengelständigen Laubblätter, durch länger gestielte Basalblätter, durch vermehrte Anzahl der Blütenköpfe, durch weniger dichte spinnwebige weiße Behaarung an den Stengeln, durch bedeutend verlängerte Seitenäste des Blütenstandes.

Von Cirsium carniolicum Scop. durch schmutzig rotbraune Farbe der Blüten, fast gänzlichen Mangel der rostroten Drüsenhaare auf den Anthodialschuppen und der oberen Teile der Blütenstiele, durch dichter weiß behaarte Blattrückseite, durch schmälere, kleinere grundständige Blätter und durch Wurzelausläufer.

Der Bastard ist im Garten des Herrn Professors Dr. Harz in München, wo beide Arten aus Samen gezogen wurden, spontan entstanden und mir zur Begutachtung nebst anderen Cirsien eingeschickt worden. Jch benenne diesen Bastard zu Ehren des Herrn Professors Dr. Harz Cirsium Harziim., da mir durch seine Freundlichkeit die Freude zuteil wurde, die von mir längst, aber leider bisher vergeblich gesuchte Pflanze bewundern zu können.



## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft</u> <u>zur Erforschung der heimischen Flora</u>

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: 4 1922

Autor(en)/Author(s): Khek Eugen

Artikel/Article: Cirsium Harzii Khek nova hybr. = C. carniolicum Scop. x

heterophyllum (L.) Hill. 12