

Föhren und Birken bestanden; auch die Hasel war häufig. Das Profil ist aber auch deswegen interessant, weil es uns den allmählichen Übergang aus dem borealen in den atlantischen Baumbestand veranschaulicht; an der Oberkante (30 cm) treten die oben genannten Holzarten etwas zurück, das Bild wird bunter und Linde, Fichte und Buche stellen sich ein.

Jünger ist die Fundschicht im badischen Bodenseegebiet. Föhre und Birke treten stark zurück; bemerkenswert ist das reichliche Vorkommen der Linde und Ulme. Wir haben es also mit einem atlantischen Horizont zu tun.

Ebenfalls atlantisch, aber wahrscheinlich noch jünger, ist die Kirchseeoner Fundstätte; weil die Buche stärker vertreten ist, auch Tanne und Fichte sind schon ziemlich viel vorhanden, ferner hat die Föhre wieder zugenommen. Es zeigt sich bereits ein Übergang gegen die subboreale Zeit, die durch größere Wärme und Trockenheit ausgezeichnet war.

Zusammengefaßt ergibt sich aus dem Vorhergehenden, wenn auch die Funde bisher noch spärlich sind, daß *N. flexilis* bald nach dem Verschwinden der Gletscher in der borealen Zeit in den zahlreichen Seen des Voralpenlandes auftauchte, sich in der atlantischen Zeit hier erhielt und wahrscheinlich in der subborealen, die infolge ihrer stärkeren Trockenheit eine raschere Verlandung der Gewässer verursachte, erlosch.

## Literaturverzeichnis:

- Erdtmann, O. G. E. Pollenanalytische Untersuchungen von Torfmooren und marinem Sedimenten in Südschweden. Arkiv för Botanik. Stockholm 1921. Bd. 17 No. 10.  
 Gams, H. und Nordhagen, R. Postglaziale Klimaänderungen und Erdkrustenbewegungen in Mitteleuropa. Landeskundl. Forschungen, herausgeg. v. d. Geogr. Ges. in München Heft 25. München 1923.  
 Samuelson, G. Über den Rückgang der Haselgrenze und anderer pflanzengeographischer Grenzlinien in Skandinavien. Bull. of the Geol. Institution of the University of Upsala. Vol. XIII, I. 1915.  
 Sandgren, R. Najas flexilis i Fennoskandia under Postglazialtiden. Svensk Bot. Tidskr. 1920. Bd. 14, H. 2—3.  
 Stark, Peter. Zur Entwicklungsgeschichte der badischen Bodenseemoore. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. Jahrg. 1923, Bd. XLJ, Heft 9.



## Zur Kenntnis der Koburger Flora.

Von Hauptlehrer A. Siegel, Großheirath.

Schluß statt Fortsetzung.

### Polygonaceae.

- Polygonum bistorta* L.: Cb: Wildenheid  $v^3z^4$ .  
*P. amphibium* L. var. *natans* Mnch.: Cb: Wildenheid  $v^3z^4$ , Hassenberg  $v^vz^3$ , Ck: Ahorn  $v^2z^3$ .  
*P. amphibium* L. var. *terrestre* Leers: Cb: Wildenheid  $v^1z^1$  (nur einmal blühend in einem versumpften Grasgarten!!), steril  $v^4z^4$  (lästiges Acker- und Gartenunkraut!!).

### Chenopodiaceae.

- Chenopodium vulvaria* L.: Cb: Bahnhof Neustadt  $v^1z^3$ .

### Caryophyllaceae.

- Tunica prolifera* Scop.: Cm: Plesten  $v^1z^2$ ; Ck: Großheirath  $v^1z^3$ .  
*Dianthus Carthusianorum* L.: Ck: Grub a/F.  $v^2z^4$ ; Untersiemau  $v^3z^3$ ; Nj: Mainufer  $v^2z^3$ .  
*D. Armeria* L.: Cj: Rossach  $v^3z^3$ ; Nj: Banz  $v^3z^3$ ; Krai  $v^1z^2$ .  
*D. superbus* L.: Ck: Jtzgrund  $v^4z^4$ .  
*D. deltoides* L.: (überall)  $v^5z^4$ .

*Saponaria officinalis* L.: Nk: Haßfurt v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

*Vaccaria pyramidata* Med.: Nj: Muggendorf v<sup>1</sup>z<sup>1</sup> (nur einzelnes Exemplar auf Getreidefeld!!).

*Silene noctiflora* L.: Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Melandryum rubrum* Gcke.: Cb: Hassenberg v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>, Nj: Mainufer v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Coronaria flos cuculi* A.Br. f. *albiflora* A.Gr.: Cb: Wildenheid v<sup>1</sup>z<sup>1</sup> (einzelnes Exemplar zwischen dem Typus!!).

### Berberidaceae.

*Berberis vulgaris* L.: Cm: Plesten v<sup>2</sup>z<sup>3</sup> (wild!!).

### Ranunculaceae.

*Clematis Vitalba* L.: Nj: Vierzehnheiligen v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Banz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Hepatica triloba* Gil.: Cm: Lauterberge v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>; Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Hohenstein v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

*Pulsatilla vulgaris* Mill.: Cm: Plesten v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Weickenbach v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>, Grub a/F. v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

*Anemone silvestris* L.: Cm: Weickenbach v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*An. nemorosa* L. f. *purpurea* Gray: Ck: Buchenrod v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*An. ranunculoides* L.: Ck: Hohenstein v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>, Rossach v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>, Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>; Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Adonis aestivalis* L.: Cb: Hassenberg v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>, Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>; Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*A. aestivalis* L. var. *citrinus* Hffm.: Ck: Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>; Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>; Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Myosurus minimus* L.: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Grub a/F. v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Triebstdorf v<sup>1</sup>z<sup>4</sup>, Weißenbrunn a/F. v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Batrachium paucistamineum* Schur: Cb: Röden- und Steinachfluß v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*Ranunculus arvensis* L.: Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Cj: Großheirath v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>; Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*R. lanuginosus* L.: Cm: Lauterberge v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>; Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*R. auricomus* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>4</sup>.

*Trollius europaeus* L.: Cm: Lautergrund v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>, Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Nigella arvensis* L.: Ck: Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>; Haarth v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*Aquilegia vulgaris* L.: Cm: Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>; Lauterberge v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>; Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Delphinium Consolida* L.: Cm: Am Plestner Spitzberg eine rot blühende einzelne Pflanze!!

*Aconitum lycocotonum* L.: Cb: Fürth a/Bg. v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Actaea spicata* L.: Cm: Lauterburg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Nymphaea alba* L.: Cb: Neustadter Kessel v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*Nuphar luteum* Sm.: Nj: Reundorf (Main) v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Jtz (Unterlauf) v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

### Fumariaceae.

*Corydalis cava* Schwgg & K.: Ck: Grub v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>, Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup> (rote und weiße Form!!).

*C. intermedia* PmE.: Cb: Hassenberg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

### Cruciferae.

*Nasturtium silvestre* R. Br.: Nb: Kronach v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Arabis hirsuta* Scop.: Ck: Großheirath und Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*A. alpina* L.: Nj: Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Sisymbrium Sophia* L.: Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Erysimum orientale* R.Br.: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*E. odoratum* Ehrh.: Nj: Staffelberg und Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Erysimum cheiranthoides* L.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z, Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Diplotaxis muralis* DC: Nk: Würzburg v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*Alliolum calycinum* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Draba aizoides* L.: Nj: Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*Camelinea sativa* Fr. var. *pilosa* DC: Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*C. sativa* Fr. var. *glabrata* DC: Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>2</sup> (in Leinäckern!!).

*Thlaspi perfoliatum* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Teesdalea nudicaulis* R.Br.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Lepidium ruderale* L.: Cb: Neustadt v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

*L. campestre* R.Br.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*L. Draba* L.: Ck: Coburg (Schrebergärten) v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

*L. Draba* L. nov. f. *viridis mihi*: Blätter (und ganze Pflanze) grasgrün, Wuchs schlanker, auch Wurzel schlanker als beim Typus, Blütenfarbe mit einem Stich ins Gelbliche (sonst aber reinweiß); Standortsform? CK: Großheirath (in einem Kleeacker in Menge: v<sup>1</sup>z<sup>5</sup>!!). Schottenstein v<sup>1</sup>z<sup>4</sup>. Auch in der Mark Brandenburg (Prof. Rottenbach!).

*Neslea panniculata* Desv.: Cj: Großheirath v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

### Resedaceae.

*Reseda luteola* L.: Nk: Würzburg v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*R. odorata* L.: Cv: Neustadt v<sup>1</sup>z<sup>2</sup> (verwildert, unbest.!!).

*R. lutea* L.: Cb: Neustadt v<sup>1</sup>z<sup>1</sup> (adv.?).

### Violaceae.

*Viola palustris* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*V. odorata* L. var. *alba* Auct.: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*V. Riviniana* Rchb.: Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*V. vulgaris* Koch: Cb: Wildenheid v<sup>4</sup>z<sup>5</sup>.

### Droseraceae.

*Drosera rotundifolia* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>, Nb: Neundorf b. Mitwitz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

### Cistaceae.

*Helianthemum Fumana* Mill.: Ck: Grub v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

### Hypericaceae.

*Hypericum humifusum* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*H. quadrangulum* L.: Cb: Wildenheid v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>.

*H. tetrapterum* Fr.: Ck: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Hypericum hirsutum* L.: Cm: Plesten v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*H. montanum* L.: Ck: Ziegelsdorf v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Altenbanz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

### Malvaceae.

*Malva alcea* L.: Cm: Mönchröden v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Meschenbach v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*M. crispa* L.: Cb: Neustadt v<sup>1</sup>z<sup>3</sup> (verw.).

### Geraniaceae.

*Geranium palustre* L.: Cb: Hassenberg v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Püchitz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*G. pratense* L.: Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>, Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>4</sup>.

*G. pratense* L. f. *albiflorum mihi*: Ck: Niederfüllbach v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>. (Reinweiße Blüten sind selten, meist durch einen Rest von lila schmutzigweiß!!).

(*G. sylvaticum* L.: Cb: Bei Wildenheid jenseits der Landesgrenze v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>!!)

### Oxalidaceae.

*Oxalis stricta* L.: Cb: Hassenberg v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>, Wildenheid v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

### Linaceae.

*Linum catharticum* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>1</sup>, Cj: Großheirath v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

### Balsaminaceae.

*Impatiens noli tangere* L.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

### Aceraceae.

*Acer campestre* L.: Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>, Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

### Polygalaceae.

*Polygala amarum* L.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*P. comosum* Schk.: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

### Umbelliferae.

*Sanicula europaea* L.: Cm: Lauterburg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Astrantia major* L.: Nj: Ziegenfeld v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Eryngium campestre* L.: Nb: Würzburg v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Cicuta virosa* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Falcaria vulgaris* Bernh.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Altenbanz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*Pimpinella magna* L.: Cb: Fischbach v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, sonst seltener.

*Berula angustijolia* Koch: Cj: Großheirath v<sup>3</sup>z<sup>4</sup> (Blüten nicht sehr zahlreich!!).

*Bupleurum falcatum* L.: Cm: Lauterberge v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Meum athamanticum* Jacq.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>2</sup> (im Aussterben!!), jenseits der Landesgrenze noch häufiger.

*Angelica silvestris* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*Archangelica officinalis* Hffm.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

*Laserpitium latifolium* L.: Nj: Frk. Schweiz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*L. Siler* L.: Nj: Frk. Schweiz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Scandix pecten veneris* L.: Cm: Plesten v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

### Crassulaceae.

*Sedum maximum* Suter: Cb: Fischbach v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Seßlach v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*S. purpureum* Lk.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*S. album* L.: Ck: Seidmannsdorf v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Frk. Schweiz v<sup>4</sup>z<sup>3</sup>, Staffelberg v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*S. reflexum* L.: Ck: Sülzfeld v<sup>2</sup>z<sup>3</sup> (jenseits der Landesgrenze stellenweise häufiger!!).

### Saxifragaceae.

*Chrysosplenium alternifolium* L.: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

(*Chr. oppositifolium* L.: Bei Wildenheid jenseits der Landesgrenze!!)

*Parnassia palustris* L.: Cb: Hassenberg v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Großheirath v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

### Onagraceae.

*Oenothera biennis* L.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

*Circaea lutetiana* L.: Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

### Lythraceae.

*Peplis portula* L.: Cb: Hassenberg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

### Thymelaeaceae.

*Daphne mezereum* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Cm: Tiefenlauter v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

### Rosaceae.

*Cotoneaster integerrima* Med.: Nj: Frk. Schweiz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Rosa pimpinellifolia* L.: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*R. rubiginosa* L.: Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Großheirath v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

*R. tomentosa* L.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*R. pomifera* Herrm.: Ck: Coburg (Festungsberg) v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*Fragaria viridis* Duch.: Ch: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Cm: Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup> (besonders auch jenseits der Landesgrenze!!).

*Comarum palustre* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nb: Neundorf b. Mitwitz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Potentilla sterilis* Gcke.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

*P. anserina* L. f. *concolor* Lehm.: Ck: Buchenrod v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*P. procumbens* Sibth.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*P. incanescens* Op.: Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>.

(*P. thuringiaca* Bernh.: Cb: Bei Wildenheid, aber jenseits der Landesgrenze v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.)

*Alchemilla arvensis* Scop.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Rubus saxatilis* L.: Cb: Brüx v<sup>1</sup>z<sup>4</sup>, Ck: Ziegeldorf v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Watzendorf v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*R. suberectus* And.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*R. Bellardii* Wh.: Cb: Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*R. hirtus* WK.: Ck: Ziegeldorf v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

(Außerdem noch äußerst häufig *R. caesius* L. nebst mancherlei Kreuzungen. Aber auch die anderen *Rubus*-Gruppen sind zahlreich vertreten; doch muß ich eine Aufzählung meiner diesbezüglichen Funde einer ausführlicheren Arbeit vorbehalten)

*Sanguisorba officinalis* L.: Cb: Wildenheid v<sup>4</sup>z<sup>5</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>4</sup>.

*Poterium sanguisorba* L.: Cm: Meilschnitz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Agrimonia eupatoria* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*Aruncus silvester* Kost.: Cm: Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>, Ck: Ziegeldorf v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Prunus padus* L.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Hassenberg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Wohlbach v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>

*P. avium* L.: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

### Papilionaceae.

*Ulex europaeus* L.: Cb: Wildenheid v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>, Ck: Hohenstein v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>.

*Sarrothamnus scoparius* Koch.: Cb: Hassenberg v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>, Wildenheid v<sup>4</sup>z<sup>4</sup>.

*Genista germanica* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Anthyllis vulneraria* L.: Cm: Plesten v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>, Meilschnitz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

*Medicago falcata* L.: Cm: Plesten v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Meilschnitz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Medicago falcata* × *sativa* (= *M. varia* Mart.): Ebenda in derselben Verbreitung und Anzahl, besonders bei Banz in allen Farben!!)

*Melilotus altissimus* Thuill.: Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Trifolium spadiceum* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*Astragalus cicer* L.: Cj: Rossach v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Coronilla varia* L.: Nj: Staffelberg und Frk. Jura v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Hippocrepis comosa* L.: Cm: Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Lauterberge v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Ornithopus perpusillus* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*O. sativus* Brot.: Cb: Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup> (verw!!).

*Onobrychis vicariaefolia* Scop.: Cm: Plesten v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Mönchröden v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Ervum pisiforme* Pet.: Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Vicia dumetorum* L.: Nj: Banz v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*Ervum silvaticum* Pet.: Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Lathyrus tuberosus* L.: Cj: Großheirath v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>4</sup>z<sup>4</sup>.

*L. silvester* L.: Cm: Meilschnitz v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>, Lauterberge v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>.

*L. niger* Bernh.: Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*L. vernus* Bernh.: Cm: Lauterberge v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Scherneck v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

### Aristolochiaceae.

*Aristolochia clematitis* L.: Cb: Hassenberg v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*Asarum europaeum* L.: Cm: Meilschnitz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Lauterberge v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

### Loranthaceae.

*Viscum album* L.: Cb: Haarbrücken v<sup>1</sup>z<sup>1</sup> (auf Straßenpappel!!), Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>4</sup> (auf Obstbäumen!!).

### Ericaceae.

*Vaccinium uliginosum* L.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*V. vitis idaea* L.: Cb: Wildenheid v<sup>4</sup>z<sup>3</sup>, Cm: Lauterberge v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Hohenstein v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*V. oxycoccus* L.: Cb: Hassenberg v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>, Meilschnitz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Pirola uniflora* L.: Cb: Hassenberg v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>.

*P. rotundifolia* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Monotropa hypopitys L. var. glabra Rth. f. rosea miki*: Wie die typische Form, aber schön rosarot: Cb: Meilschnitz v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>!! (1918)

### Primulaceae.

*Trientalis europaea L.*: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Lysimachia nemorum L.*: Cb: Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Anagallis coerulea Schreb.*: Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>1</sup>.

### Plumbaginaceae.

*Armeria vulgaris Willd.*: Nj: Kösten v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

### Gentianaceae.

*Menyanthes trifoliata L.*: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nb: Neundorf b. Mitwitz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Gentiana ciliata L.*: Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*G. cruciata L.*: Cm: Plesten v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

### Apocynaceae.

*Vinca minor L.*: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>, Hohenste n v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

### Asclepiadaceae.

*Vincetoxicum album Asch.*: Nj: Vierzehnheiligen v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Cm: Hassenberg v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

### Asperifoliaceae.

*Cynoglossum officinale L.*: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Borago officinalis L.*: Cb: Hassenberg v<sup>2</sup>z<sup>4</sup> (verw.).

*Sympytum officinale L.*: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*S. officinale L. var. patens Sibth.*: Nj: Mainufer v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Pulmonaria obscura Dum.*: Cj: Rossach v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

### Solanaceae.

*Solanum nigrum L.*: Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Staffelstein v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Banz v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

*Physalis Alkekengi L.*: Cm: Plesten v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Weißenbrunn v/W. v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*Atropa Belladonna L.*: Cb: Wasunger Berg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Weitramsdorf v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nk: Buch a/F. v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Hyoscyamus niger L.*: Cb: Hassenberg v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Sülzfeld v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*Datura stramonium L.*: Cb: Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>2</sup> (jetzt ausgestorben?)..

### Serophulariaceae.

*Verbascum phlomoides L.*: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*V. lychnites L.*: Nj: Staffelberg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*V. lychnites L. var. album Mill.*: Ck: Untersiemau v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>, Nj: Staffelberg v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*V. nigrum L.*: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Scrophularia umbrosa Dum. var. Neesii Wtg.*: Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Antirrhinum majus L.*: Cb: Kronach (Stadtmauer) v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>.

*A. orontium L.*: Cb: Wildenheid v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Linaria cymbalaria Mill.*: Ck: Coburg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*L. elatine Mill.*: Ck: Scherneck v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*L. spuria Mill.*: Ck: Scherneck v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*L. minor Desf.*: Ck: Scherneck v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Cm: Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*L. arvensis Desf.*: Cb: Wildenheid v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.

*Digitalis purpurea L.*: Bei Wildenheid, aber jenseits der Landesgrenze.

*D. ambigua Murr.*: Cb: Hassenberg v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Weismaintal v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>.

*Veronica montana L.*: Nj: Banz v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>.

*Melampyrum cristatum L.*: Nj: Frk. Schweiz v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

*M. arvense L.*: Cm: Weißenbrunn v/W. v<sup>3</sup>z<sup>5</sup>, Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*M. arvense L. f. album mihi*: Ch: Großheirath v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>!! (Krone und Hochblätter weiß bzw. grünlichweiß).

*M. nemorosum L.*: Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>.

*Pedicularis sylvatica L.*: Cj: Krai v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

*P. palustris L.*: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Euphrasia stricta Host*: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Odontites vulgaris Mnch.*: Cm: Meilschnitz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Plesten v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Lathraea squamaria L.*: Cm: Meilschnitz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Banz v<sup>4</sup>z<sup>3</sup>.

### Labiatae.

*Mentha silvestris Garcke*: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>4</sup>, Nj: Mainufer v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*M. viridis Auct.*: Ck: Untersiemau v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>.

*M. aquatica L.*: Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>4</sup>.

*Stachys annua L.*: Nj: Vierzehnheiligen v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Muggendorf v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*St. recta L.*: Nj: Frk. Schweiz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Nk: Würzburg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*St. germanica L.*: Nj: Streitberg v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>

*Leonurus cardiata L.*: Cb: Hassenberg v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Brunella grandiflora Jacq.*: Nj: Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*Teucrium botrys L.*: Cm: Plesten v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Lauterberge v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Meilschnitz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*T. chamaedrys L.*: Nj: Weismaintal v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*T. montanum L.*: Nj: Frk. Schweiz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*Hyssopus officinalis L.*: Ck: Untersiemau v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

### Verbenaceae.

*Verbena officinalis L.*: Cm: Gestungshausen v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

### Lentibulariaceae.

*Utricularia vulgaris L.*: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

### Campanulaceae.

*Phyteuma orbiculare L.*: Ck: Untersiemau v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

*Ph. spicatum L.*: (überall) v<sup>4</sup>z<sup>1</sup>:

*Campanula glomerata L.*: Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Maingrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

### Cucurbitaceae.

*Bryonia alba L.*: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Buchenrod v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

### Rubiaceae.

*Sherardia arvensis L.*: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Asperula odorata L.*: Cm: Lauterberge v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*A. cynanchica L.*: Nj: Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

*Galium cruciatum Scop.*: Ck: Großheirath v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*G. rotundifolium L.*: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

*G. sylvaticum L.*: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.

### Caprifoliaceae.

*Sambucus Ebulus L.*: Cm: Plesten v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

*S. racemosa L.*: Cm: Meilschnitz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

*Viburnum opulus L.*: (überall) v<sup>4</sup>z<sup>2</sup>.

*V. lantana L.*: Hie und da als Heckenpflanze.

*Lonicera caprifolium L.*: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>2</sup> (wild!!), sonst sehr häufige Gartenpflanze.

*L. xylosteum L.*: Cm: Lauterberge v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

*Adoxa moschatellina L.*: Ck: Ahorn v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>, Rossach v<sup>1</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.

### Dipsacaceae.

*Dipsacus silvester Mill.*: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Gleissen v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.

*Scabiosa Columbaria L.*: Cm: Plesten v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.

### Compositae.

- Eupatorium cannabinum* L.: Cb: Fürth a/B. v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.
- Tussilago farfara* L.: Cm: Meilschnitz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>, Lauterberge v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>4</sup>.
- Petasites officinalis* Mnch.: Ck: Grub a/F. v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.
- Aster salicifolius* Scholl.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.
- A. amellus* L.: Ck: Ahorn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Jtzgrund v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.
- Buphthalmum salicifolium* L.: Nj: Frk. Schweiz v<sup>4</sup>z<sup>4</sup>.
- Inula salicina* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>2</sup>.
- J. britannica* L.: Nk: Haßfurt v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.
- Inula conyza* DC: Cm: Plesten.
- Pulicaria vulgaris* Grtn.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nk: Haßfurt v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.
- Bidens cernuu* L. f. *radiatus* Pot.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.
- Helichrysum arenarium* DC.: Nj: Muggendorf v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.
- Artemisia campestris* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>3</sup>.
- Achillea nobilis* L.: Nk: Würzburg v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.
- Anthemis tinctoria* L.: Cm: Plesten v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.
- Matricaria discoidea* DC.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nk: Hofheim v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.
- Tanacetum corymbosum* Schultz bip.: Nj: Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.
- Chrysanthemum segetum* L.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.
- Arnica montana* L.: Cb: Hassenberg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.
- Senecio spathulifolius* DC.: Cj: Rossach v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.
- S. viscosus* L.: Cb: Muppberg v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>, Ck: Ahorn v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.
- S. vernalis* WK.: Cj: Großheirath (1920!! eine einzige Pflanze in einem Getreideacker).
- S. Fuchsii* Gmel.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Frk. Schweiz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Banz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.
- Echinops sphaerocephalus* L.: Nj: Schottenstein v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.
- Cirsium eriophorum* Scop.: Nj: Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.
- C. acaule* All.: Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>3</sup>.
- C. acaule* All. var. *caulescens* Pers.: Ck: Jtzgrund v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.
- C. palustre* × *oleraceum*: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>5</sup> (in allen denkbaren Formen!!).
- C. oleraceum* × *acaule*: Ck: Rossach v<sup>3</sup>z<sup>4</sup> (ebenfalls in allen Formen!!).
- Carduus nutans* L.: Cm: Lauterberge v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Cj: Großheirath v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>4</sup>z<sup>3</sup>.
- C. defloratus* L.: Nj: Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.
- C. nutans* × *defloratus*: Nj: Muggendorf (einzelner großer Stock!! 1919).
- C. crispus* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.
- C. crispus* f. *albiflorus* mihi: Ck: Jtzgrund v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>!! (Wie die typische Form, Blüten aber gelblichweiß.)
- C. crispus* L. f. *intermedius* WG.: Ck: Jtzgrund v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.
- Carlina acaulis* L.: Cm: Plesten v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Meilschnitz v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Lauterberge v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.
- C. acaulis* L. var. *caulescens* Lmk.: Ebenda v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.
- C. vulgaris* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.
- Serratula tinctoria* L. (in allen drei Formen: *integrifolia* Wallr., *heterophylla* Wallr., *dissecta* Wallr.): Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>3</sup>.
- S. tinctoria* L. f. *albiflora* mihi: Cj: Rossach v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>!!
- Centaurea scabiosa* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>4</sup>z<sup>5</sup>, Frk. Schweiz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.
- C. scabiosa* L. f. *albiflora* mihi: Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.
- C. scabiosa* L. var. *discoidea* Uechtr.: Nj: Banz v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Frk. Schweiz v<sup>2</sup>z<sup>1</sup>.
- C. montana* L.: R: Kreuzberg i/Rhön v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>, Nj: Bucher Forst v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Seßlach v<sup>2</sup>z<sup>2</sup>.
- C. pseudo-phrygia* CAMey.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>2</sup> (jenseits der Landesgrenze im Thür. Wald häufiger!!).
- Arnoseris minima* Lk.: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.
- Thrinacia hirta* Rth.: Cb: Wildenheid v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.
- Picris hieracioides* L.: Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.
- Scorzonera humilis* L.: Cj: Rossach v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.
- Podospermum laciniatum*: Ck: Sülzfeld v<sup>1</sup>z<sup>1</sup>.
- Taraxacum levigatum* DC.: Cb: Höhn v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.

- Taraxacum vulgare Schrk. f. purpurascens mihi*: Cj.: Großheirath (1921!! nur einmal).  
*Prenanthes purpurea L.*: Ck: Bausenberg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.  
*Lactuca muralis Less.*: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>, Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.  
*L. scariola L.*: Ck: Coburg v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Creidlitz v<sup>1</sup>z<sup>2</sup>.  
*Crepis praemorsa Tausch*: Nk: Lichtenfels v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>, Cm: Lauterberge v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.  
*C. mollis Asch.*: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>3</sup>.  
*C. paludosa Mnch.*: Cb: Wildenheid v<sup>3</sup>z<sup>2</sup>.  
*C. biennis L. f. prolifera* (Blüten vergrünzt und durchwachsen): Ck: Jtzgrund v<sup>3</sup>z<sup>1</sup>.  
*(Hieracium cymosum L.*: Cb: Bei Wildenheid, aber jenseits der Landesgrenze!!).  
*H. Bauhini Schult.*: Cm: Weißenbrunn v/W. v<sup>2</sup>z<sup>4</sup>, Nb: Kronach v<sup>2</sup>z<sup>3</sup>.  
*H. pratense Tausch*: Ck: Jtzgrund v<sup>4</sup>z<sup>3</sup>, Nj: Banz v<sup>4</sup>z<sup>3</sup>, Bucher Forst v<sup>3</sup>z<sup>4</sup>.



## Cyclamen europaeum L. bei Erlangen.

H. Solereder berichtet in den Mitt. der B.B.G. (III. 1921, S. 535) über die Auffindung des Alpenveilchens im Erlanger Meilwald (nicht Meilenwald) am Ratsberg und bringt das Auftreten der Pflanze mit Samenverschleppung durch Vögel zusammen.

Mir liegt eine andere Erklärung näher: Am 2. September 1897 botanisierte ich auf einer mit Buchenwald bedeckten Höhe bei Jschl (Salzkammergut), ich glaube, sie heißt Siriuskogl, wo ich unter anderen Laubwaldpflanzen (*Cephalanthera alba* (Cr.) Simk., *Helleborine atripurpurea* (Raf.) Vollm., *Daphne mezereum* L.) auch *Cyclamen europaeum* L., noch blühend, fand. Davon grub ich eine Anzahl Knollen aus, einige pflanzte ich in den Garten meines Vaters in Erlangen, wo sie mich alljährlich mit ihren hübschen Blüten erfreuten, andere salzte ich an mehreren Stellen in der Erlanger Umgebung an: bei Spardorf, in der Atzelsberger Wildnis und westlich des steilen, vom Burgberg auf den Ratsberg führenden Fußwegs, zwischen diesem und einem durch das Auftreten von Fichte und Tanne auffallenden Waldteil. Ich vermute nun wohl nicht mit Unrecht, daß sich die von mir ausgesetzten Knollen die Jahre hindurch gehalten haben und mit den von Solereder gemeldeten Pflanzen zusammenfallen.

Da ich doch einmal beim Beichten bin, will ich weiter berichten, daß ich außer verschiedenen Rosetten von *Sempervivum*-Arten Knollen von *Calypso bulbosa* Rchb. f., *Ophrys bertolonii* Mor., *Serapias cordigera* L. und Samen der in Erlangen vorzüglich gedeihenden *Salvia glutinosa* L. ausgesetzt bzw. -gesät habe.

Dr. L. Lindinger.



## Senecio micanoides Otto.

In den „Ergänzungen zum II. Nachtrag der Adventiv- und Ruderalfloren von Ludwigshafen usw.“ (Mitt. d. B.B.G. III. 1914, S. 126) führt Fr. Zimmermann *Micania scandens* Lem. = *Senecio micanoides* Otto auf, als „häufig gezogene Topfpflanze“. Soweit *Micania* in Betracht kommt, stimmt diese Angabe mit meinen eigenen Beobachtungen überein, in den Jahren 1895 bis 1906 habe ich diese Pflanze oft als Zimmerpflanze in der Hanauer Gegend und im östlichen Vogelsberg angetroffen. Wenn dann Zimmermann fortfährt, nach Thellung's Angabe sei der Name falsch, so ist auch dieses richtig, denn *Senecio micanoides* Otto und *Micania scandens* Lem. sind zwei grundverschiedene Arten.

Die echte *Micania scandens* hat gegenständige, nebenblattlose, dünne Blätter und weißliche Blüten in unscheinbaren Köpfchen und gehört in die Verwandtschaft von *Eupatorium*. Die andere Art ist ein echter *Senecio* mit wechselständigen, fleischigen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [4\\_1924](#)

Autor(en)/Author(s): Siegel A.

Artikel/Article: [Zur Kenntnis der Koburger Flora. Schluß statt Fortsetzung.  
32-40](#)