download www.zobodat.at

das uns berechtigt, beide unter einen Gattungsbegriff zu subsumiren. Solches findet sich in der That. Es beruht nämlich in der Art, wie wir beide erkennen.

(Fortsetzung folgt.)

Verzeichniss der in der Umgegend von Frankfurt a. O. vorkommenden Macrolepidopteren.

Von F. Kretschmer. (Fortsetzung.)

147. Aventia Dup.

209. Flexula SV. Fz: in 7 und 8 in den Kiefern der Cunersdorfer und Schwetiger Forst, immer nur einzeln. Raupe: soll überwintert bis in 5 an den Flechten der Kiefern leben.

149. Helia Gn.

210. Calvaria SV. Fz: in 7 und 8 an den Kronen alter Weidenbäume, sehr selten. Raupe: soll an Ampfer leben.

152. Zanclognatha Led.

211. Tarsiplumalis Hb. Fz: in 7 beim Dammvorstadt-Kirchhofe, im Kornbusch und in der Schwetiger Forst. Raupe: unbekannt.

154. Herminia Tr.

212. Derivalis Hb. Fz: in 6 und 7 im Kornbusch, beim Damm rstadtkirchhofe und im Eichwald an schattigen Stellen. Raupe: unbekannt.

157. Hypena Tr.

213. Rostralis L. Fz: in 7 und 8 und nach der Ueberwinterung bis 5 überall in Gebäuden Gärten und Laubgehölzen. Raupe: Anfangs 7 fast gesellschaftlich auf wildem Hopfen.

214. Proboscidalis L. Fz: Anfangs 6 und in 9 überall zwischen Nesseln. Raupe: in 5 u. 8 an Brennnesseln.

161. Rivula Gn.

215. Sericealis Scop. Fz: in 5 und 7 überall in Gärten und Wiesen. Raupe: in 6 und im Herbst an Gramineen.

162. Brephos O.

216. Parthenias O. Fz: in 3 und 4 überall an Birken. Raupe: in 6 zwischen zusammengezogenen Blättern der Birke.

download www.zobodat.at

D. Geometrae.

1. Pseudoterpna HS.

1. Pruniata Hufn. Fz: Anfangs 6 und 7 einzeln in der Rosengartener, Boossener und Markendorfer Forst zwischen Gebüsch von Sarothamnus. Raupe: in 5 und Anfangs 6 an Sarothamnus.

2. Geometra B.

2. Papilionaria L. Fz: in 7 und 8 in der Bossener, Rosengartener und Schwetiger Forst. Raupe: überwintert klein an Zweigen, erwachsen bis 6 an Birkengesträuch.

3. Phorodesma B.

3. Pustulata Hufn. Fz: in 6 und 7 einzeln am Dammvorstadtkirchhofe, Bossener und Rosengartener Forst, im Eichwald und bei der Buschmühle. Raupe: in 5 an Eichen, überspinnt sich mit den Blattkeimen, die sie als Gehäuse mit sich trägt.

5. Nemoria Hb.

4. Viridata L. Fz: in 5 und 6 sehr einzeln auf dem Ochsenwerder und in der Schwetiger und Cunersdorfer Forst. Raupe: soll an Birken leben.

5. Strigata Müller. Fz: in 7 am Dammvorstadtkirchhofe, im Pfarrwinkel und bei der Schäferei. Raupe: soll an Rhamnus frangula in 6 leben.

6. Thalera Hb.

6. Fimbrialis Scop. Fz: in 7 bei der Schäferei, in der Cunersdorfer und Schwetiger Forst und am faulen See. Raupe: soll in 6 auf niederen Pflanzen leben.

7. Jodis Hb.

7. Putata L. Fz: in 5 und 6 in der Cunersdorfer Forst. Raupe: in 8 an Erlen.

8. Lactearia L. Fz: in 5 und 6 in der Rosengartener Forst. Raupe: in 6 an Birken.

8. Acidalia Tr.

9. Perochraria FR. Fz: in 7 am Oderdamme beim Kornbusch. Raupe: in 5 an Gramineen.

10. Ochreata Scop. Fz: in 7 am Oderdamme beim Kornbusch.

11. Rufaria Hb. Fz: in 7 bei der Schäferei und am Dammvorstadtkirchhofe, selten.

download www.zobodat.at

12. Muricata Hufn. Fz: in 7 sehr einzeln am Oderdamme, am Dammvorstadtkirchhofe und bei der Schäferei. Raupe: in 6 an niederen Pflanzen.

13. Straminata Fr. Fz: in 7 und 8 an den Lebuser Bergen. Raupe: soll in 5 an Thymian leben.

14. Incanata Hb. Fz: in 6 und 9 am Dammvorstadtkirchhofe, auch in der Dammvorstadt an Zäunen sitzend. Raupe: soll in 6 an Faulbaum leben.

15. Bisetata Hufn. Fz: in 7 im Kornbusch, am Dammvorstadtkirchhof und im Eichwalde. Raupe: soll von 8 bis 6 des folgenden Jahres an Gramineen, dicht an der Erde, sehr verborgen leben.

16. Osseata SV. Fz: in 7 am Oderdamme beim Kornbusch.

17. Aversata L. Fz: in 7 und 8 im Kornbusch, beim Dammvorstadtkirchhofe, bei der Schäferei, in den Cunersdorfer Seegründen. Raupe: in 5 und 6 auf niederen Pflanzen.

18. Deversaria HS. Fz: in 6 und Anfangs 7 beim Dammvorstadtkirchhofe. Raupe: im Frühjahr auf niederen Pflanzen.

19. Inornata Hw. Fz: Ausgangs 6 im Kornbusch und beim Dammvorstadtkirchhofe, immer nur einzeln.

20. Emarginata L. Fz: in 7 und 8 in der Rosengartener und Bossener Forst. Raupe: in 6 an niederen Pflanzen.

21. Immorata L. Fz: in 6 in der Schäferei in den Eichenschonungen. Erst einige Male gefangen.

22. Immatata SV. Fz: in 6 und 9 am Dammvorstadtkirchhofe. Raupe: in 5 an Sedum.

23. Remutaria Hb. Fz: in 5 und 6 in den Schonungen bei der Schäferei und in der Boossener Forst. Raupe: im Frühjahr an niederen Pflanzen.

24. Sylvestrata Hb. Fz: in 6 bis 8 auf den Wiesen beim Kornbusch und auf dem Ochsenwerder. Raupe: im Frühjahr an niederen Pflanzen.

25. Strigaria Hb. Fz: in 6 in der Rosengartener Forst, sehr selten. Raupe: in 8 auf Birken.

26. Nigropunctata Hufn. Fz: in 7 beim Damm-

download www.zobodat.at

vorstadtkirchhofe und in der Boossener Forst. Raupe: in 5 an niederen Pflanzen.

27. Paludata L. Fz: in 6 und 8 in der Schwetiger, Cunersdorfer, Rosengartener und Boossener Forst und am Tzschetzschnower faulen See. Raupe: in 7 und 9 an Thymus.

28. Decorata VS. Fz: in 8, sonst wie Paludata, nur bedeutend seltener.

10. Zonosoma Led.

29. Pendularia L. Fz: Anfangs 6 und in 8 im Eichwald, bei der Schäferei, im Pfarrwinkel, am Dammvorstadtkirchhof und in der Boossener und Rosengartener Forst. Raupe: im Sommer und Herbst auf Birken und Eichen.

30. Porata F. Fz: in 5 und 8 im Eichwald, Pfarrwinkel, bei der Schäferei und in der Boossener und Rosengartener Forst. Raupe: im Sommer und Herbst an Birken und Eichen.

31. Punctaria L. Fz: in 5 und 8 in allen Laubhölzern, häufig. Raupe: in 7 und 9 an Birken und Eichen.

11. Timandra B.

32. Amataria L. Fz: in 5 und 8 überall. Raupe: in 6 und im Herbst an Ampfer und Knöterich.

13. Pellonia Dup.

33. Vibicaria L. Fz: in 5 und 7 in der Schwetiger und Cunersdorfer Forst und am Tzschetzschnower faulen See. Raupe: in 6 an Sarothamnus.

15. Zerene Fr.

34. Grossulariata L. Fz: in 7 in Gärten. Raupe: nach der Ueberwinterung bis 6 an Stachel- und Johannisbeeren.

35. Adustata SV. Fz: in 5 am Dammvorstadtkirchhofe, bei der Buschmühle, im Kornbusch und Eichwald. Raupe: bis zum Spätherbst an Evonymus.

36. Marginata L. Fz: in 5 bis 8 an den Oderdämmen, auf dem Ochsenwerder und im Kornbusch. Raupe: im Herbst auf Espen und Weiden.

17. Bapta Steph.

37. Temerata SV. Fz: in 5 im Kornbusch. Raupe: in 7 auf Birken und Weiden. (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Monatliche Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins des Regierungsbezirks Frankfurt

Jahr/Year: 1884/85

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): Kretschmer F.

Artikel/Article: Verzeichniss der in der Umgegend von

Frankfurt a. O. vorkommenden Marcolepidopteren. 135-138