

Verzeichniss der in der Umgegend von Frankfurt a. O. vorkommenden Microlepidopteren.

Von F. Kretschmer.

(Fortsetzung.)

20. *Pandalis* Hb. Fz: in 5 und 6 einzeln auf den Rainen der Schwetiger Forst.

21. *Verbascalis* S. V. Fz: Erst einmal in der Schwetiger Forst Ausgangs 6 gefunden.

22. *Flavalis* S. V. Fz: in 7 auf Aeckern und Wiesen

23. *Repandalis* S. V. Fz: in 7 an sonnigen Bergabhängen beim Tzschezschnower Faulen See und der Schwetiger Forst. Raupe: in 5 an Wollkraut zwischen den Herzblättern

24. *Fuscalis* S. V. Fz: in 6 am Kornbusch zwischen den Rohraufschlägen.

25. *Sticticalis* L. Fz: in 7 und 8 einzeln an Feldwegen.

26. *Fruentalis* L. Fz: in 5 auf Aeckern, besonders im Sommergetreide. Raupe: lebt im Sommer an Cruciferen und verwandelt sich erst im Frühjahr zur Puppe.

27. *Palealis* S. V. Fz: in 5 einzeln bei der Buschmühle. Raupe: in 5 auf Schlehen.

28. *Prunalis* S. V. Fz: in 6 einzeln in Gärten, im Kornbusch, beim Dammvorstadtkirchhofe und bei der Buschmühle. Raupe: in 5 auf Schlehen.

29. *Aerealis* Hb. Fz: in 6 einzeln beim Dammvorstadtkirchhofe und in der Schwetiger Forst.

30. *Forficalis* L. Fz: in 6 an schattigen Stellen am Dammvorstadtkirchhofe und im Kornbusch. Raupe: in 5 an Cruciferen.

31. *Extimalis* Sc. Fz: in 6 in Gärten und auf Wiesen einzeln. Raupe: an den Schoten der Cruciferen, besonders Radischen.

32. *Stramentalis* Hb. Fz: in 7 auf feuchten Wiesen allenthalben zerstreut, aber nicht selten.

20. *Nomophila* Hb.

33. *Noctuella* Hb. Fz: von 7 bis zum Herbst an trockenen Stellen beim Dammvorstadtkirchhofe, besonders an Feldwegen vom Erdboden auffliegend.

22. *Cynaeda* Hb.

34. *Dentalis* S. V. Fz: in 7 in der Schwetiger Feldmark — Grundschäferei. — Raupe: in 5 in den Anschwellungen der Wurzelblätter von *Echium vulgare*.

23. *Hercyna* Fr.

35. *Pollinalis* S. V. Fz: in 5 an sonnigen Stellen der Markendorfer Forst. Raupe: in 7 in einer seidenen Röhre am Ginster.

24. *Chilo* Zk.

36. *Forficellus* Thnbig. Fz: in 7 im Kornbusch und den städtischen Wiesen, an Rohrtümpeln. Raupe: soll an *Poa aquatica* leben.

37. v. *Lanceolella* Hb. Fz: in 7 nur einmal auf der Löweninsel gefangen.

27. *Crambus* F.

38. *Alpinellus* Hb. Fz: in 7 einzeln an trockenen Abhängen der Schwetiger, Cunersdorfer und Boossener Forst, und am Tzschetzchnower faulen See.

39. *Dumetellus* Hb. Fz: wie *Alpinellus* nur etwas seltener.

40. *Uliginosellus* Z. Fz: nur erst einmal in der Boossener Forst gefangen.

41. *Silvellus* Hb. Fz: in 6 im Kornbusch und den städtischen Wiesen.

42. *Hortuellus* Hb. Fz: in 6 bis 8 auf trockenen Wiesen.

43. v. *Strigellus* F. Unter der Stammart.

44. *Rorellus* L. Fz: in 6 in der Rosengartener, Boossener, Cunersdorfer und Schwetiger Forst.

45. *Cerusellus* S. V. Fz: in 6 an den Oderdämmen.

46. *Pinetellus* L. Fz: in 7 in der Cunersdorfer, Schwetiger und Boossener Forst.

47. *Margaritellus* F. Fz: in 7 am Tzschetzchnower faulen See.

48. *Fascelinellus* Hb. Fz: in 7 in der Schwetiger Forst.

49. *Inquinatellus* S. V. Fz: in 7 und 8 an Waldrändern der Schwetiger und Cunersdorfer Forst. Raupe: unter Steinen in einer gewundenen Röhre.

50. *Culmellus* L. Fz: in 7 und 8 auf Wiesen beim Kornbusch und Trettin.

51. *Tristellus* S. V. Fz: in 8 auf freien Waldstellen in der Cunersdorfer und Schwetiger Forst.

52. *Luteellus* S. V. Fz: in 7 einzeln auf trockenen Rasenflecken beim Kornbusch.

53. *Perlellus* S. V. Fz: von Ende 5 bis 8 auf Wiesen beim Kornbusch.

29. *Eudorea* Curt.

54. *Dubitalis* Hb. Fz: in 6 nicht selten in Laubgehölzen und Gärten — Kornbusch und Schwetiger Forst. —

55. *Ambigualis* Tr. Fz: in 5 und 6 in der Schwetiger Forst.

56. *Crataegella* Hb. Fz: in 8 in der Schwetiger Forst.

31. *Pempelia* Hb.

57. *Semirubella* Sc. Fz: in 7 und 8 an trockenen, grasreichen Stellen der Rosengartener Forst.

58. *Hostilis* Stp. Fz: in 6 und 7 im Pfarrwinkel.

59. *Subornatella* Dup. Fz: in 7 im Pfarrwinkel und der Schwetiger Forst.

60. *Faecella* Z. Fz: in 7 in der Schwetiger Forst — Grundschäferei.

61. *Fusca* Hw. Fz: in 7 in der Schwetiger Forst in jungen Kiefern.

32. *Nephoteryx* Hb.

62. *Abietella* S. V. Fz: in 7 in der Schwetiger Forst. Raupe: vom Herbst bis zum Frühjahr in den jüngsten Trieben der Kiefern.

63. *Rhenella* Zk. Fz: in 6 im Pfarrwinkel. Raupe: im August gesellschaftlich zwischen zusammengezogenen Espenbüschen in röhrenartigen Gängen.

64. *Argyrella* S. V. Fz: in 8 im Kornbusch.

34. *Ancylosis* Z.

65. *Cinnamomella* Dup. Fz: in 7 im Pfarrwinkel.

38. *Hypochoalcia* Hb.

66. *Athenella* S. V. Fz: in 6 und 7 an den Bergabhängen am Dammvorstadtkirchhofe — immer sehr vereinzelt. —

42. *Myelois* Z.

67. *Rosella* Sc. Fz: Ende 7 an den Bergabhängen an der alten Cunersdorfer Strasse.

68. *Cribrum* S. V. Fz: in 6 und 7 am Schwetiger Wege und den Lehmgruben an der Breslauer Chaussee. Raupe: vom Herbst bis zum Sommer in den abgestorbenen alten Stengeln der Disteln und Kletten.

45. *Alipsa* Z.

69. *Angustella* Hb. Fz: in 5 am Dammvorstadtkirchhofe — nur erst einmal als Schmetterling gefangen. Raupe: im Herbst an den Früchten von *Eueonymus europaeus*.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monatliche Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins des Regierungsbezirks Frankfurt](#)

Jahr/Year: 1886/87

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Kretschmer F.

Artikel/Article: [Verzeichniss der in der Umgegend von Frankfurt a. O. vorkommenden Marcolepidopteren. 46-48](#)

