

C. Daphne sp. nov.

Kopf glatt, weisslich, zweites Fühlersegment schwärzlich. Augen grau. Pronotum bleich aschfarbig, mehr oder minder rauchig, gold-gelblich, netzartig punktirt. Knoten schwärzlich. Schildchen (grünlich) weisslich, Decken hyalin; Nahtadern, Cuneus am Grunde und Corium an der Spitze, schmal schwärzlich. Beine weisslich, Hinterschenkel an der Spitze bräunlich. Tarsen schwärzlich (die Klauen ausgenommen). Unterseite weisslich. Fühler etwas dick, erstes Segment zweimal so lang als der Kopf, zweites fast zweimal so lang als das erste. Schnabel bis zu den Hinterhüften (?) reichend. Long. 6 mm, lat. 1·2 mm.

P u l o L a u t (meine Sammlung).

Strongylophthalmia nom. nov. für **Strongylophthalmus** Hendel.

Von K. M. Heller in Dresden.

Seite 179 dieser Zeitung wird von Herrn Fr. Hendel eine neue Fliegengattung aus der Gruppe der Psiliden mit dem Namen *Strongylophthalmus* belegt; derselbe ist aber schon 1894 von J. Faust, Deutsch. Ent. Ztschr. pag. 192, an eine Rüsselkäfergattung vergeben worden, weshalb ich obige Namensänderung vorschlage.

Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren-Gattung *Cerallus* Duv.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A'' Fühler 10 gliederig | Subg. Cerallus s. str. |
| A' Fühler 11 gliederig | Subg. Anthodromicus Redtb. |
| | Subgen. Cerallus Duval. |
| 1'' Halsschild mit den Flügeldecken gleichfarbig gelb. | |
| 2'' Unterseite, Fühler (oft mit dunkler Spitze) und Beine gelb. | |
| 3'' Kopf ganz oder zum Theile schwarz. — Smyrna. | |
| | luteus Kiesw. |